H. N. 139.

Phyt. 340

Fh 5 2515 1

Historia naturalis. Regnum vegetabile

Florae 513.

~~Phyt. N° 103.~~

HORTUS ALSATICUS

PLANTAS IN ALSATIA NOBILI, INPRIMIS CIRCA ARGENTINAM SPONTE PROVENIENTES, MENSTRUO, QUO SINGULÆ FLORENT, ORDINE DESIGNANS, ANNEXO CHARACTERE, LOCO NATALI, AC FLORUM COLORE, ADDITIS ALIQUIBUS ICONIBUS, ÆRI AD VIVUM INCISIS, UT ET ALIIS AD BOTANICES DOCTRINAM RITE ADDISCENDAM PERTINENTIBUS, IN USUM BOTANOPHILORUM EXCURSIONES FACIENTIUM CONSCRIPTUS

A

FRANC. BALTHASARE

von Lindern,

MEDICINÆ DOCTORE ET PRACTICO.

ARGENTORATI,

Impensis JOANNIS BECKII, Bibliopol.

M D CC XLVII.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Cuilibet Medico-Practico rectissime confirmante Galeno incumbit, ut omnium Plantarum, quæ in usu sunt & in usum cedere possunt, exactam habeat notitiam, arma enim ejus sunt optima, quibus morbos, per Dei Gratiam, deducere potest etiam gravissimos; ideoque Scientia Botanica Medicinam facienti summe necessaria minimeque spernenda est.

PRÆFATIO.

Lectori Botanophilo Salutem!

PRodit nova facie Lector benigne! botanicus laboris mei fœtus, alio insignitus titulo, multo auctior atque correctior. Diu quidem anceps hæsi, an dignus sit, qui prælo committatur, cum præclarum illud Opus posthumum botanicum, sub nomine Historiæ plantarum Alsaticarum Viri beatæ memoriæ Marci Mappi, haud ita pridem, à Fautore, Collega atque Cognato meo Dn. Joh. Christiano Ehrmann, Viro tam solida eruditione, quam felici ægrorum cura conspicuo, e cineribus quasi

erutum orbique erudito communicatum fuerit.

Verum enim vero cum nullus labor ita ex omni parte perfectus esse soleat, quin aliquid addi possit, idem quoque de dicto hoc opere valet; multæ enim superstunt plantæ, quæ visum Tanti Viri subterfugerunt, mihi autem excursiones botanicas à prima juventute ad hunc usque diem in deliciis habitas instituenti occurrerunt. Cum itaque jam dudum apud me constitutum habuerim, novam Tournefortii mei Alsatici editionem adornandi, hunc laborem à me suscipiendum eo minus inutilem fore arbitratus sum, cum hoc ipso pulchram defectum laudati illius operis supplendi nactus sim occasionem. Alsatia autem nostra suaviſſima, cum nusquam steriles montes &

incul-

incultos agros, ſed fertiliſſimos undique campos habeat, atque amœniſſimos hortos ab ipſa natura excultos repræſentet, ideo Horti Alſatici titulum huic opuſculo præfigere libuit.

Cœterum facillimam rei herbariæ addiſcendæ methodum elegi, cuncta ſedulo declinando, quæ vel minimam memoriæ torturam inferre poſſent.

In fronte ſtatim hujus libelli prima hujus doctrinæ Elementa conſpicies, quibus expoſitis, ipſa ſequitur plantarum enumeratio.

Ad facilitandum autem illarum collectionem, non tantum juxta menſes, quibus ſingulæ florent, ordine alphabetico eas recenſui, ſed & notas earum characteriſticas ac locum natalem appoſui, non neglecta perennitatis, vocumque gallicarum ac germanicarum mentione

atque retento ſimul, quantum pro ſcopo meo licuit, ſyſtemate Tournefortiano. In fine quoque vocabulorum plerorumque botanicorum derivationes addere placuit.

Nec omiſi conſulere in hac mea plantarum indagatione Botanicorum Proceres, Bauhinos, Tabernæmontanum, Dalechampium, Cluſium, Lobelium, Rayum, Scheuchzerum, Zwingerum, Ruppium, Garidellum, Dillenium & fulgidiſſimum noſtræ ætatis Sidus Hallerum aliosque, quorum vel ſola nomina botanices Studioſo Reverentiam & Laudem inſinuant.

Accipe itaque Lector benevole! hunc meum qualemcunque laborem, eo quo Tibi à me offertur animo, mihique inpoſterum fave.

BOTANOLOGIÆ FUNDAMENTA GENERALIORA, PLANTÆ DIVISIONEM EXHIBENTIA.

Cap. I.

1.

Planta quævis dividitur, in Herbam Fruticem, Suffruticem, vel demum etiam in Arborem.

2. Herba Planta est perennis, folioſa non lignoſa, cujus caulis ſingulis annis perit, vel areſcit, novo deinde renaſcente ut Gramen.

3. Frutex, Planta est gemmipara, ad arboris magnitudinem non accedens, Caudice multiplici & ramoſa, quæ ſucciſa ſemper ſuppullulet, ut Roſa, Rubus vulgaris & Idæus.

4. Suffrutex Planta, humilior est Frutice, ſurculoſa & lignoſa, non gemmipara, ut Lavendula, Salvia.

5. Arbor Planta est perennis, omnium maxima, atque altiſſima, trunco ſimplici, craſſo, duro, cortice lævi aut aſpero, ſimulque ramoſa, ut Quercus, Betula, Fraxinus, & est vel

Julifera, ut Caſtanea & Corylus.
Pomifera, ut Malum, Cydonia, &c.
Conifera, ut Abies & Pinus.
Baccifera ut Cornus & Sorbus Aucuparia.

Prunifera, ut Perſica & Prunus
Siliquoſa,ut Cytiſus & Colutea Verſicaria
Item Tamarindus.

6. Planta quævis, etiam ratione Durabilitatis,eſt vel Annua,vel Perennis,velSempervirens.

7. Planta annua eſt, quæ annuatim decreſcit, diſparet & emoritur, quæque etiam ſemine proprio iterum reſurgit terræ comiſſo,ut Phaſeolus, Raphanus &c.

8. Planta Perennis autem, quæ omnem frigoris ſævitiam eludit, neque morte depaſcitur, ut Erica & Buxus.

9. Planta ſempervirens eſt, quæ folia nunquam deponit, ut Sabina & Buxus, aut ſi deponat, iterum alia producit, ut Ficus & Vitis Canadenſis.

10. Porro etiam quævis Planta differt 1.) quoad Locum, in quo provenit, alia enim eſt Campeſtris, alia Sylveſtris, alia Montana, alia in Convallibus exſurgit, alia eſt Paludoſa, alia in & ſub aquis naſcitur, alia Maritima alia in Nemoribus & Dumetis, alia in Pratis, alia aliis in locis viget. & ſic porro.

2. Alia quoad Qualitatem, alia enim eſt ſucci expers, alia ſucculenta, liquorem varium tam quoad ſaporem vel colorem fundens.

3. Ratione partium conſtitutivarum,quoad Radicem, Caulem & Fructus, quæ vero Caule caret dicitur Acaulos.

11. Radix, Plantæ præcipua pars eſt ima terra infixa, qua Nutrimentum, pro Augmento &

Conſervatione cauli, Foliis, cœteriſque partibus affertur.

12. Folium plantæ pars eſt, ad ejus Ornamentum conſtitutum, conſtans ex petiolo aut eo carens atque coſtæ adhærens.

13. Petiolus, plantæ pars eſt, eſtque vel brevis vel longus, folium ſuſtinens & cauliconnectens.

14. Caulis herbarum virga eſt, é radicibus immediate aſſurgens, variæ figuræ, quæ floribus foliisque ut plurimum donari ſolet; in Arboribus dicitur Caudex, in Frumentis Culmus eſtque vel ſimplex vel ramoſus.

15. Quodlibet Folium, conſideratur vel 1. quoad ejus Magnitudinem, aliud enim Magnum, aliud amplum, aliud parvum aliud minimum eſt. 2. vel ratione Formæ, dum rotundum, ſubrotundum, ovatum, lunatum, umbilicatum, planum, latum, anguſtum, longum acutum, aculeatum, lanceolatum, criſpum, rugoſum, verrucoſum, ſagittatum, undulatum, crenatum, ſerratum, denticulatum, auriculatum, ſtellatum, digitatum, angulatum ſeu ſinuatum, pennatum, pinnatum, fiſtuloſum, læve atque hirſutum & lanuginoſum eſt, & ſic porro. 3. ratione Coloris, pleraque folia viridia ſunt, quandoque alius coloris, quandoque etiam ſplendentia. 4. ratione odoris, aliud ſuaveolentem aliud fœtidum & nauſeoſum, aliud nullum de ſe ſpirat odorem 5. ratione ſubſtantiæ, dum eſt vel pingue, tenue aut carnoſum vel craſſum, ſiccum aut ſuccu-

 lentum,

lentum, vel fundens ſuccum viroſum, lacteum, luteum &c. 6. Variat etiam ratione Situs, aliud exſurgit alternatim, aliud conjugatim, aliud verticillatim vel ſtellatim & cruciatim, aliud eſt inperforatum aliud foraminulis prædi-tum &c.

16. Fructus cujuslibet plantæ Fœtus eſt, vel pars plantæ ut plurimum annúa, flori cohærens eique ſuccedens.

Cap. II.

Florum ſtructuram demonſtrans.

I.

Flos eſt, pars plantæ extima, tenuior, fructui prævia, ejusque ſtamina in ſuo meditullio fovens, vel colore ſuo, vel odore, vel utrisque ſimul, inſigne ejusdem ornamentum exiſtens.

2. Partes autem Floris, ſunt 1. Petala ſeu Florum folia, quoad numerum inter ſe diſcrepantia vid. Cap. 3. Stamina ſeu Capillamenta tenuia, floris medium tenentia, cum & ſine apicibus, quæ vero apicibus carent Capillamenta proprie dicuntur. 3. Apices ſunt Summitates & Cacuminula, ſtaminibus incumbentia, 4. Piſtillum ſeu Stylus, qui media pars floris eſt, ex umbilico aut centro inter ſtamina exſurgens, & naſcenti Fructui adhærens

5. Ca-

5. Calix ſeu Perianthemum, poſterior floris pars eſt, Florem & Fructum vel involvens vel ſuſtinens, vel utrumque præſtat, ſed non in omnibus obſervatur, differt ſola figura & ſitu, variam repræſentans figuram vel nudus eſt vel foliolis obſitus &c 6. Ovarium quod Theca ſeu Capſula eſt, ſemina includens, eſt multiformis vel uni-bi-tri-aut multicapſularis. &c.

Qui hiſce gaudet partibus, ille Flos dici ſolet Perfectus, qui vero Petalo vel Stylo aut Staminibus caret, dicitur Imperfectus. ut in Corylo &c.

3. Porro Flores etiam conſiderantur ratione Situs. & Fructus, alii proveniunt longa ſerie, in ſummis ramulis, alii naſcuntur verticillatim aut ſpicatim vel in Ariſtam, alii umbellatim aut racematim vel faſciculatim vel etiam in Pyramidem aſſurgunt &c.

4. Fructus ratione, alius enim eſt Capſulatus alius angioſpermos, id eſt ſemine nudo ut in lalapa, Cerinthe, alius anguloſus, echinatus, umbilicatus, celluloſus, ſiliquoſus, leguminoſus articuloſus, glaber vel lanuginoſus &c.

Cap. III.

Florum Differentias Fundamentales continens.

- Flos omnis est vel
  - a Petalos.
    - c Simplex.
      - g Monopetalos.
        - o Campaniformis.
          - bb Patens.
          - cc Tubulosus.
          - dd Globosus.
        - p In fundibuliformis.
        - q Rotatus.
        - r Personatus.
          - ee Proprie sic dictus.
          - ff Hypocrateriformis.
        - s Labiatus.
        - t Anomalus.
      - h Dipetalos.
      - i. Tripetalos.
      - k Polypetalos.
        - u Cruciformis.
        - x Rosaceus.
        - q Caryophyllæus.
        - z Liliaceus.
        - aa Papilionaceus.
    - d Compositus.
      - l. Flosculosus.
      - m Semiflosculosus.
      - n Radiatus.
  - b Apetalos.
    - e Stamineus.
    - f Amentaceus.

Cap. IV.

Clavem Literarum designatarum explicans.

a. Flos est, qui præter Stamina vel Capillamenta etiam habet Petala, vel majora vel minora, æqualia aut in æqualia ut in Ranunculo & Phaseolo.

b. Qui Petalis caret, & totus vel ex staminibus seu Capillamentis tantum constat, ut in Sparganio & Equiseto.

c. In quo nec Flosculi nec Semiflosculi adsunt, ut in Ceraso aut Pruno.

d. Qui componitur ex flosculis aut semiflosculis, ut in Cyano, aut ex Flosculis tantum, ut in Dente leonis, vel ex utrisque ut Doronicum.

e. Qui prætet Stamina seu Capillamenta stylum ambientia, nil habet, unde nomen trahere potest ut in Equiseto & Ilice.

f. Seu Iulus, qui ex staminibus tantum, aut apicibus vel foliolis quibusdam componitur ut in Corylo & Nuce juglande.

g. Qui unico vel pluribus petalis donatur, & totus seu integer ab ovario decedit, ut in Digitali, Volvulo, Nicotiana.

h. Qui duobus saltem petalis gaudet ut in Circæa, Stellaria & Hederula palustr. Tabern.

i. Qui ex tribus petalis est confectus, ut in Plantagine aquatica & Ranæ morsu, Cucubalo.

k. Qui constat ex multis petalis planis ut in Quinque folio, Alsine, vel superimpositis qui postmodum multiplex seu plenus audit, ut in

Leu-

Leucojo & Caltha ſeu Calendula hortenſi.

l. Qui ex plurimis floſculis ſeu petalis fiſtuloſis eſt compoſitus, ut in Iacea, Carduo &c.

m. Cujus petala inferna tantum parte fiſtuloſa, ſunt, media vero & ſuperna parte plana conſpiciuntur, & denſe in orbem poſita ſunt, ut in Scorzonera, Chondrilla.

n. Qui ex duabus partibus eſt confectus, Diſco nempe floſculoſo & Circumferentia, quæ etiam Corona audire ſolet ſemifloſculoſa, ut in Bellide Iacobæa &c.

o. Qui maxime Campanæ formam obtinet, ut in Campanula, Gallio.

p. Cujus in ferior pars tubulata, ſuperior vero in Conum inverſum infundibuli inſtar diducta eſt, ut in Auricula Urſi, Symphyto, Cynogloſſo.

q. Ubi petala circa diſcum, rotæ in modum annexa ſunt, ut in Bellide, Chamæmelo.

r. Qui Faciem æmulam cujusdam perſonæ habet, vel roſtrum animalis, rictu & labiis repræſentat, ut in Antirrhino, Linaria &c.

s. Cujus pars inferior labio unico tantum, ut in Scordio, Bugula, Chamædri, ut plurimum autem gemino vel trifido Barba nonnullis dicta ſciſſa eſt, in ſuperiore autem Galea vel integra, ut in Lamio Cardiaca vel diviſa ut in Serpillo atque Meliſſa comprehenditur.

t. Qui ſub nomine ſingulari comprehendi nequit, ut Ariſtolochia, Scrophularia &c.

u. Qui gaudet quatuor petalis cruciatim diſpoſitis, ſimulque calicem pari numero petalorum habet, ut Cruciata, Braſſica

x. Cu

x. Cujus petala quaternum numerum ſuperant ut in Salicaria, Roſa, Pyro.

y Cujus petala ex ipſo calice tanquam é tubulo emergunt, uti eſt Linum, Lychnis, Caryophyllus &c.

zQui ex 6 petalis, quandoque tribus conſtat, aut in 6 partes ad Lilii formam accedens ſecatur, ut in Aſphodelo, Colchico, Hyacintho.

áá Qui ſuis petalis, Papilioni alis expanſis non inſimilis eſt, aut qui conſtat ex petalis diſſimilibus & cujus ſuperior pars Vexillum, inferior Carinam, duo lateralia Alas repræſentant, ut in Lathyro Piſo &c.

bb Qui velut in Pelvim extenditur, ut in Bryonia, Gentiana.

cc Qui angnſtus & oblongus eſt, ut in Caprifolio, Xyloſtio.

dd Cujus os anguſtius eſt Ventre, ut in Myrtillo Uva urſi.

ee Cujus Tubus ejus in Diſcum non in conum explicatur, ut in Primula Veris, Androſace &c.

Cap. V.

Terminos Technicos in Deſcriptione uſuales deſignans.

Acaulos, Planta eſt, quæ nullo gaudet Stylo ut in Carlina acaulos.

Acinus, ſemina vel granula bacciş incluſa ſignificat, ut in Alkekengi, Solano.

Alæ, petala ſunt lateralia, ſlorum papilionaceorum, inter vexillum & carinam poſita.

Alatus caulis eſt, qui circa caulem, ab ima parte ad ſupremam, longitudinalia habet folia, ut in Lathyro, Bidente Americano.

Ari-

Ariſta, Acus eſt exilis & longa, é glumis ſeu folliculis grani conſtans, ut in frumento.

Bulbus, Radicem denotat, ſuis membranis vel tunicis in orbem poſitis, vel etiam ſquammatim incumbentibus cogmentatam.

Calcar, floris pars eſt, quæ in ejus poſteriore parte caudam habet vel brevem aut prælongam ut, in Elatine, Pinguicula & Orchidibus quibusdam & Delphinio.

Capitulum, quando flores in ſuprema ſtyli parte in orbem vel in globum rotundum glomerantur, ut in Allio Cepa, Globularia &c.

Capreolus ſeu Clavicula; filamenta ſunt tenuia in planta, circinnum in modum intorta, quibus ſtipibus vicinis annectuntur, ut planta ſe in altum erigere poſſit, ut in labyrinthyro, Bryonia.

Carina, Petalum eſt papilionaceorum florum inferius, navem concavitate ſua repræſentans, ut in Faba, Piſo Aſphodelo.

Cilium eſt quando Calicis margo ſquamoſus villis obſitus eſt, ut in Iaceis quibusdam.

Corymbus eſt Faſciculus plurimorum flosculorum globoſus vel ſemi globoſus, ut in Opulo, Hedera.

Culmus, Caulis eſt Frumentorum & Graminum geniculatus.

Geniculum eſt Articulus ſeu Nodus, ut in Graminibus, in Lychnide ſylveſtri. Cicutaria fœtida.

Gluma, eſt congeries granorum in folliculo, ut in Frumento.

Julus eſt, Faſciculus floſculorum apetalorum vermiformis, ab arboribus dependens ut in Corylo.

Panicula, eſt congeries ramoſa, florum numeroſum, in ſpicam longam digeſta, ut in gramine miliaceo & hordeaceo

Pappus eſt Lanugo ſeminibus quibusdam inhærens, ut in Hieracio Carduo &c.

Spica eſt Conus & oblongus florum erectus ut in Plantaginc, Biſtorta.

Umbilicus, media pars eſt ſeu Floris Centrum.

HORTI ALSATICI
PLANTARUM FLORENTIUM
MENSIS
JANUARIUS ET FEBRUARIUS.

HElleborus niger, amplioribus foliis Tournef. Inſtit. R. H. *Flore roſacco ex albo leviter rubente, folio latiori digitato, radice fibroſa nigra, amara & acri, fructu multi capſulari* Chriſt oder ſchwartze Nießwurtzel, mit breiten tief eingeſchnittenen Blättern. Ic. Tabernæmont hiſt. Plantar. ſub. titulo, Veratri nigri Stiriac. pag. 1099. Gallis. *Ellebore noir à feuilles larges*, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Helleborus niger anguſtioribus foliis. T. Ic. Clus. hiſt. rar. plant. pag. 274. *Sub nomine Ellebori nigri legitimi.* rechte ſchwartze Nießwurtzel, mit ſchmahlen eingeſchnittenen Blättern. *Gallis, Ellebore noir, à Feuilles étroites.* ibid. *perenn.*

MENSIS.
FEBRUARIUS ET MARTIUS.

Alyſſum vulgare polygoni folio, caule nudo. T. *Sive Burſa paſtoris minima, oblongis ſiliquis*

verna loculo oblongo IB. 937. *Quæ Alsine V. minima* Tabern. Hist. pag. 1087.

Plantula hæc, ex omnibus campestribus, statim ineunte vere, flosculis suis copiosissimis, jucundo aspectu, margines dealbat, unde etiam à nostratibus appellantur die Frühlings Blümlein, aliàs Gänse Blümlein oder Nägelkraut. *annua.*

Corylus sylvestris T. seu *vulgaris flosculis amentaceis, foliis Alni æmulis latioribus serratis; fructu rotundo albo minore.* gemeine wilde oder Wald Haselstaude Lobel. icon pag. 192. Gall. *Noisetiere sauvage*, in Wäldern und in denen Hecken. *perenn.*

Corylus sylvestris, latiore folio, virgis rectioribus & minus ramosis Dillen. Catalog. plant. Giss. Haselstaude, mit breiten Blättern und stracken Schossen oder Gerten, in denen Waldungen Oßwald und Ganßau. *perenn.*

Corylus sativa, fructu albo minore. T. Garten Haselstaude lc. Clus hist. 11. *Noisetiere domestique, perenn.* non differt à Sylvestri vulgari, nisi cultura mitiori.

Corylus sativa fructu oblongo rubente T. Blut Haselnuß Staude, mit ablanger Frucht. Ic. Zwinger Theatr. Botan. *Noisetier Franche* bin und wieder auf dem Land auf denen Höfen und in Gärten, *perenn.*

Corylus sativa, fructu oblongo albicante T. Haselnuß Staude mit weiser langer Frucht. ibid. *perenn.*

Corylus ſativa fructu rotundo maximo T. *ſeu Avellana Lugdunenſis major. Camerar. Hort.* Römiſch oder Italiæniſche Haſelnuß Staude, mit der gröſten Frucht, in Gärten der Stadt und des Landes *Avellanier Italien. perenn.*

Cornus hortenſis Mas T. ſive *domeſtica fructu rubro, oblongo oſſiculis fœto, flore roſaceo luteo, foliis virgæ ſanguineæ ſimilibus.* zahmer Welſch-Kirſch-Baum *Ic. Tabern. hiſt. plant. pag.* 1459. *Coronuillier Mále ou Cornier domeſtique* aller Orten in Gärten. *perenn.*

Cornus hortenſis Mas, fructu ceræ colore T. Welſch Kirſch-Baum mit gelber Frucht. ibid. *perenn.*

Cornus hortenſis Mas, fructu albo T. Welſch-Kirſch-Baum mit weiſer Frucht. ibid. *perenn.*

Cornus ſylveſtris Mas, T. *ſive ſpontanea* wilder Welſch-Kirſch-Baum, hin und wieder in Wäldern und Büſchen, in dem Ilkircher und Oßwalder Wald. Ic. Clus hiſt. 13. *Cornier ſauvage perenn.*

Helleborus niger fœtidus T. *flore roſaceo herbaceo, radice tenui nigra, foliis anguſtioribus profunde inciſis & ſerratis*, ſive *Helleborus niger ſylveſtris adulterinus hyeme etiam virens* IB. 3. *app.* 880. Eſt *Helleboraſter maximus* Hort. Eyſt. *flore & ſemine prægnans Lobel. Ic. pag.* 679. & *Garidel. hiſt. plant. Tab.* 48. groß Läuſe Kraut, groß ſtinckende Nießwurtzel. *Ellebore puant ou butard. perenn.* am Weg wenn man von Sultz auf Molsheim gehet, nahe an der Capell.

Narciſſo-leucojum vulgare T. *unico flore ſimplici liliaceo, rarius bino pendulo, foliis longis ſplendentibus fructu turbinato tripartito* ſive Leucojum bulboſ. hexaphyllum. *Ic.* 1. *Tabern. hiſt.* 1005. & *Bauh.* 2. 590. Hornungs oder Mertzen Blum potius groſſe weiſe Schnee-Glöcklein, in ſchattichten Hohen-Gebürgen, und bey uns in den Gärten. *perenn.*

Narciſſo-leucojum minus trifolium T. *tribus petalis albis minoribus cingentibus, terna majora herbacei in limbo coloris, foliis anguſtioribus longis glaucis, fructu ovato* ſive Leucojum bulboſum præcox minus *Cluſ. pan. pag.* 181. kleine Schnee-Tröpfflein *Ic. Cluſ. hiſt. pag.* 169. eſt Narciſſus VI. Matthiol. hin und wieder in Gärten.

MENSIS
MARTIUS ET APRILIS.

Acer montanum candidum T. *foliis in ferne candicantibus latifoliis angulatis, pediculis rubentibus annexis, floribus roſaceis ex viridi flaveſcentibus, fructu alato gemello multi capſulari* ſive Acer major, multis falſo Platanus *IB.* 1. 168. ſive Acer latifolium Clus. Ic. pag. 9. Ahorn-Baum mit tief eingeſchnittenen Blättern *Erable de montagne, ou Sycomore* auf dem Hochgebürg Hochfelden und St. Ottilienberg *perenn.*

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis T. ſive Alnus vulgaris *IB.* 1. 151. *floribus amentaceis fru-*

fructu squamoso. Erlen oder Eisenbaum, *quia ejus lignum in aquis ferri instar durum fit & diu durat.* Ic. *Tabern. hist.* 1395. *Aunée.* wächst aller Orten, an dem Rande des Wassers, an der grünen Wart. *perenn.*

Alnus folio incano T. *foliis acuminatis longioribus, subtus incanis superne vero hirsutis* sive *Alnus incana & hirsuta IB.* 1. 154. roth Erlen, in dem Granwört, neben den Gartners Feldern. *perenn.*

Alnus Alpina minor. T. *foliis Ulmi* kleiner Berg Erlen-Baum, in denen Bergen gegen Hochfeld. *perenn.*

Bellis sylvestris minor T. *sive spontanea* IB. 311. *flore prorsus albo radiato, foliis laciniatis, radice tenui.* Kleine Maßlieben oder Zitter-Röslein, mit gantz weisen Blumen, *Paquerette ou petite Margueritte* hin und wieder auf denen Wiesen. Ic. Tabern. hist. 708. *perenn.*

Bellis sylvestris minor flore mixto T. Ic. in H. Eyst. gesprenckte Zitter-Röslein. *perenn. Paquerette tachetée.*

Brassica campestris perfoliata T. sive *Perfoliata siliquosa* IB. 2. 835. *flore albo cruciformi, foliis pallide viridibus, corniculis longis quadrangulis, radice longa fibrosa alba, fructu siliquoso bicapsulari* durchwachsender Feld-Kohl, mit Steck-Ruben Blättern. Ic. *Clus. hist. pag.* CXXVII. *est Perfoliata napifolia Tabern. hist.* 1140. in denen Frucht und Kraut Aeckern. *ann.*

Braſſica campeſtris perfoliata, flore purpureo T. ſive *Perfoliata ſiliquoſa purpurea Clus. IB.* 2. 836. Wilder Kohl mit Steckruben Blättern und rötblichten Blumen, in denen Feldern bey Oßwald.

Burſa paſtoris major, folio ſinuato T. ſive Burſa paſtoris *IB.* 2. 936. *capſula brevi cordata, flosculis albis cruciformibus, radice alba tenui fibroſa* groß Täſchel-Kraut, mit gekerbten Blättern, neben denen Wegen und auf gebautem Grund. *Ic. Tabern. hiſt.* 512. & *Lobel. Ic. pag.* 221. *Tabouret ou Burſe à Berger. ann.*

Burſa paſtoris major folio non ſinuato T. groß Täſchel-Kraut mit ungekerbten Blättern. *ibid. ann.*

Burſa paſtoris media T. ſive minor *Tabernæm. hiſt.* 512. *petite burſe á berger* klein Täſchel-Kraut, auf ſandigem und dürren Boden, an denen Zäunen und Wegen. *ann.*

Buxus arboreſcens foliis pictis, per limbum aureis T. *floribus apetalis luteis*, gemahlter Buchs, Zaun Buchs. *Buis peinte Ic. Munting. hiſt. plant.* in Gärten. *perenn.*

Buxus arboreſcens T. *foliis oblongis atro rubentibus & ſplendentibus.* Steigender Buchs, oder Buchs-Baum. *Ic.* 1. *Tabern. hiſt.* 1164. in unterſchiedlichen Gärten und Bauren-Höfen. *perenn.*

Buxus foliis rotundioribus T. ſive *Chamæbuxus. Tab. hiſt.* 1464. *Ic.* 2. gemeiner Schnitt oder Länder Buchs. *Buis, perenn.*

Chryſoſplenium, foliis amplioribus auriculatis

latis T. sive *Saxifraga aurea Dod. IB. 3. 707. floribus apetalis stamineis hirsutis, radice filamentosa. fructu sicco globoso.* Gulden Miltz-Kraut. Ic. Tabern. hist. 1124. & Hort. Eyst. fig. 5. *Herbe st. Christofle* an feuchten Ränden rinnender Bächlein auf dem Gebürg hinter Ottrott, bey der Segmühl, *perenn.*

Chrysosplenium, foliis pediculis, longis insidentibus T. gulden Miltz-Kraut, mit langen stielechten Blättern, an fliesenden Quell-Wässerlein, hinter Haßlach. *perenn.*

Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis T. gulden Miltz-Kraut, mit kleinen rundlechten Blättern, beym Brunnen, auf dem Berg der heiligen Ottiliæ. *perenn.*

Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ fœmina Plin. T. *perpetua fronde virens, floribus amentaceis, foliis sabinæ æmulis atro virentibus fructu squamoso.* Cypressen, in denen Lust-Gärten, *le Ciprés femelle Ic. Tab. hist. 1353. perenn.*

Cupressus ramos extra se spargens, quæ Mas, Plin. T. *Ic. Mathiol. epitom pag. 52. le Ciprès masle.* ibid. *perenn.*

Equisetum arvense, longioribus setis T. sive *Equisetum minus terrestre IB. 3. 730. floribus apetalis stamineis, Presle ou queue de cheval.* Katzen-Wadel oder Kannen-Kraut, in denen Gersten und Haber-Feldern. *Ic. Tab. hist. 568. perenn.*

Equisetum palustr. majus T. *Setis longissimis. Ic. Tab. hist. 569.* groß Wasser Schacht-Halm, Handwercks-Kraut, in sumpfichten Wassern

und Gräben, auserhalb der Stadt. *perenn.*

Fumaria bulbosa radice cava major, flore rubro dilutiore T. sive *Fumaria bulbosa radice cava, flore purpurascente IB. 3. 204. polypetalo papilionaceo foliis pallide viridibus, fructu membranacea unicapsulari Ic. Tab. hist. 38. & in Rivin.* Hohlwurtzel mit purpur rothen Blumen. *Ic. Tabern. hist. 38.* in denen Hecken bey Still / hinter Sultz und auf Bergen hinter Barr. *Racine creuse. perenn.*

Fumaria bulbosa, radice cava major flore niveo T. Hohlwurtzel mit weißen Blumen Ic. IB. 3. 204. *perenn. ibid.*

Fumaria bulbosa, non cava major T. *flore purpureo, quæ Aristolochia vulgaris purpurea. Hort. Eyst.* Erdrauch, mit gantzen Wurtzeln, in Bergichten Büschen, in dem Wald zu Gambsheim. *perenn.*

Fumaria bulbosa radice non cava minor T. Kleiner Erdrauch, mit gantzen Wurtzeln, in dem Obern-Elsaß, in denen Reben, bey Türckheim. *perenn.*

Herba Paris. T. & IB. 3.613. sive Solanum quadrifolium bacciferum *repens, bucca nigra, flore herbaceo cruciformi, radice tenui multifida, fructu molli globoso.* Ein oder Wolfsbeer, *Raisin de renard Ic. Tab. hist.* 1095. in büschechten Hecken und Wäldern, in dem Pusch, bey der Eckbolsheimer Zügel-Hütte. *perenn.*

Iuncus memorosus latifolius major T. *foliis fructu unicapsulari hirsutis*, sive *Gramen sylvaticum pilosum Tab. hist.* 537. Ic. 4. groß Haricht Wald

Graß,

Graß, in Wäldern und Büschen auf dem St. Ottilien Berg. *perenn.*

Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, colore flaveſcente, ſeu flavus Ray hiſt. 116. gelbes Baummoß, in dem Ruprechtsauer Wald, auch an alten Dielen der Garten-Wände.

Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens pullus T. ſchwartz braun Baummoß in denen Waldungen an jungen Eichbäumen.

Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, verrucoſus cinereus T. Wartzen förmig ſteinmoß im Cronenthal zu Waßlenheim.

Moſchatellina, foliis fumariæ bulboſæ T. *odoratis, flore monopetalo rotato & multifido herbaceo, radicula oblonga alba fibroſa repente, fructu molli* ſive Fumaria bulboſa minima *Tab. hiſt. Ic. XI. 94. Petite musquée* in feuchten Büſchen, in denen Hecken bey Oßwald. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum T. *ſeu vernum dumetorum flore cæruleo liliaceo, radice bulboſa ſubdulci, fructu ſubrotundo.* blaue Hecken Stern-Blümlein, Bauren hyacinthen *Ic. Tab. hiſt.* 1015. in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum, flore exalbido T. Bauren hyacinthen, mit weiſſen Blumen, rarius occurrit in denen Feldern bey Arbogaſt. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum flore carneo T. auf denen Wieſen beym Mauer-Hof. *perenn.*

Ornithogalum luteum T. ſeu majus & *IB.* 2. 623.

grosse Feld = Zwiebel, mit gelben Blumen. *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 1020. *Oignon sauvage*, auf Aeckern, an der grünen Warth, bey dem Kupfer Hammer, in Herrn Horrers Garten, zu Niederhaußbergen, auf den Aeckern und in den den Reben. *perenn.*

Ornithogalum bulbosum luteum minus T. sive pannonicum, luteo flore Clus. hist. *pag.* 189. kleine Feld-Zwiebel, mit gelben Blumen, auf denen Feldern unter der Frucht, vor dem weisen Thurn, auf denen Aeckern zu Lingelsheim. *perenn.*

Ornithogalum angustifolium bulbiferum T. bey Haußbergen in den Reben häufig, wie auch auf den Aeckern zu Lingelsheim *perenn.*

Petasites major & vulgaris T. *flore flosculoso albo, folio subrotundo magno, subtus ineano, radice longa crassa amara. fructu papposo.* Pestilentz Wurtzel, großer Huflattich Ic. Tab. hist. 1316. *Petasite. perenn.*

Populus alba, majoribus foliis T. sive *Populus alba IB.* 1. 160. *vitigineis foliis, inferne albicantibus ac lanuginosis, floribus amentaceis fructu membranaceo papposo.* Aspen oder weiser Pappelbaum *Peuplier blane Ic, Tab. hist.* 1392. in denen Hecken und Zaünen, an denen, Flüssen in denen Waldungen. *perenn.*

Populus nigra T. & *IB.* 1. 155. seu officinarum, *foliis hederaceis serratis hyeme deciduis, fructu racemoso* Schwartzer Pappelbaum *Ic. Tabern. hist. pag.* 1392. & *Mathiol. Peuplier noir,*

an

an den Wasser gestaden, bey der Spithal-Mühl, ingleichen in dem Jukircher und Gansauer Wald. *perenn.*

Populus tremula T. seu Lybica *IB.* 1. 163. *& Matthiol. folio rotundo angulosoque punctatim albis notis consperso, tenuique pediculo appenso, continuo sive sese movente* Aspen oder Zitterbaum *Ic. Tab. hist.* 1392. *Niespe ou Tremble* in dem Eckbolsheimer und Brumbter Wald. *perenn.*

Primula veris, odorato flore simplici T. *& IB.* 3. 495. *hypocrateriformi & multi fido luteo, folio rugoso, radice tenui candicante, fructu oblongo* Wiesen Himmel-Schlüssel, mit wohlriechenden Blumen. *Primevere Ic. Tab. hist.* 699. auf der Gallen Matt. *perenn.*

Primula veris, pallido flore elatior. T. sive *Primula veris* cauliflora flore pallido vix odoro *IB.* 3. 496. *foliis latioribus & in acumine rotundioribus, radice crassiore fibrosa, storibus subluteis inodoris.* Wald Himmel-Schlüssel, mit bleich gelben Blumen, ohne Geruch. *Primevere sauvage IB.* 4. *Tab. hist.* 700. *& Clus hist.* 301. in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Pulmonaria Italorum, ad Buglossum accedens T. *& IB.* 3595. *flore simplici monopetalo infundibuliformi ex rubro coeruleo radicé fibrosa, est Pulmonaria* maculoso folio *Clus. hist.* CLXVIII. *& Tab. hist. pag.* 748. *Pulmonaire maculeé ou marbrée* Hirschmangold oder Lungen-Kraut mit gefleckten Blättern in denen ausgehauenen Höltzern, zu Hangenbietheim und Holtzheim. *perenn.*

Pul-

Pulmonaria folio non maculoso T. Hirschmangold ohne Flecken *Clus. hist.* CLX. *Pulmonaire sans marque* zu Truttenhaussen häuffig. *perenn.*

Pulmonaria angustifolia, flore cœruleo, folio maculoso. T. schmahl blättricht Lungenkraut mit Flecken. *Io.* 1. *Tab. hist.* 948. & *Clus hist.* CLXIX. in dunckelen Waldungen bey Hohen Landsperg *perenn.*

Pulmonaria foliis Echii T. *Ic. Lobel.* 586. sive Pulmonaria Plin. angustifol. Tab. Lungenkraut mit spitzigen Blättern, im Höltzlein zu Holtzheim. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cœruleo T. sive Trifolium hepaticum flore cœruleo *IB.* 2389. *radice nigra fibrosa*, officinis Hepatica nobilis *fructu globoso* Edel Leber-Kraut, mit blauen Blumen. *Belle hepatique. Ic. Tab. hist.* 911. & *Garidel. hist. plantar.* 415. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici violaceo. T. Edel Leber-Kraut, mit viol blauen Blumen *ibid. perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici rubro T. Edel Leber-Kraut, mit rothen Blumen auf dem Gebürg hinter Barr. Ic. 2. Tab. hist 94. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici sub purpureo, petalis cordatis profunde divisis, apicibus albis *Mapp. hist. plant.* bleich rothes Leber-Kraut mit weisen Zünglein auf dem Gebürg hinter hohen Andlau. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici

ci albo T. Edel Leber-Kraut, mit weisen Blumen, auf dem alten Berg zu Dorlisheim. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici magno albo T. Edel Leber-Kraut, mit grossen weißen Blumen, auf dem Gebürg zu Hochfeld. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici violaceo minore, apicibus albis *Mapp. hist. plant. alsat.* 259. Edel Leber-Kraut mit weißen Zünglein, auf dem Gebürg zu Barr, wird unter den gemeinen Blauen öfters gefunden, non est lusus naturæ in hort. translata, semper eodem charactere viget. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici albo, apicibus rubris T. Edel Leber-Kraut mit weißen Blumen und rothen Zünglein *ibid. perenn.*

Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum congestis spicatis T. sive Myusuros *IB.* 512. Mäuse Schwantz *queue de souris Ic. Tab. hist. pag.* 552. *perenn.* auf denen Aeckern oberhalb dem Wirths-Häusel, zwischen Lingelsheim und Ensisheim, neben denen Wasser Gräblein und weiters hinauf gegen Ensisheim an denen Gräblein der Frucht. *perenn.*

Tussilago vulgaris T. & *IB.* 3. 563. *fructu papposo flore luteo radiato Ic. Tab. hist.* 1-316. *Pied de cheval.* Roßhub, Huflattich, auf feuchten Aeckern bey Illkirch und zu Brischwickersheim *perenn.*

Viola martia purpurea, flore simplici odo-

ro

10 T. *fructu trigono. Violette de Mars* Ic. 1. *Tab. hist.* 608. *polypetalo flore simplici odoro anomalo, radice fibrosa repente* Wohlriechende Mertzen Violen, in grasichten Orten und an denen Ränden der Zäunen. *perenn.*

Viola martia alba §. *Ic.* 2. *Tab. hist.* 680. Weise Mertzen Violen, in denen Hecken, in dem Jlkircher Wald. *perenn.*

Viola martia sylvestris inodora T. *foliis mucronatis oblongis & strictioribus, flore coeruleo. Ic.* 5. *Tab. hist. pag.* 681. Hunds Violen, Wald Violen, mit grossen ablang runden Blättern und blaß blauen Blumen ohne Geruch *Violette de bois.* auf der Metzgerau und sonst vielen andern Orten. *perenn.*

Viscum baccis albis T. *flore monopetalo quadrè partito viridi, bacca glutinosa foliis, oblongis conjugatis angustis.* Vogelberen, aus welchen der Vogelleim præparirt wird, wächst fast an allen Bäumen, offt auch auf den Eichbäumen. Mispel *Tab. hist. plant. pag.* 1376.

Ulmus campestris & Theophrasti T. sive Ulmus *IB.* 1. 139. *folio lato scabro, leviter serrato, atque oblongo, floribus monopetalis campaniformibus* Rustbaum, Rusten Orme *Ic. Tab. hist.* 1394. in Wäldern und auf allen Wällen der Stadt. *perenn.*

Ulmus folio latissimo scabro T. sive Ulmus altera latifol. Lob. p. 2. p. 189. Berg Rusten odee Steinlinden mit beyderseits rauhem Laub auf dem Hochfelder Gebürg und Waldungen zu Oberbron, in denen Hecken der Land-Strasse nach dem Mauer-Hof unterhalb. *perenn.*

Ul-

Ulmus minor folio angusto scabro & *Ray. p.* 1426. T. Rusten mit einem harten schmahlen Blatt, an denen Aeckern neben dem Illfluß gegen Ostwald. *perenn.*

Ulmus folio glabro T. & *Ray, p.* 1426. Weißrusten mit beyderseits glatten Blättern ibidem und in dem Illkircher Wald.

MENSIS.

APRILIS ET MAJUS.

Acer campestre & minus, T. sive Acer vulgare, minori folio *IB.* 1. 166. *foliis minoribus lævibus laciniatis seu angulosis, floribus rosaceis ex viridi flavescentibus, fructu gemino alato Ic.* 2. *Tab. hist.* 1386. Maßholder *petit Erable* in denen Hecken und Püschen aller Orten. *perenn.*

Agaricus lichenis facie variegatus T. qui *à loco natali apud nos Fungus salignus venenosus audit, Clusio in hist. est III. genus pernicioſorum fungorum CCLXXII.* Felber Schwamm nostratibus, Weiden Schwamm, an denen alten Weiden-Bäumen, in dem Früh-Jahr.

Alsine verna glabra, floribus umbellatis albis T. rosaceis, *fructu unicapsulari*, sive *caryophyllus arvensis umbelliferus IB.* 3. 361. Holosteum Caryophylæum arvense *Ic.* 2. T*ab. hist.* 543. weiße Acker Nägelein, auf denen Aeckern, hin und wieder, bey Schiltigheim, in der Ruprechtsau.

Alsine media T. *seu vulgaris flore albo rosaceo, foliis ex adverso binis, radice alba fibrosa,* gemeiner

ner Hünerdarm oder Voget-Kraut. *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1087. *Morgeline. annua.*

Alsine pratensis gramineo folio ampliore T. *flore albo simplici rosaceo* sive Gramen Fuchs. vel Leucanthemum *IB.* 3. 361. est Gramen floridum majus *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 542. Weiß Nägelein Graß, aller Orten in Wäldern, häuffig in dem Eckboldsheimer Wald. *ann.*

Alsine pratensis gramineo folio angustiore T. f. Gramen floridum minus. *Ic.* 2. *Tab. hist.* 542. Klein Blumen Graß auf der Metzgerau, auf denen Wiesen über der Hohenwart zwischen denen Wassern. *ann.*

Alsine pusilla pulchro flore tenuissimo, nostras, seu Saxifraga caryophylloides pusilla, flore albo pulchello *Ray hist.* 1033. *radice alba repente* in grasichten Orten, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *ann.*

Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis T. *flore albo* gar kleiner Spurey, auf dürren sandigen Aeckern in der Ruprechtsau und zu Hördt. *ann.*

Eadem *seminibus nudis* T. an kleinen Hügeln bey Gemar, in dem Graß.

Alyssum fruticosum T. sive Thlaspi capsulis sublongis, incanum *IB.* 2. 919. an sandigen Zäunen zwischen Hagenau und Weissenbarg. *perenn.*

Alyssum Veronicæ folio T. sive Bursa pastoris major, loculo oblongo, flosculis albis, cruciformibus, radice tenui alba filamentosa, *fructu unicapsulari CB. prodr. pag.* 50. & *Zwinger. Theatr.*

Theatr. botan. Täschel-Kraut, mit Ehrenpreiß Blättern, auf denen sandigen Feldern zu Bischweyler, zu Oberbron, an denen Rändern der Reben. *ann.*

Amygdalus sativa T. *fructu majore dulci, foliis persico similibus, flore simplici rosaceo suave rubente Ic. Tab. hist.* 1410. süsser Mandelbaum, *Amandier doux*; hin und wieder vor der Stadt, in Gärten und Weinbergen. *perenn.*

Amygdalus dulcis, putamine molliore. T. süsser Mandelbaum, mit Früchten weicher Schalen, Beiß-Mandeln *perenn. in horto medico.*

Amygdalus amara T. Mandelbaum mit bitterer Frucht, *Amandier amere.* ibid. *perenn.*

Amygdalus Indica Nana H. R. P. *Ic. Munting. histor. plant.* 34. Niedriger Mandelbaum ibid. *perenn.* in hybernac.

Asarum vulgare T. & IB. 3. 548. *flore apetalo subrufo, folio subrotundo, pingui, atro, virente, fructu anguloso multicapsulari Ic. Tab. hist.* 1129. Haselwurtzel, *Nard sauvage*, in schattichten Höltzern, bey Blobsheim und im Schwindelsheimer Wald.

Asarum americanum majus *Hort. Reg. Par.* seu *Asarum Cornut. Canadense.* 24. *foliis vulgari latioribus & dilute virentibus, radice repente,* Grosse Americanische Haselwurtz, per me satum luxuriose viget auf dem Haulenberg.

Boletus esculentus in metam fastigiatus T. est 1. gener. fungor. escul. spec. IV. *Clus. histor.* CCLXIII. Spitz Morcheln, roth gelbe Maulbeer Morchel.

Boletus phalloides T. ſive XXIII. generis pernicioſor. fungor. 5. ſpecies *Clus. hiſt.* CCLXXXVI. eſt Fungus penis imaginem referens, CBP. in feuchten Wäldern, und ſumpfichten Wieſen, Gicht Schwamm, auf Matten und Waldungen bey Linßweyler. *ann.*

Calamintha humilior, folio rotundiore T. *flore ſimplici, purpureo, monopetalo, labiato, officinis Hedera terreſtris* & IB. 3. *app.* 855. *radice repente fibroſa*, Gundelreb oder Gundermann *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 1280. & *in Rivin. Lierre terreſtre*, allerwegen an denen Hecken und Zäunen. *perenn.*

Calamintha humilior, folio rotundiore minor & elegantior T. *Ic. Vaillant. Tab. VI. fig.* 5. & 6. kleine Gundelreb. ibid.

Cardamine IV. Dalechamp. Lugd. 659. vel Naſturtium aquaticum minus CBP. ſive Siſymbrium cardamine hirſutum minus flore albo IB. 2.888. *cruciformi fructu ſiliquoſo*, gar kleiner Waſſer Kreſſe, in ſchattichten feuchten Wäldern.

Caryophyllata vulgaris T. *flore parvo, luteo, roſaceo*, IB. 2.398. *foliis pinnatis, radice tenui, ſubrufa, bene ſpirante, fructu globoſo* Benedicten oder Merkwurtzel *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 326. & *Lobel. Ic.* 693. *Benoitte*, aller Orten in denen Hägen und Zäunen. *perenn.*

Caryophyllata vulgaris, majore flore T. Benedicten Wurtzel, mit groſſen gelben Blumen, *Ic. Fuchs. hiſt.* 385. auf denen Wieſen, bey Andlau häufi. *perenn.*

Caryophyllata aquatica, flore nutante T. *rubro*

rubro ſtriato IB. 2.398. *purpuro palleſcente, ſtriato, roſaceo, radice longa & denſa, ſed minus fibroſa purpurascente amariuſcula,* Ic. 2. *Tab. hiſt.* 326. *Benoite aquatique,* Waſſer Benedicten Kraut, mit hangenden Blumen, auf feuchten Wieſen des kleinen Hochfelds gegen Lotharingen *perenn.*

Ceraſus major ac ſylveſtris, fructu ſubdulci, nigro colore inficiente T. ſive Ceraſus ſylveſtris fructu nigro *IB.* 1. 220. *flore ſimplici albo roſaceo, Meriſier,* ſchwartze ſüſſe wilde Kirſchen, in der Ruprechtsau *unde fructus apud nos audiunt* Ruprechtsauer Kirſchen, in dem Jukircher und Ganßauer Wald. *perenn.*

Ceraſus fructu albo dulci T. weiſſe ſüſſe Kirſchen, auf Brach-Ackern bey Jukirch, auch häuffig auf dem Gebürg hinter Barr. *perenn.*

Ceraſus fructu parvo rubro amaricante, Mapp. hiſt. ſive Ceraſus ſylveſtris fructu rubro *IB.* 220. wilde rothe Wald-Kirſchen, in dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Ceraſus fructu acido ſerotino, ſucci ſanguinei T. Amarellen Baum *Ic.* 4. *Tab. hiſt.* 1399. an denen Wegen vor dem Spithal-Thor, und in denen Gärten.

Ceraſus racemoſa ſylveſtris, fructu non edulli nigrominore, T. ſive *Padus IB.* 1. 228. Elſen Beeren Baum, ſchwartze Vogelkirſchbaum. *Bois de Lucie* XI. II. *Tab. hiſt. plant.* 1401. *perenn.*

Ceraſus pumila fructu rubro minore, ſive Chamæceraſus fructu rubro *Tab. hiſt. Ic.* 12.

1401. kleiner wilder Kirschbaum, Erd Weixelbaum, auf dem Hochfelder Gebürg. *perenn.*

Cerasus sylvestris amara Mahaleb putata *IB.* 1. 227. & *Tab. hist.* 1402. *Grenouillier* Steinkirschen, Dintenbeeren, bey Rheinau an dem Rhein. *perenn.*

Cerasus major fructu magno cordato T. sive *Cerasa Pliniana Tab. hist. Ic.* 1399. Hertzkirschen, *Bigarotier* in Gärten. *perenn.*

Cyperoides nigro luteum vernum majus, T. sive Graminis nigro lutei verni varietas major *IB.* 2. 494. *floribus apetalis in spicam congestis*, frühblühendes schwartz gelbes cypern Graß, bin und wieder auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cyperoides sylvarum spica varia, Garidel *caule triquetro fructu triangulo Scheuchzer. Agrost. pag.* 448. *Tab. X. Fig.* 14. in abgehaueuen Höltzern in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Cyperoides nigro luteum vernum minus T. früh blühend kleines cypern Graß, mit schwartz gelber Aehre *Ic. IB.* 2. *pag.* 494. auf dürren Wiesen, gegen Oßwald. *perenn.*

Cyperoides spicis variis nemorense T. Nelcken Graß in Büschen und Wäldern in dem Illkircher Wald *Ic. CB. prodr.* 2. *pag.* 9. *perenn.*

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis è rarioribus & tumidioribus vesicis compositis T. auf tiefen und feuchten Wiesen, in der Rusprechtsau. *perenn.*

Dens leonis folio latiore T. sive Hedypnois, vel Dens Leonis *Fuchs. IB.* 2. 1035. *flore luteo com-*

composito semi flosculoso, vulgo Taraxacum officinarum, Löwen Zahn, Pfaffenröhrlein, Seichblumen, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 481. *Pisenlit*, auf allen grasichten Böden und Rändern *perenn.*

Dens leonis ampliſſimo folio *T. obtuso* breitblättrichter, vornen zu ſtumpfer Löwen Zahn, *ibid. perenn.*

Fagus T. Oxya græcorum *IB.* 1. 117. roth Buchen, *floribus amentaceis glomeratim positis Ic. Tab. hist. pag.* 1388. in denen Wäldern um die Statt. auf dem Gebürg zu Oberbron. *perenn.*

Fragaria ſterilis T. *ſeu non fragifera, flore ſimplici albo roſaceo, foliis hirſutis.* vel non veſca *IB.* 2. 395. falſch Erdbeer Kraut *Ic. Lob.* 395. häufig in dem Eckboltzheimer Wald. *perenn.*

Fraxinus humilior, ſive altera Theophraſt. minore & tenuiore folio T. *IB.* 1. 177. Stein oder Bacheſche, auf dem Hochgebürg Rappoltſtein. *perenn.*

Fraxinus excelſior T. ſive vulgatior *IB.* 1. 174. *floribus ſubluteo purpureis apetalis, foliis pinnatis ac crenatis, ſemine acri linguam exprimente, Ic. Tab. hiſt.* 1428. *Fréne* an der Landſtraſſe gegen Illkirch, in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Fungus pileolo rotundiori *Mouceron* dictus T. ſeu eſculentus *IB.* 3. 823. Dorn Schwamm in dem Ganſauer und Illkircher Wald.

Fungus orbicularis exalbidus pratenſis Haller. quod III. genus clus. hiſt. Fungor. eſculent. CCLXIV. Mayſchwamm, Weißling, zu Oßwald.

Geranium Cicutæ folio inodorum, T. Storchenschnabel, mit Schierlings Blättern, neben dem Weg, gegen der Aubruck, und sonst auf Aeckern, in der Ruprechtsau, est Geranium inodorum H. Eyst

Gramen spicatum, glumis variis, T. sive Gramen versicolor *IB.* 2. 466. auf denen bergichten trockenen Orten, zu Rappolstein *perenn.*

Hesperis sepiaria allium redolens T. sive Alliaria Math. *IB.* 2. 883. *flore, albo simplici cruciformi, folio lato serrato radice longiuscula* Ic. Tab. hist. pag. 1144. Hecken Knoblauchkraut, an allen Zäunen *ann.*

Juncus villosus capitulis psyllii T. sive Gramen cyperinum pilosum *Tab. hist. Ic.* 2. *pag.* 532. est Gramen exile hirsutum cyperoides *Lob. IB.* 2. 493. haricht cypern Graß hinter Baar auf dem Gebürg. *perenn.*

Lamium alba linea notatum T. *flore albo. simplici monopetalo labiato, folio oblongo, radice fibrosa Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 923. *& Garidel hist. plant. Tab.* 58. todte oder taube Neßel, mit bezeichneten Blättern, oder weisen Strichen. *Ortie mort, à raies blanches.* auf dem Spital-Wall, und andern Orten mehr. *perenn.*

Lamium alba linea notatum, flore purpureo simplici, taube Neßeln, mit gestriften weisen Blättern, und rothen Blumen. *perenn. ibid.*

Lamium foliis caulem ambientibus majus flore rubro, grosse Acker Neßel, mit rothen Blumen *Ic. Tab. hist. XII.* 1090. *& in Rivin. non est varietas*

rietas mente Mapp. auf allen Aeckern. *ann.*

Lamium folio caulem amplectente minus T. sive *Galeopsis iners minor IB.* 3. *app.* 853. Galeopsis folio caulem ambiente *Rivin Ic.* 1. kleine todte Ackernesel, mit rothen Blumen *ibid. ann.*

Utrumque quandoque invenitur floribus albis, sed rarius.

Lamium folio oblongo, flore rubro T. sive Galeopsis iners flore purpurascente majore, folio non maculato *IB.* 3. 321. taube Nesel mit langlichten Blättern und rothen Blumen *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 903. aller Orten auf denen Wällen und an denen Zäunen. *perenn.*

Lamium vulgare album T. sive Lamium folio oblongo non maculato non fœtido, flore albo, est Galeopsis iners floribus albis *IB.* 3. 322. *Ortie blanche morte* todte weise Nesel, Weiber-Nesel *quia floribus uti solent ad compescend. fluorem album* est Lamium verum Plin. *ibid. perenn.*

Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo seu Galeopsis Dioscor. T. Galeopsis sive Urticà iners folio & flore minore *IB.* 3. 321. vel Galeopsis minor Rivin. rothe stinckende taube Nesel, mit rundlechten Blättern, an denen Zäunen aller Orten. *ann.*

Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo minus, H.L.B. *Ic. in Rivin.* auf denen Aeckeren bey Schiltigheim und Oßwald. *ann.*

Leucojum luteum vulgare T. *flore simplici cruciformi sive* Keiri officinar. *Violette jaune* gelbe

gemeine Nägelblum, Ic. Clus. hist. 299. hin und wieder in Gärten,

Leucojum hesperidis folio T. sive Turrita major Plateau, *Clus hist. CXXVI.* Turritis 2. *Clus.* & *IB.* 2. 836. zu Oßwald in den Ostwinckel häufig.

Leucojum vernum perenne album majus T. quod Draba II. Clus. hist. CXXV. *sive* Hesperis alpina, aut muralis minor, repens *IB.* 2. 880. *foliis incisis, imis per terram sparsis hirsutis & asperis, è principio radicis angustis, ad extremum autem sensim sensimque latioribus, stosculis cruciformib. pallide cæruleo albicantibus, siliquis longis, radice alba lignosa,* est Hesperis saxatilis Tournef. alsat. ubi *Ic. pag.* 130. kleine weise Stein-Leucojen, auf dem Berg der heiligen Ottiliæ.

Linaria hederaceo folio glabro T. seu Cymbalaria vulgaris, *stosculis purpurascentibus, monopetalis, labiatis, radice tenui., Ic. Rivin. & IB.* 3. 685. *Linaire de Muraille,* an denen alten Mauren der Stattgräben. *perenn.*

Mercurialis testiculata montana T. *sive* Cynocrambe Mas, vel mercurialis, *IB.* 2. 979. *repens floribus apetalis viridibus trilobatis, radice alba Ic. Tab. hist.* 942. *Mercuriale sauvage de montagne ou Chou de Chien, per me sata copiose provenit* auf dem Haulenberg, Bingelkraut Männlein, auf dem Hochgebürg hinter Haßlach, gegen Niederb. *perenn.*

Mercurialis montana spicata T. repens vel *Cynocrambe fœmina florib. amentaceis fructu bicapsulari* IB. 2. 979.

2. 979. & *Tab. hist. pag.* 942. Wald oder Berg-Bingelkraut Weibl. in dem Barrer Wald-Weg, bey der ersten Ertzgrub. *perenn.*

Morus fructu nigro T. *flore subluteo amentaceo conglomerato Ic. Tab. hist. pag.* 1390. *Meurier noir* Maulbeerbaum, mit schwartzer Frucht, auf dem Schießreiner Wacken.

Morus fructu albo T. Maulbeerbaum, mit weiser Frucht. *Meurier blanc Ic. Tab. hist. pag.* 391. *ibid copiose.*

Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore, T. sive Auricula muris, parvo flore albo IB. 3. 360. *rosaceo albo, fructu unicapsulari,* sive Holosteum Caryophylæum *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 543. & *Vaillant Ic.* 4. *Tab.* XXX. weiß Nägelein Graß, weise Acker Negelein, *Oreil de souris.* zu Oßwald an denen Aeckeren, in der Contrescarpe am Steinstrasser Thor *perenn.*

Myosotis arvensis hirsuta parvo flore T. sive Myosotis arvensis folio subrotundo hirsuto, flore parvo albo rosaceo, quæ Auricula muris quorundam flore parvo, *vasculo tenui longo* IB. 3. 359. & Vaill *Ic.* 3. *Tab.* XX. kleine Acker Negelein, mit ablang runden harichten Blättern, gegen der Hohenwart und Schnackenloch über, am Weg, wie auch an denen Wegen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Myosotis hirsuta altera viscosa T. *flosculis albis, rosaceis* glebichter Acker Hüner-Darm *Ic.* 1. *Vaillant Tab.* XXX. an denen Wegen gegen Eckbolsheim, und auf Ackern in der Ruprechtsau.

Myosotis hirsuta minor T. *flore albo.* Kleiner harichter Hüner-Darm, *Ic.* 2. *Vaill. Tab.* XXX. auf dürren Wiesen auf der Gansau.

Napus sativa T. *flore simplici luteo cruciformi, radice rapacea alba, fructu siliquoso* Saat oder Steckruben. *Ic. Matth. comment.* 398. *Naveau* auf denen Aeckern *ann.*

Napus sylvestris T. *flore luteo radice crassa & longa, acri amaricante* sive Napus seu Bunias sylvestris flore luteo. *Lob. Ic.* 200. & *Matthiol. Epitom.* 220. wilde Steckruben *cujus semina à nostratibus appellantur.* Rebssaamen, *Navet sauvage,* auf denen Aeckern um die Statt. *ann.*

Nasturtium petræum, foliis bursæ pastoris T. *glabris, flore simplici cruciformi albo, capsulis latis, radice tenui fibrosa, Ic. Tab. hist.* 842. sive Pastoria bursa minima *Lobel. Icon.* 221. vel Bursa pastoris parva, folio glabro spisso *Ic. IB.* 2. 937. Stein oder Bergkresse, *Cresson de Montagne.* zwischen denen Fugen alter Schlösser, häufig auf dem alten Bergschloß, zu Rappolstein.

Omphalodes pumila verna symphyti fol. T. *flore monopetalo caerul. rotato* sive *Symphyt.* pumilum repens, vel Borrago minima herbarior. *IB.* 3. 597. in Gärten und auf dem Haulenberg.

Orchis trifolia major T. sive Triorchis trifolia *Ic. VII. Tab. hist.* 1059. *Couillon de Renard,* Berg-Knaben-Kraut, mit 3. Wurtzeln, auf dem Gebürg im Steinthal. *perenn.*

Orobus sylvaticus vernus T. *flore purpureo simplici papilionaceo, siliquis erectis, foliis latioribus pinnatis,*

natis, radice longa fibrosa fructu tereti siliquoso, frühzeitige Wald-Erbsen, est Orobus Rivin & *Clus hist. Ic.* I. *pag.* CCXXX. *sub nomine* Orobi Pannon, im Oberneheimer Wald, bey der Gänßburger Melckerey, in dem Barrer Wald. *perenn.*

Oxys flore albo T. sive *Trifolium acidum, flore alb.* IB. 2. 387. *flore albo monopetalo campaniformi multifido, radice oblonga fibrosa, fructu oblongo,* Sauerklee, mit weisen Blumen, Buchampfer, *Alleluja á fleur blanche* Ic. 1. Tab. hist. 910. in dem Oberehenheimer und Barrer Wald.

Oxys flore purpurascente T. sive Trifolium acidum flore purpurascente *IB.* 2, 387. *Alleluja à fleur purpurine,* Sauer Klee, mit röthlichten Blumen. *ibid.*

Persica molli carne & vulgaris viridis & alba T. *floribus rosaceis incarnatis, foliis oblongis serratis & amaris, fructu molli, ossiculo fœto* gemeiner Pfersich-Baum, *Pecher de montaigne* Ic. 1. *Tab. hist.* 1408. aller Orten in Gärten, und in denen Weinbergen *perenn.*

Persica succo quasi sanguineo T. sive *Persica rubra extus lanuginosa. Tab. hist. Ic.* 1408. Blut oder roth Pfersichbaum *ibid. perenn.*

Persica dura carne buxea T. gemeiner Feld Pfersichbaum, mit kleiner harten und gelben Frucht. in denen Weinbergen.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore cœruleo T. sive Clematis Daphnoidis, minori flore cœruleo simplici IB. 2. 130. *monopetalo infundibuliformi, fructu siliquoso.* Sinngrün Todten-Blu-

Blumen *Ic. Tab. hist. pag.* 1270. *Pervenche à fleur bleue*, an dem Hag hinter St. Gallen, bey St. Helena, an denen Zäunen. *perenn.*

Pervinca vulgaris anguſtifolia flore albo T. & IB. 2. 130. Sinngrün, mit weiſen Blumen, *Pervenche à fleur blanche* in dem Foren Wäldlein gegen Enſisheim. *perenn.*

Polygaloides Haller. *humilis, foliis imis ſubrotundis, ſuperioribus peranguſtis lineæ deſignatis, flore oblongo flaveſcente papilionaceo, colluteæ ſimili, macula ochroleuca inſignito, ſiliquis cordatis, burſa paſtoriæ æmulis* ſive Chamæbuxus flore coluteæ CB. eſt Pſeudo chamæbuxus *H. Eyſt.* vel Anonymos Clus hiſt. 105. kleiner wilder Buchs, auf dem Hochfelder und Waſſenburger Gebürg.

Prunus ſylveſtris T. & IB. 1. 193. ſeu Acacia germanica officinar. *flore ſimplici albo roſaceo odoro, fructu ex cæruleo nigricante*, Ic. *Tab. hiſt.* 1405. *Prunier ſauvage.* Schlehen Hecken, oder Schlehendorn, faſt aller Orten in denen Hecken und Zäunen.

Prunus ſylveſtris præcox altior. HRPar. Pruna avenaria Haber Schlehenbaum *Ic. Tab. hiſt.* 1403. beym Mauerhof, in denen Hecken Ruprechtsauer Wald, an dem Rhein *perenn.*

Pulſatilla folio craſſiore & majore flore T. *purpureo ſimplici roſaceo; radice oblonga fibroſa ſubdulci Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 8. ſive Pulſatilla purpurea cœrulea *IB.* 3. 409. *Coquelourde, à fleur bleue*, blaue Kuchen Schellel, noſtratibus Oſterblum,

blum, auf der Heyde zu Oßwald häufig. *perenn.*

Pulsatilla flore rubro obtuso, fructu multicapsulari T. sive Pulsatilla rubra *IB.* 3. 410. & *Lob.* Ic. 282. Kuchen Schelle, mit rothen Blumen *Coquelourde, à fleur purpurine.* auf der Gansau, bey dem krümmerich, auf den Wiesen bey Marlenheim.

Quinquefolium majus repens T. sive Quinquefolium vulgare rapens *IB.* 2. 397. *floribus rosaceis auro æmulis, radice subrufa oblonga repente fructu globoso. Ic.* 4. *Tab. hist. pag.* 351. *Quintefeuille.* gemein 5. Finger Kraut, auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, an denen Wegen, und anderen sonnenreichen Orten und Reinen der Weinberge. *perenn.*

Quinquefolium majus album alterum T. sive 1. *majus albo flore clus. hist. CV.* weiß wild 5. Finger Kraut, est Pentaphyllum flore albo *IB.* 2. 598. & *H. Eyst.* auf dem Wassenburger Gebürg, bey Oberbronn, auf Bergmatten bey Lichtenberg *perenn.*

Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum T. flavo colore 1. species *Clus hist. CVI.* seu Pentaphyllum minus, molli lanugine pubescens, flore luteo *IB.* 2. 598. auf dem Gebürg, hinter Rappolsweiler *perenn.*

Quinquefolium minus repens luteum T. est *Quinquefolium minus Tab. hist. Ic. XIII. pag.* 354. seu Pentaphyllum parvum hirsutum IB. 2. 398. klein harricht 5. Finger Kraut, hin und wieder an denen Strassen und Hügeln *perenn.*

Ranun-

Ranunculus phragmites albus vernus T. *flore simplici rosaceo, radice ruffa repente*, wilder weisser Wald oder Hecken Hahnen-Fuß, *Ic. Tab. hist.* 8. *pag.* 109. *Grenouillete blanc, de bois* in dem Eckbolsheimer Wald.

Ranunculus phragmites purpureus vernus T. rother Wald oder Hecken Hahen Fuß, *Renuncle de bois à fleur purpurine*, zu Oßwald im Ostwinckel. *Ic. Tab. hist.* IX. *pag.* 109. *perenn.*

Ranunculus phragmites luteus, *flore minore modo simplici, modo gemello.* gelber Wald Hahnen Fuß, *Renoncle de bois, à fleur jaune.* bey Oßwald sehr häufig, und auf dem Gebürg St. Ottiliæ. *perenn.*

Ranunculus nemorosus folio rotundo T. *fructu globoso vel Sylvaticus, foliis inferioribus rotundis, superioribus floribus proximis valde angustis, laciniis dissectis luteis.* est Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus *IB.* 3. *app.* 857. Süeser Wald Hahnen-Fuß, *Renoncle de bois à feuilles rondes Ic.* II. *Tab. hist. pag.* 117. *perenn.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phœniceo T. *fructu globoso* seu Flos Adonis Matthiol. Eptim. 647. & *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 72. hoch rothe Feld- oder Acker-Rößlein, in denen Feldern unter der Frucht *ann.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli flore citrino T. qui Adonis flore luteo *Tab. hist. Ic.* 2. 72. gelbe Feld-Rößlein, in denen Frucht Feldern bey Niederhaußbergen, wie auch zwischen Lingols- und Ensisheim. *ann.*

Ranun-

Ranunculus pratensis erectus acris T. *non repens, flore luteo simplici* IB. 3. 416. *folio napello simili, radice alba fibrosa Ic.* II. *Tab. hist. pag.* 107. est Ranunculus pratensis surrectis cauliculis *Lob. Ic.* 665. *Renoncule piquant des prez.* brennender Wiesen Hahnen Fuß. *perenn.*

Ranunculus pratensis acris erectus & maculatus, T. radice alba non repente brennender Hahnen-Fuß mit gefleckten Blättern. prioris est varietas. *perenn.*

Salix latifolia rotunda T. sive Salix caprea rotundifolia *Tab. hist. Ic.* III. 1452. *foliis inferne hirsutis* IB. 1. 215. *floribus luteis amentaceis suavealentibus* Palm oder weiß Weyden. *Marceau.* in denen Hecken gegen Oßwald, neben dem Canal am Eckbolsheimer wald. *perenn.*

Salix vulgaris alba arborescens T. sive *Salix maxima fragilis hirsuta* IB. 1. 212. *floribus luteis spicatis in pappum abeuntibus, foliis superne virentibus, inferne candicantibus utrinque hirsutis, vix serratis, cortice cinereo. Saule.* est Salix Dioscorid *Lob. Ic.* 136. Pfahl oder weise Baum Weide, an denen Wassern und an denen feuchten Orten. *perenn.*

Salix vulgaris nigricans folio non serrato T. seu Phœnicea Lugd. 277. *quæ rubra & minus fragilis, folio longo angusto, subtus nonnihil candicante* IB. 1. 215. rothe Baum, oder Seilweide, Koromacher Weide Ic. IB. 1. 215. & *Lugd.* 277. *perenn.* an dem Canal an der Breusch, und anderen Orten mehr.

Salix vulgaris rubens T. *foliis longis & angustis*

stis quæ Salix Amerina Lugd. 714. rothe Kiefer oder Baumweide, oberhalb der grünen Warth, am meisten in denen Baumgärten Ozier. *perenn.*

Salix aurita & non aurita, folio amygdalino utrinque virente T. quæ latifolia sylvestris *It.* 1. *Tab. hist.* 1452. & *fragilis*, mürbe Bruchweide, Roßweide, fast an allen Wasserbächen *perenn.*

Salix oblongo incano acuto folio T. *foliis angustis & longissimis crispis, subtus albicantibus* I B. 1. 212. Spitzweide, mit langen krausen Blättern, an dem Canal, copiose, an der Ill, gegen den Wasser über. *perenn.*

Salix humilis capitulo squamoso T. quæ *fragilis, folio minore angusto, utrinque glabro sub cæruleo,* est Salix tenuior, folio minore I. B. 1. 213. *seu Salix helice* Theophrasti *Lugd.* 277. kleine Sumpf- oder Rhein-Weide, an dem Rhein, vor dem Spithal-Thor, unten in der Tiefe *perenn.*

Salix latifolia repens T. Erd oder Kriechende Weide *Ic. V. Tab. hist. p.* 1453. in tiefen Gruben, neben dem Canal. *perenn.*

Salix fragilis T. seu spontanea, *Julis brevibus, folio angusto, prona parte incano, superius atrovirente, cortice albo.* Bruch oder Glaßweide, in sumpfichten Orten, und oberhalb der grünen Warth. *Perenn.*

Salix pumila, foliis utrinque canticanbus & lanuginosis T. kleine weiß oder Bruchweide, aller Orten auf feuchten Wiesen bey Oßwald, in der Ruprechtsau in den XV. Wört. *perenn.*

Salix

Salix folio ex rotunditate acuminato T. sive Aquatica seu Caprea latifolia *Tab. hist. pag.* 1452. Kätzelweide, Holweide, mit rundlechten und etwas zugespitzten Blättern; in feuchten Gräben, an dem Ilfluß, gegen Arbogast, ist die erste die ausbricht, wovon die jungen Knaben die Frühlings-Pfeiffen zubereiten. *perenn.*

Salix sativa lutea, folio crenato T. *flore amentaceo, seu Viminea angustifolia sylvestris, cortice luteo, est* Salix vulgatissima. gelbe Band-Weide *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1452. an dem Eckbolsheimer Canal, und auf allen Band-Plätzen. *perenn.*

Salix folio longo, angustissimoque, utrinque albido T. sive Elæagnus Dalechamp. *Lugd.* 278. Weide, mit den schmählesten und längsten beyderseits weisen Blättern, in der Wantzenau auf denen Rheinwörten.

Sambucus racemosa rubra T. seu *acinis rubris IB.* 1551. *fructu globoso floribus ex albido flavescent. monopetal. rotatis multifidis* sive Montana racemosa *Lob. hist.* 163. & *Tab. hist. Ic.* 3. 1440. *Sureau de Cerf.* Wilder edler Hirschholder, auf denen Bergen, in feuchten dunckelen Orten, auf dem St. Ottilien Gebürg. *perenn.*

Saxifraga alba rotundifol. T. sive Saxifraga alba radice granulosa *IB.* 3. 706. *flore albo rosaceo foliis parvis subrotundis pinguibus, radice granulosa fructu subrotundo bicapsulari Ic.* 1. *Tab. hist.* 1222. Saxifrage, weiser Steinbrech, auf der Wiese, beym Eckbolsheimer Ziegelofen. *perenn.*

Saxifraga verna annua humilior T. sive Tridactylites

lites tectorum, flore albo *IB.* 3. 762. *simplici rosaceo, folio rutaceo, radice fibrosa.* Frosche Daßen, Händlein Kraut, kleiner weiser Steinbrech *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1088. auf allen unsauber gehaltenen Tächern, auf alten Mauren. *ann.*

Sinapi album, siliqua hirsuta; semine albo & rufo, *flore cruciformi fructu siliquoso* T. *Ic. IB.* 2 856. *Moutarde* gelber Senf, Garten Senf, auf den Dörfern, hin und wieder auf den Aeckern, mit weisen Körnern. *ann.*

Sinapi rapifolio T. quod *Sativum seu vulgare, siliqua latiuscula glabra, semine ruffo.* IB. 2. 855. gemeiner wilder brauner Senf, mit braunen Körnern, neben denen Aeckeren, hinder Gunders Hofen. *ann.*

Sorbus sativa T. *flore rosaceo albo racemoso, fructu carnoso oblongo,* Eschen Rößlein Baum *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1426. *Sorbier,* in dem Gebürg und Waldungen zu Osthofen, wie auch zu Niederbronn. *peren.*

Taxus T. & IB. 1. 241. *floribus amentaceis luteis, foliis abieti similibus pinnatis, fructu rubro glutinoso, molli pulposo Ic. Matth.* 414. & *Epitome* 540. Ibenbaum, Tarbaum, lf. in dem Niedecker-Thal am Bach, und sonst in hohen schattichten Waldungen: *perenn.*

Thlaspi arvense perfoliatum majus T. sive *Bursa* pastoria, foliis perfoliatæ IB. 2. 938. *flosculis albis cruciformibus* est *Thlaspi oleraceum* Tab. *hist. Ic.* 9. 851. Bauren Senf, mit durch Wachs-Blättern, auf steinichten Aeckern und in Weinbergen. *ann.*

Thlaspi

Thlaspi perfoliatum minus T. kleiner Bauren Senf, mit durchwachs Blättern *Ic.* 19. *Tab. hist.* 854. est Thlaspi III. pumilum, Clus. hist. CXXXI. *ann.*

Thymelæa alpina linifolio humilior, flore monopetalo purpureo *infundibuliformi* odoratissimo T. *fructu ovato*, sehr wohl riechender Kellerhals, auf dem Hochgebürg Hochfelden. *Ic. Matthiol. sub nomine Cneorum, pag.* 42. *perenn.*

Thymelæa laurifolio deciduo, sive Laureola fœmina, *fructu ovato* T. sive Mezereum Germanicum *IB.* 1. 566. Seidelbast, Kellerhalß, auf der Gansau, und in dessen Wald, wie auch im Wald zu Ilkirch *Mezereon. perenn.*

Thymelæa laurifolio semper virens, seu Laureola major T. sive Laureola semper virens flore luteolo *IB.* 1. 564. *Laureole & Tab. hist.* 1488. Seidelbast oder Kellerhalß, mit immer zu grünenden Blättern, in dem Ganßauer Wald. sed rarissime.

Tithymalus cyparissias T. sive Tithymalus cupressinus sive humipinus *Lob. Ic.* 356. est Esula officinarum, *flosculis luteis monopetalis campaniformib. globosis divisis, radice longa fibrosa, fructu multicapsulari* Wolfs oder Teuffels-Milch, *Ic. Tab. hist.* 990. quæ Esula Rivini, *Titimale*, auf ungebauten Oertern, auf der Metzgerau und in der Ruprechsau *perenn.*

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T. *Ic.* 12. *Tab. hist.* 990. Wolfs-Milch, mit rothen Käplein, auf dem Gebürg bey Ottrot. *perenn.*

Tithymalus cypariſſias foliis punctis croceis notatus CBp. ſeu *Eſula degener Rivin* Wolfs-Milch mit punctirten Blättern, zwiſchen denen andern Gattungen. *perenn.*

Turritis vulgaris ramoſa T. *florib. cruciformibus, fructu ſiliquoſo bicapſulari* ſive Burſa paſtoria ſeu Piloſella ſiliquoſa *IB.* 2. 870. Wilder Stein oder Bergkreſſe vid. Tab noſtr. I. *perenn.*

Turritis hirſuta montana flore albo Rupp. Flor. Ienens. 62. quæ Eryſimo ſimilis hirſuta alba CB. Prodr. *ubi Icon pag.* 942. kleiner Berg-Kreſſe, auf ſteinichten Feldern / unten an dem Hochgebürg Hochfelden.

Turritis, foliis inferioribus cichoraceis, cœteris perfoliatæ T. *floribus ex albo palleſcentibus cruciformibus, fructu ſiliquoſo*, ſeu Sinapi album Lugd. 1168. Thurnſenf oder Köhl, in dem Oſtwinckel, an denen Hecken häufig. *perenn.*

Valeriana paluſtris major T. *foliis latioribus laciniatis, floribus monopetalis, infundibuli formibus albicantibus diviſis, radice craſſa ſubflava, odoris gravis, fructu oblongo.* groſer wilder Waſſer-Baldrian oder Katzenwurtz *Valeriane ſauvage Ic. in Rivin.* in feuchten Orten, auf der Gallenmatt, in allen Gräben auſſerhalb der Statt. *perenn.*

Valeriana ſylveſtris major T. *ſive magna aquatica IB.* 3. *par* 2. 210. groſer wilder Baldrian, gemeine Katzen-Wurtzel, in der Ruprechtsau, und beym Mauerhof. *perenn.*

Valeriana paluſtris minor T. *ſeu* Minor pratenſis

p. 36.

Tab. I.

Turritis vulgaris ramosa. T.

J. Striedbeck sculp

tenſis vel aquatica *IB.* 3. *part.* 2. 211. kleiner Sumpf-Baldrian, in der Ruprechtsau, häufig an denen Waſſergräben / wie auch in ſumpfichten Wieſen, bey Oſtwald. *Ic. Tab. hiſt. IV. p.* 455.

Valeriana hortenſis, Phu folio Olu ſatri Dioſcorid. T. ſive *Valeriana major odorata radice*, *IB.* 3. *part.* 2. 209. *Grande valeriane* Baldrian, zwiſchen Motterhauſen, in dem Bitſcher Gewäld, in dem Stättl. Reichshofen. *perenn.*

Valeriana ſylveſtris major altera, folio lucido HRP. *radice fibroſa*, Baldrian mit gläntzenden Blättern, auf dem Gartners Feld, hinter der Spithal-Mühl, gegen dem Ziegel-Ofen. *perenn.*

Valeriana ſylveſtris minor T. *radice tenui fibroſa repente Ic.* 4. *Tab. hiſt.* 455. *& in Rivin*, kleiner Sumpf oder Wieſen-Baldrian, an denen Waſſer-Gräben, in der Ruprechtsau, zu Oſtwald, auf feuchten Matten. *perenn.*

Valeriana aquatica minor, flore minore, *Ray hiſt. pag.* 389. kleiner Sumpf-Baldrian, mit kleinen Blümlein *Ic. in Rivin* auf feuchten Wieſen beym Mauerhof. *perenn.*

Valerianella arvenſis præcox humilis, ſemine compreſſo T. *flore ſimplici albo monopetalo infundibuliformi, folio integro, fructu monoſpermo, quæ* Locuſta herba IB 3. 323. & Rivin. *ſeu Lactuca agnina Tab. hiſt. Mache* Lämmer-Lattich. oder Aecker Salat, Rebkreſſe, aller Orten, auf denen Aeckern unter der Frucht. *ann.*

Valerianella arvenſis præcox humilis, foliis ferratis T. ſive Locuſta altera, foliis ferratis

IB. 324. Lämmer-Lattich mit gekerbten Blättern prioris est varietas.

Valerianella semine umbilicato nudo oblongo Moris. Umb. *Mache à graine nue Ic. Garidel Tab.* 98. auf Wiesen in der Ruprechtsau. *ann*

Valerianella arvensis serotina altior, semine turgidiori T. später Lämmer-Lattich *Moris Umb.* auf brachliegenden Feldern, in der Ruprechtsau.

Viola arvensis bicolor T. *flore candido & luteo, simplici polypetalo anomalo, papilionacei floris æmulo, fructu trigono Ic.* 3. *Tab. hist.* 690. *& in Rivin* Acker Freysam-Kraut, mit weiß und gelben Blumen, in denen Frucht-Feldern, die brach liegen, aller Orten. *ann.*

Viola arvensis flore cœruleo & luteo T. Acker Freysam-Kraut, mit blan und gelben Blumen. *ibid. ann.*

Viola arvensis flore coerüleo & candido T. Acker Freysam-Kraut, mit blau und weisen Blumen. *ibid. ann.*

MENSIS
MAJUS ET JUNIUS.

Abies taxifolio, fructu sursum spectante T. *sive Abies fœmina IB.* 1. 235. *foliis pectinatim dispositis, utrinque virentibus, floribus amentaceis, quæ Mas fructu squamoso, Ic. Clus. hist.* 34. Thannen-Baum, weiß Thannen-Mastbaum Holtz, *Sapin*, in hohen Waldungen, auf dem St. Ottilien Gebürg.

Abies

Abies tenuiore folio, fructu deorſum ſpectante, inflexo oblongo, eſt Picea major rubra, ſeu Abies mas Theophraſt. *IB.* 1. 238. roth Thanne, FichtThannenbaum, *la Pece Ic. Tab. hiſt.* 1347. *Garidel Tab.* 1. *pag.* 54. im Brumbter und Oberehenheimer Wald. *perenn.*

Acer major, folio rotundiore minus laciniato, an Opulus Italorum *Ray hiſt.* 1701. *flore roſaceo, fructu foliaceo*, Ahorn-Baum, auf dem Gebürg St. Ottilien und gegen Hochfeld. *perenn.*

Acer platanoides Munting. hiſt. pag. 57. *foliis atrovirentibus acutis, ſeu aceris majoris varietas IB.* 1. 168. *Grand Erable, à feuilles de Plane, floſculis amentaceis, ſemine triangulari, ibid.* inglei chen auf dem Halgenſtein, etliche Stund von Blinſchweyler *perenn.*

Acetoſa arvenſis lanceolata T. ſive Oxalis parva auriculata repens, *IB.* 2. 992. *foliis pinguiuſculis hamatis lævibus, floſculis apetalis rubentibus,* quæ Lanceolata minor eſt *Munting. hiſt.* 273. ſeu Oxalis ovina *Tab. hiſt.* 827. wilder kleiner Sauerampfer, mit lantzen förmigen Blättern, Schafampfer, auf dürren ſandigen Erdreich, häufig am Canal, bey der Eckbolsheimer Brucken. *perenn.*

Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens T. quæ minima Munting. pag. 278. & *Tab. hiſt.* 827, *fig.* 6. kleiner Ampfer, mit ſchmahlen lantzen förmigen Blättlein, auf dürren trockenen Orten zu Lingelsheim, und auf der Ganßau. *perenn.*

Acetoſa aruenſis minima, non lanceolata

quæ *Oxalis minima II. Tab. hist. pag.* gar kleiner Feldampfer.

Acetosa pratensis T. *IB.* 2. 989. seu Oxalis vulgaris, *folio longo, fructu capsulari triquetro, radice fibrosa subrubra*, gemeiner Wiesenampfer, mit langen Blättern, *Ic.* 1. *Tab. hist, pag.* 826. auf allen Wiesen. *perenn.*

Eadem foliis crispis.

Acorus verus, seu Calamus aromaticus vulgaris, sive Acorum *IB.* 2. 734. *flosculis luteis cruciformibus, radice geniculata acri, atque amaricante, foris ex flavo rufescente, intus alba fungosa, foliis gramineis rigidis Tab. hist.* 1031. Callmuß oder Ackerwurtz, bey dem Wickhäusel, copiose auf dem Wacken, zu Illkirch in denen Höfen, in Mistpfützen, auf der Hohenwart hinten im Garten *perenn.*

Alchimilla linariæ folio, calice florum albo T. seu Linariæ similis *IB.* 3. 461. *flosculis subluteis apetalis, staminеis fructu pentagono, radice candicante vel Anonymos linifolio Clus hist.* 324. & *Tab. hist. pag.* 1209. *est Linosyris Rivin.* falsch Leinkraut, auf dürren grasichten Orten, zu Oswald auf der Heyde. *perenn.*

Alchimilla montana minima Col. 1. 146. sive Perchepier Anglorum quibusdam *IB.* 3. *part.* 2. 74 *foliis inferne albicantibus, flosculis staminеis herbidis*, estScandix minor *Tab. hist. Ic.* 2. 288. Klein Berg oder Acker Sinau, aller Orten auf denen Frucht-Feldern zu Oswald. *ann.*

Alchimilla erecta gramineo folio, flore minore

p. 43.

Tab. II

Alsine Saxatilis

J. Striedbeck. Sculp:

nore T. *viridi*, ſive Polygonum minus alterum *Tab. hiſt.* 1217. kleiner Wegtritt, mit Graßblättern, auf denen Aeckern zu Oßwald, auf der Nachtweyde, auf denen Aeckern, vor dem Cronenburger Thor. *ann.*

Allium ſativum alterum ſive Alliopraſum caulis ſummo circumvoluto Walth. eſt Scolodopraſum II. Clus. hiſt. 191. Schlangen-Knoblauch, Gallis *R. cambole*, in Gärten und auf denen Gärtners Feldern. *perenn.*

Allium ſativum T. vulgare IB. 2. 566. Knoblauch, gemeiner Knoblauch, in Gärten und Gärtners Feldern. *perenn.*

Allium ſylveſtre latifolium T. *fructu ſubrotundo tricapſulari, foliis binis latis ſplendentibus, flore albo liliaceo umbellato, radice alba fibroſa*, ſive *Allium Urſinum bifolium verum, ſylvaticum IB.* 2. 565. Ic. Tab. hiſt. pag. 875. wilder oder Hecken Knoblauch, *Ail ſauage.* in der Ruprechtsau, zwiſchen denen Hecken, im Illkircher Wald. *perenn.*

Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore albo tripetalo, *ſerpens*, Vaillant *Ic.* 2. *Tab.* 2. in ſumpfichten Orten auf der Inſul am Canal. *ann.*

Alſine ſaxatilis *foliis longiſſimis ac tenuiſſimis, flore candido majori cruciformi, nob.* zwiſchen denen Steinen zu Aaßweiler auf dem Gebürg vid. Tab. noſtr II.

Alſine tenuifolia T. & IB. 3. 364. *pediculis florum longiſſimis* Vaill. ſive Chamælinum *Clus hiſt.* 319. *floribus albis roſaceis, foliis tenuiſſimis, per geniculæ binis Ic. Vaill. Tab. III. fig.* 1. auf der alten Statt-

mauer, zwischen dem Steinstrasser und Cronenburger-Thor. *ann.*

Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis T. auf dürren Aeckern in der Ruprechtsau. *ann.*

Alyssum segetum foliis auriculatis T. *capsulis minoribus sive* Myagrum sativum, *floribus cruciformibus pallide virentibus, & foliis minus cinereis* est Chamælinum *Tab. hist.* 1. 1252. Wilder Leindotter auf denen Aeckern *ann.*

Alyssum incanum luteum serpillifolio majus T. sive *Thlaspi incanum campestre majus, folio polygoni, fosculis lateis cruciformibus, siliculis tenui radice alba Ic. Tab. hist.* 4. *pag.* 850. groß Schildbesen Kraut, mit runden Blättern, auf dem Weg, an denen Rändern gegen Blobsheim. *ann.*

Alyssum perenne incanum montanum T. seu Thlaspi montanum luteum *IB.* 2. 928. est Thlaspi supinum luteum Lob. Ic. 220. unter den zerfallenen Felsen Stücken, gegen Niedeck in dem Hochgebürg *perenn.*

Alyssum incanum luteum minus serpillifolio T. seu minimum, *Clus hist.* CXXXIII. quod *Thlaspi clypeatum minus Tabern. hist. Ic.* 18. 853. Klein Schild besen Kraut, zwischen dem Wickhäusel, und der Hohenwart, an dem Weg. *ann.*

Anagallis phœniceo flore *fructu globoso* sive *Anagallis phœnicea Mas, IB.* 3. 369. rother Gauchheil, Heil aller Welt *Ic. Tab. hist.* 1. 1092. *á nostratibus dicitur* Wutkraut, *quia morsibus venenatorum animaum*

um adversa, Mouron male, à fleur rouge, auf brach-liegenden Aeckern und in Gärten. *ann.*

Anagallis flore cœruleo T. sive Anagallis cœrulea fœmina IB. 3. 369. *simplici monopetalo multifido, foliis ex adverso binis vel ternis, nascentibus, Ic.* 2. *Tab. hist.* 1092. blauer Gauchheil, *Mouron femelle ibid.*

Anagallis paludosa minima, foliis rotundis alternatis *flosculis albis monopetalis cruciformibus* Vaill. *Tab. IV. fig.* 2. neben denen Wasser-Gruben zu Wörtheim und Lauterburg *perenn.*

Anemone sylvestris alba major T. *flore albo simplici, radice fibrosa, fructu oblongo lanuginoso* weise Wald Anemonien Ic. 1. Tab. hist. 73. & H. Eyst. fol. 13. fig. 3. Clus hist. 244. zu Oßwald häufig. *perenn.*

Anethum hortense T. *foliis fœniculaceis, floribus luteis rosaceis umbellátis suaveolentibus, radice alba fibrosa, semine plano ovato.* Dilleu, Till, *Ic. Tab. hist.* 165. *Anet.* in Gärten und Gärtners Feldern. *ann.*

Antirrhinum arvense majus T. *foliis angustioribus, flosculis monopetalis anomalis tubulatis, obsolete purpureis, radice fibrosa* sive Antirrhinum angustifolium sylvestre IB. 4464. Dorant, wild Löwenmaul, mit rothen Blumen *Mufle de veau Ic. 4. Tab. hist.* 1236. & *Garidel Tab.* 7. & *Rivin. ann.*

Antirrhinum arvense majus flore albo HRP. *fructu biloculari.* Dorant, mit weisen Blumen, unter der Frucht in der Ruprechtsau, sed rarissime

Aparine vulgaris T. *flosculis albis campani formib.*

fructu

fructu testiculato, groß Klebkraut *Grateron Ic. Vaill. Tab. 4. fig. 4.* fast an allen Hecken und Zäunen *ann.*

Aparine semine lævi HPar. *foliis brevissimis, flore albo campaniformi quadrifido, caule quadrato* Ic. Vaill. Tab. IV. fig. 3. in denen Frucht-Aeckern, besonders zu Ehrstein *ann.*

Aparine latifolia humilior montana T. sive Matrisylva officinar. *flosc. albis campaniformibus odoratis, foliis stellatis* est Hepatica stellata *IB.* 3. 718. Waldmeister, Sternleber-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 9. 201. in dem Holtzheimer Wald, *Muguet. perenn.*

Aparine supina pumila flore cœruleo T. *in fundibuli formi, semine aculeato*, sive Rubia parvo flore cœruleo se spargens *IB.* 3. 719. klein blaues Stern-Kraut, hin und wieder auf denen Aeckern.

Aquifolium T. & *IB.* 1. 114. sive Ilex aculeata baccifera, *folio sinuato spinoso, flore monopetalo albo rotato, fructu ossiculo fœto* Stechpalmen *Houx. Ic. Tab. hist.* 1. 352. auf den Ottilen Berg, in dem Wald zu Niederhenheim, in dem Hagenauer Forst. *perenn.*

Aquifolium non spinosum *Munting Phytogr.* *fig.* 39. *foliis laurinis* Palmen ohne Dornen, in hohen Andlau, nahe an dem Schloß *perenn.*

Aquilegia sylvestris T. *flore simplici IB.* 35. 484. *cæruleo polypetalo pendulo, foliis lobatis, semine ovato* wilde blaue Agley, *Ancolie sauvage Ic.* 1. *Tab. hist.* 97. in dem Ganßauer Wald und in dem Illkircher Wört, *perenn.*

Aquile-

Aquilegia hortenſis, flore ſimplici, quam pleno, varii coloris. auf dem Haulen Berg, per me aſſurgentes.

Arum vulgare non maculatum T. *flore monopetalo cucullato, fructu cinnabarino acri, radice alba fibroſa acri, fructu globoſo.* gemeiner Aaron oder Zehrwurtzel, ohne Flecken. *Ic. Tab. hiſt.* 1. 123. & *in Rivin. Pied de Veau, ſans mârque,* in denen Hecken gegen Illkirch. Oßwald und in der Ruprechtsau.

Arum maculatum folio ſubrotundo, maculis nigris HRP. Zehrwurtz oder Aron Wurtzel, mit ſchwartzen Flecken, an denen Hecken und Zäunen, gegen dem Mauerhof, und in dem Oſtwinckel. *perenn.*

Arum maculatum maculis nigris T. gefleckte Zehrwurtz, mit ſchwartzen tupfichten und zugeſpitzten Blättern *ibid. Pied de Veau marque perenn.*

Arum paluſtre radice arundinacea, foliis cordiformibus, ſive *Dracunculus aquatilis IB.* 2. 789. *eſt Dracontium paluſtre Tab. hiſt.* rectius Ariſarum Lobel, Waſſer Aron, bey Still, neben einem groſſen Weyer, auf einer ſumpfichten Wieſe *perenn.*

Aſclepias flore albo T. ſive Hirundinaria ſeu Vincetoxicum officinar. *floſculis albis monopetalis campaniformibus, radice alba fibroſa, Dompte Venin Ic. Tab. hiſt.* 1. 105. in allen Höltzern um der Statt, auf der Hart, gegen Molßheim. *perenn.*

Bellis ſylveſtris media caule carens ſive Bellis media, *Clus hiſt. XLIV.* eſt Bellis ſylvatica IB. 3. 114. *Pacquerette de montaigne* wilde Wald Maßlieben,

lieben, mit kleinen Blättern, in dem Gebürg und Wiesen hinter Baar. *perenn.*

Berberis dumetorum T. sive Berberis vulgo quæ & Oxyacantha putata IB. 1. 52. *flore simplici roſaceo luteo, fructu molli cylindraceo*, saur Dorn oder Saurach, aller Orten in der Ruprechtsau, in denen Zäunen, in dem Eckbolsheimer und andern Waldungen *Epine Vinette Ic. Tab. hiſt. pag.* 1448. *perenn.*

Betula T. & IB. 1. 148. *flore amentaceo ſubluteo, folio ſubrotundo læte virenti, per ambitum ſerrato, fructu cylindraceo ſquamoſo* Bircken-Baum *Ic. Tab. hiſt.* 1. 398. *Bouleau* in allen Wäldern, copioſe auf dem Jeſuiter-Hof. *perenn.*

Boletus eſculentus rugoſus albicans, quaſi fuligine infeſtus T. ſeu Ic. 1. fungor. ſpec. *Clus hiſt. CCLXIII. Morille*, Morcheln, hin und wieder in feuchten Waldungen. *ann.*

Boletus eſculentus rugoſus fulvus T. 2da ſpec. 1. gener. eſcul. fungor. Clus hiſt. CLXIII. roth gelbe Maulbeer-Morcheln *ibid. ann.*

Braſſica alba criſpa T. *fructu ſiliquoſo, folio rugoſo patulo, flore ſimplici luteo cruciformi*, ſive Braſſica Sabauda. IB. 2. 828. kraußer oder Welſcher-Kohl, *Chou friſée Ic.* 6. *Tab. hiſt. pag.* 784. auf denen Gartners Feldern *ann. ibid.*

Braſſica arvenſis T. ſive Braſſica rubra minor *IB.* 2. 833. aut Braſſica *Sylveſtris Crambe dicta*, Schnitt-Kohl *Ic.* 15. *Tab. hiſt.* 787. *ibid. ann.*

Braſſica capitata alba T. weiß Kraut / gemein Kraut, Kraut zum einmachen, ſo man nachgehends

hends Sauerkraut nennet *Chou Ic. 4. Tab. hist. 784. ibid. ann.*

Brassica capitata rubra T. & IB. 2. 831. *foliis arcte convolutis & occlusis rubris*, roth Köpfel- oder Salat-Kraut, Chou rouge *Ic. 5. Tab. hist. 784. ibid. ann.*

Brassica cauliflora T. seu *multiflora* IB. 2. 832. Blumen Kohl, *Chou Fleur. ibid. Ic. Tab. hist. 9. ibid. ann.*

Brassica fimbriata T. sive *crispa lacinioſa* IB. 2. 832. *vel tophosa* Ic. 12. *Tab. hist.* 786. Wirsching oder Winter-Kohl, *Chou frisé, á feuilles fendues. perenn.*

Brassica gongylodes T. caule rapum gerens rotundum, vel Brassica caulorapa IB. 2. 829. Kohl-Ruben oder runder Ruben-Kohl *Chou rave Ic. 1. Tab. 789. ann.*

Brassica gongylodes rapo longiore Langer Ruben-Kohl. *Ic. 2. Tab. hist. 789. ann.*

Brassica rubra, folio crispo laciniato IB. 2. 832. krauser Kohl *Chou rouge frisée perenn. ann.*

Brassica alba seu viridis T. vel *vulgaris* IB. 2. 829. gemeiner oder Kuchen-Kohl, Ic. 1. *Tab. hist.* 783. *Chou blond ou verd. ann.*

Brassica alpina perennis T. perfoliata, Berg-Kohl, auf dem Gebürg und Waldung gegen Niedeck, ingleichen oberhalb Haßlach.

Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris T. *globosis* sive Vitis alba IB. 2. 143. *foliis asperis floribus monopetalis campaniformibus albis, radice alba rapacea amara.* Zaun oder Scheiß-Ruben, mit rothen Beeren, aller Orten in denen Zäunen und Hecken

Bryone ou Couleuvre Ic. *Tab. hiſt.* 1292. *perenn.*

Bugula T. ſive *Conſolida pratenſis media*, IB. 3. 430. *flore monopetalo cæruleo unilabiato, ſemine ſubrotundo*, gulden Gunſel *Bugle* Ic. 1. *Tab. hiſt.* 945. & *in Rivin. perenn.* auf denen Wieſen.

Bugula ſive Conſolida media pratenſis, flore purpureo T. gulden Gunſel, mit rothen Blumen, am Schnacken-Loch, an denen Zäunen *perenn.*

Bugula ſylveſtris villoſa, flore ſpecioſiore cæruleo T. ſeu Conſolida media Genevenſis foliis hirſutis IB. 3. 432. gulden Gunſel, mit harichten Blättern, auf der Gansau, gegen Oßwald, in der Gegend des kleinen Brückleins. *Bugle de Geneve, perenn.*

Eadem flore ſuave rubente ſed rarius.

Caprifolium germanicum T. ſive *Periclymenum germanicum non perfoliatum* IB. 2. 104. *flore monopetalo tubuloſo diviſo, fructu molli*, ſive Periclymenum non perfoliat. IB. 2. 104. Speck oder Zaun-Lilien, in denen Hägen in der Ruprechtsau, in dem Gansauer nnd Illkircher Wald, Ic. 1. *Tab. hiſt. pag.* 1. 299. & *Rivin.*

Campanula radice eſculenta, flore cæruleo T. *monopetalo* ſive *Rapunculus* vulgaris campanulatus IB. 2. 793. *foliis inferioribus bellidi ſimilibus, humi accumbentibus, ſuperioribus anguſtis & glabris, radice longiuſcula alba ſubdulci* Rapuntzel, Fürwitzlein, Ic. 1. *Tab.* 1. *hiſt.* 293. *perenn.*

Campanula arvenſis procumbens. T. ſive *Avicularia Salvii quibusdam* IB. 2. 800. *Doucette.*

Frau-

Frauen-Spiegel, in denen Frucht-Aeckern nahe bey Ilkirch. *ann.*

Caprifolium non perfoliatum, foliis sinuosis T. *flore monopetalo tubuloso diviso*, Speck-Lilien, mit eingeschnittenen Blättern, und kleinen Durchwachs-Blättern, in dem Gansauer Wald, in der Ruprechtsau, in denen Zäunen, gegen Ilkirch. *perenn.*

Caprifolium non, perfoliatum foliis sinuosis variegatis T. Speckelilien, mit durchwachsenden, gesprengten Blättern, in dem Eckbolsheimer und Gansauer Wald, wie auch *in Horto medico.*

Caprifolium non perfoliatum, flore interius albo, rubro externe, Bœrhav. in dem Eckbolsheimer Wald, gegen den Ziegelofen, auf dem St. Ottilien-Berg. *perenn.*

Cardamine pratensis, magno flore purpurascente T. cruciformi, sive Nasturtium pratense sylvestre IB. 2. 889. Wiesen-Kresse, Gauch-Blum, mit grossen Leibfarben Blumen, Cresson des prez, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 844. auf allen feuchten Wiesen, *perenn.*

Cardamine pratensis magno flore albo, weisse Gauchblumen, ibid. beym Canal. *perenn.*

Cardamine pratensis magno flore albo pleno T. & *IB.* 2. 889. gefülter weiser Wiesen-Kresse, auf dem Schluten-Feld, vor dem Fischer-Thor, auf dem Glacis. *perenn.*

Cardamine flore majore elatior T. sive *Nasturtium aquaticum erectum majus & amarum, folio longiore flore, simplici cruciformi albo, fructu siliquoso*

est *Nasturtium aquaticum flore majore elatius* IB. 2. 885. Ic. Matthiol. epitom. 270. *Cresson d'eau amere*, Bitter Brunnen-Kreß, in Wasser-Gräblein, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wört, wie auch zu Oßwald. *perenn.*

Cardamine annua exiguo flore T. *foliis pinnatis siliquis gracilibus*, sive Sisymbrii Cardamine species, quædam insipida IB. 2. 886. in dem Ober-Haßlacher Wald. *ann.*

Castanea sativa T. *fructu majore dulci, echinato floribus stamineis amentaceis, in julum congestis, foliis lœte virentibus ac splendentibus, acuminatis rigidis*, zahmer Castanien-Baum, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 1385. *Chataigner. perenn.*

Castanea sylvestris T. *flore amentaceo fructu echinato, fructu dulci minore. folio multifido, Chataigner sauvage* wilder Castanien-Baum, zu Ottrott, am Gebürg, wie auch zu Oberbronn. *perenn.*

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro T. sive *Periclymenum rectum fructu rubro* IB. 2. 106. *flore simplici monopetalo labiato*, Häunling, Hunds-Kirschen-Staude, *Cerisier bas*, est *Xylosteum Rivin. Ic.* 4. *Tab. hist.* 1. 299. in denen Hägen in der Ruprechtsau, in Hecken, in dem Jukircher und Oßwalder Wald, *perenn.*

Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato T. seu *Chamæcerasus Alpina Lob. Ic.* 173. *foliis integerrimis*, Berg oder Hunds-Kirschen, in dem Gebürg, hinter hohen Andlau, *perenn.*

Chamæmelum vulgare leucanthemum T.

sive

sive Chamæmelum vulgare amarum IB. 3. 116. *flosculis radiatis*, *foliis tenuiter dissectis amaricantibus*, Chamillen, Apothecker Chamillen, hin und wieder auf denen Frucht-Aeckern, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 58. *Camomille. ann.*

Chærophyllum sativum T. *flosculis albis rosaceis umbellatis*, Garten oder Küchen-Körfel, nostratibus, Körbel-Kraut Ic. Tab. hist. pag. 283. *Cerfeuil. ann.*

Chærophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio T. sive *Myrrhis seminibus lævibus*, *flosculis albis rosaceis*, Cicutaire Ic. 2. *Tab. hist.* 284. & *in Rivin.* aller Orten, in denen Zäunen, in der Ruprechtsau. *ann.*

Chelidonium majus vulgare T. sive Chelidonia IB. 3. 482. *flosculis luteis cruciformibus. radice croceo succo amaro madente*, *fructu unicapsulari*, groß Schöll-Kraut, an denen Zäunen und Mauren, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 101. *Grand chelidoine. perenn.*

Chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis T. sive Chelidonium majus laciniato flore, Clus. hist. CCIII. per me satum uberrime crescit, beym Schnackenloch. *perenn.*

Chenopodium folio triangulo T. *foliis spinachiæ similibus*, *floribus stamineis luteis*, *fructu stellato*, vulgo Bonus Henricus IB. 2. 965. wilder Feld-Spinat. *Bon Henry*, *ou Epinat Sauvage.* Ic. Tab. hist. 810. aller Orten, an denen Wegen. *perenn.*

Chenopodium latifolium minus ramosum, florum petiolis longissimis, ex foliorum alis

confertim naſcentibus, foliis ſinuatis, Buxb. Enumerat. Plantar. Hallens. cum figura pag. 69. in dürren Gräblein, in Schiltigheim.

Chriſtophoriana vulgaris noſtras racemoſa & ramoſa T. *flore ſimplici roſaceo folio elegantiſſime diſſecto, fructu molli ovato nigro, radice nigra fibroſa*, St. Chriſtopffels Kraut, Herbe de St. Chriſtoffle, *Ic. Tab. hiſt.* 1163. auf dem Haulen Berg, im Wald, bey Ottmarsheim / auf der Haart. *perenn.*

Cirſium ſingularibus capitulis parvis, T. *fructu pappoſo foliis non laciniatis, floribus floſculoſis purpuraſcentibus*, ſive III. montanum Clus. hiſt. CXLIX. vel Macrocaulon *IB.* 3. 45. auf dem Aaßweiler Gebürg. *perenn.*

Cochlearia folio cubitali T. *fructu globoſo* ſive *Raphanus ruſticanus, flore albo ſimplici, radice craſſa alba acri Ic. Tab. hiſt.* 799. Meerrettich, auf denen Gärtners Feldern, auf der Contreſcarpe des Juden-Thors lincker Hand, vor dem Fiſcher-Thor, neben dem Schlutten-Feld. *perenn.*

Cornus fæmina T. ſive Cornus ſylveſtris, putata virga ſanguinea, IB. 1. 314. *floribus cruciformibus ſubalbicantibus, fructu nigro amaro & acerbo, foliis nervoſis corno proximis*, Blutgerten, Cornel-Strauch *Ic. Tab. hiſt.* 1459. *Cornier ſauvage perenn.*

Cratægus folio laciniato T. *fructu pyriformi* ſive Meſpilus apii folio ſylveſtris non ſpinoſa, *flore roſaceo albo.* ſivè Sorbus torminalis *IB.* 1. 63. & *Lob. Ic.* 200. *Tom.* 2. *Tab. hiſt.* 3. *pag.* 1427.

wilde

wilder Eſchröſſl. Baum, Vogelbeeren Baum, *Alizier, perenn.* in dem Ingweiler Wald, zu Brumbt in des Jägers Garten, und *in horte medico. perenn.*

Cratægus folio ſubrotundo ſerrato, ſubtus incano T. ſive Sorbus alpina *IB.* 1.65. quæ Aria Lugdun. 202. wilder Sperber-Baum, auf dem Gebürg und Waldungen, zu Baar, und Oberbronn, allbier auf dem St. Johannis Wall, in der Stadt unter den Linden-Bäumen. *perenn.*

Cruciata hirſuta T. *flore luteo cruciformi, foliis quaternis hirſutis*, gulden Waldmeiſter, *Croiſette jaune Ic. IB.* 3. 717. hin und wieder in denen heckichten Wegen, *ann.*

Cucumis vulgaris ſativus *fructu carnoſo tereti* T. *floribus monopetalis luteis campaniformibus multifidis, foliis anguloſis, fructu luteo*, Cucumern, mit gelber Frucht, Ic. 1. Tab. hiſt. 864. Concombre, in Gärten, und Gärtners-Feldern. *ann.*

Cucumis ſativus vulgaris, maturo fructu albo T. Cucumern, mit weiſſer Frucht, *ibid.*

Cucumis flexuoſus T. *fructu longiſſimo*, krumme Cucumern *Ic. Tab. hiſt.* 865. *ann.*

Cyanus ſegetum flore cœruleo T. *ſemine pappoſo* ſive Cyanus IB. 3. 21. *ſimplici compoſito floſculoſo, foliis integris, Bliiet*, blaue Korn-Blumen, Ic. 1. *Tab. hiſt.* 428. in denen Korn-Feldern, *ann.*

Cyanus ſegetum, flore albo T. weiſe Korn-Blumen, auf Aeckern, bey Niederhaußbergen. *ann.*

Cyanus ſegetum diſco cœruleo T. *corona candida.* weiſe Korn-Blumen, zu Oßwald, unter der Frucht, *ann.*

Cydonia fructu breviore & rotundiore *carnoso* T. *floribus albis rosaceis*, Apfel Quitten-Baum, hin und wieder in Gärten der Stadt, als auf dem Land, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1412. *Coigner mále, perenn.*

Cydonia fructu oblongo & leviore T. Birn Quitten-Baum, *Coigner femelle Ic.* 2. *Tab. hist.* 1413. *perenn.*

Cynogloſſum majus vulgare T. *floribus monopetal. in fundibuliformibus, multifidis purpureis, foliis oblongis, radice longa ſuccvlenta, fructu capſulari, aſpero*, Hunds-Zung, *Langue de Chien*, an denen Landſtraſſen häuffig, in der Ruprechtsau, neben den Zäunen, *Ic. Tab. hiſt.* 1113. & 1B. 3. 598. *perenn.*

Cyperoides ſylvarum tenuius ſpicatum, foliis mucronatis glabris, carinatis, pallide viridibus, culmo triquetro geniculato, ſpica craſſa, ferruginea, *Parckins. Theatr.* 1171. an dem Canal. *perenn.*

Cyperoides ſpicis parvis, longe diſtantibus T. auf feuchten Wieſen, in der Ruprechtsau, und der grünen Wart. *perenn.*

1 Cyperoides foliis caryophyllæis, ſpicis obongis é pediculis longioribus propendentibus T. auf feuchten Wieſen bey Ilkirch, Cypern-Graß, mit Nägelein-Blättern und ablangen, an langen Stielen hangender Blüth. *perenn.*

Cyperoides polyſtachion, ſpicis teretibus erectis T. ſive Gramen paluſtre majus *Lobel. Ic.* 11. *foliis anguſtis*, auf feuchten Wieſen, am Canal. *perenn.*

Cype-

Cyperoides latifolium, ſpica rufa, caule triangulo T. *paniculis nigris, floribus apetalis ſtamineis, foliis ſparganio ſimilibus*, groß breit blättricht Cypern-Graß, *Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 533. eſt Gramen Cyperoides Lob. Ic. 11. hin und wieder an denen Uferen der Ill, *perenn.*

Cyperoides latifolium ſpica ſpadiceo viridi majus T. & *IB.* 2. 495. breit blättricht Cypern-Graß, mit braunroth grüner Aehre, in ſumpfichten Pfützen, in der Ruprechtsau, und andern Orten am Rheingieſen. *perenn.*

Cyperoides ſpica pendula breviore T. *nigra*, ſeu *Pſeudo cyperus Lob. Ic.* 76. & *IB.* 2. 496. Cypern-Graß, mit kleiner ſchwartz abhangender Blüthe, an dem Rheingieſen, am Ufer, bey der Pulvermühl. *perenn.*

Cyperoides ſpica pendula longiore & anguſtiore T. ſive Gramen Cyperoides ſpica pendula longiore & anguſtiore *CB. prod.* 6. 13. & *IB.* 2. 497. in denen meiſten Gräben, auſſer der Stadt, in dem 2ten Graben, vor dem Fiſcher-Thor. *perenn.*

Cyperoides paluſtre majus ſpica diviſa vel *gramen Cyperinum paluſtre minus Tab. hiſt. Ic.* 4. *pag.* 533. klein Waſſer Cyper-Graß, auf feuchten Wieſen, beym Schnackenloch. *perenn.*

Cyperoides polyſtachion lanuginoſum T. viel ährichtes Cypern-Graß, mit wollichten Blättern, auf feuchten Matten, zwiſchen Oßwald, und Gravenſtaden, an denen Endungen feuchter Aecker, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Cyperoides polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus, prope ſummitatem caulis T. gelbichtes viel ährichtes Cypern-Graß, mit kleinen zu oberſt am Stengel ſitzenden Blättern, auf den feuchten Wieſen beym Mauer-Hof. *perenn.*

Cyperoides minus, ſpicis denſioribus T. ſive Gramen Caryophyllæum *Tab. hiſt.* 521. quod Gramen eſt ſpicatum foliis Vetonicæ caryophyllatæ *Lob. ic.* 10. frühes Cypern-Graß, mit Nägel-Blättern, auf dürren graßichten Orten, bey allen Lüften. *perenn.*

Cyperoides paluſtre aculeatum capitulo breviore T. ſive *Gramen paluſtre echinatum Lob.* 15. & *IB.* 2. 497. Waſſer-Graß, mit ſtechender Aehren, Igel-Graß, vor dem Metzger-Thor, in feuchten Orten, vor dem Glacis, wie auch in der Ruprechtsau. *perenn.*

Dens Leonis folio anguſtiore T. *foliis radiatis per terram ſparſis, ſemine pappoſo,* ſchmahlblättrichter Löwen Zahn, auf dürren und ſandigen Erdreich. *perenn.*

Dens Leonis minimis foliis hirſutis & aſperis T. ſive Hieracium parvum hirſutum, caule aphyllo criſpum ubi ſiccatum *IB.* 1038. auf brachliegenden Aeckern, gegen Illkirch. *perenn.*

Dens Leonis minor foliis radiatis T. *radice parva nigra* auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, an magern graſichten Orten. *perenn.*

Dens Leonis qui piloſella officinar. T. ſive Piloſella major repens hirſuta, *flore compoſito floſculoſo luteo*, Mauß-Oehrlein, auf trockenen graßich-

graßichten Orten, *Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 506. *Piloſelle ou Oreille de Rat. perenn.*

Dens Leonis qui Piloſella, folio minus villoſo T. ſeu *Piloſella major, folio anguſtiore*, minus piloſo repens *IB.* 2. 1090. auf dem Ried bey Biſchofsheim, auf der Metzgerau. *perenn.*

Dentaria heptaphyllos baccifera T. *flore cruciformi ex candido leviter purpuraſcente, ſiliqua corniculata*, ſive Coralloides altera vel ſeptifolia, *IB.* 2. 899. Zahn-Kraut, oder Schuppwurtz mit ſieben Blättern, *Ic.* 4. *Tab. hiſt.* 324. & Clus. hiſt. CCXXII. auf dem Barrer Gebürg, in dem Dambacher-Wald, per me auf dem Haulenberg. *perenn.*

Dentaria pentaphyllos, foliis mollioribus T. ſive *Dentaria VII. Clus. hiſt.* GCXXII. eſt Quinque folia IB. 2. 900. *Ic. Tab.* 1. 323. auf dem Ottiliẽ Berg, in dem Barrer Wald, wo man Eiſen gräbt. *perenn.*

Digitalis purpurea, folio aſpero T. ſive *Digitalis purpurea IB.* 2. 812. groſſe rothe Fingerhütlein, *Digitale rouge* Ic. 2. Tab. hiſt. 960. auf dem St. Ottilien Berg häuffig/ *perenn.*

Digitalis flore magno candido T. *monopetalo anomalo tubulato, folio aſpero, fructu rotundo cuminato, Digitale blanche*, große weiſe Fingerhütlein, in denen Hecken, 3. Viertel Stund hinter Blinſchweyler. *perenn.*

Digitalis lutea magno flore T. *folio latiore Digitale jaune Tab. Ic.* 1. *hiſt.* 960. gelbe Fingerhütlein *IB.* 3. 813. *eſt Digitalis lutea*, auf dem oberſten Gebürg des Falckenſteins, *cum præcedente, perenn.*

Doronicum radice scorpii brachiata T. sive 1. *Tab. hist.* 715. Gembsenwurtz auf dem Haulen Berg, per me satum, *perenn.*

Elichrysum montanum longiore folio & flore, purpureo T. *composito flosculoso semine papposo*, Berg Ruhr-Kraut, mit langen rothen Blumen und Blättern, *Ic.* 8. *Tab. hist.* 781. bey allen Lüften, auf denen Wiesen, umb Eschau. *perenn.*

Elichrysum montanum, longiore flore & folio, albo T. Bergruhr-Kraut, mit weisen langen Blumen und Blättern, ibid. auf der magern Wiese, der Eckbolsheimer-Schlut, *perenn.*

Elichrysum montanum flore rotundiore sub purpureo T. Katzen-Pfötlein, mit schönen runden rothen Btumen, rothe Engelblumen, *Ic.* 7. *Tab. hist. pag.* 781. *Pied de chat, ou Immortelle rouge*, auf der Moltzheimer Hart. *perenn.*

Elichrysum montanum flore rotundiore candido T. sive *Gnaphalium montanum album*, *Lob. cl* 482. Katzen-Pfötlein, mit runden weisen Blümlein, *Ic. Tab. hist.* 6. 781, ibid. und in dem XV. Wört an Rhein. *perenn.*

Elichrysum montan. flore rotundiore suave rubente T. sive *Gnaphalium montan, suave rubens Lob. Ic.* 483. & *Garidel Tab.* 30. bleich rothe Katzen-Pfötlein, ibid. *perenn.*

Equisetum sylvaticum tenuissimis setis T. sive Hippuris tenuissima, non aspera IB. Ic. 3. 730. & *Tab. hist. Ic.* 6. 569. Wald Katzen-Wadel, mit zarten glatten Blättern, in feuchten schattichten Wäldern, auf dem Hochfelder Gebürg, *perenn.*

Euoni-

Euonymus vulgaris, granis rubentibus T. seu Euonymus multis, aliis Tetragona IB. 1. 201. *floribus albicantibus rosaceis male olentibus Ic.* Tab. *hist.* 1462. *Bonnet de Iesuit.* Hahnen-Hödlein, oder Spindelbaum, Jesuiter-Käplein, in denen Hecken u. Wäldern, zu Illkirch, und Eckbolsheim. *perenn.*

Ferrum equinum germanicum, siliquis in summitate T. seu Comosum Rivin. & Garidel Tab. 33. gelbe Steinwicken, zu Oßwald und Geistspitzen häuffig. *perenn.*

Fragaria vulgaris T. *floribus albis rosac. fructu ovato acuminato, ferens fraga rubra* IB. 2. 394. Erdbeeren Kraut, *Ic. Tab. hist.* 346. *Fraisier*, aller Orten, an denen Reinen der Zäunen, *perenn.*

Fragaria foliis hispidis T. *ex utraque parte cinereis*, Stein oder Pflaster-Beeren, zu Bußweiler in denen Reben, zu Blinschweiler, *perenn.*

Frangula T. sive Alnus nigra baccifera, IB. 1. 260. *flore rosaceo, fructu molli globoso.* Faulbaum, Zapfen-Holtz, zu Lingelsheim, in der Ruprechtsau, unter den Hecken, *Aune noir* Ic. Tab. hist. 1461. *perenn.*

Frangula montana pumila saxatilis, folio subrotundo duro, fructu globoso molli nigro. T. zu Niederhaußbergheim, hinten zu auf kleinen bergichten Hügeln. *perenn.*

Fumaria officinarum flore purpureo T. *polypetalo anomalo papilionaceo, fructu siliquoso unicapsulari*, Tauben-Kropf, *Ic. Tab. hist.* 85. *Fume terre*, auf denen Aeckern, und in Weinbergen, *ann.*

Fumaria officinarum & Dioscorid. flore albo

bo T. Tauben-Kropf, mit weisen Blumen, in denen Reben bey Heilgenstein. *ann.*

Galeopsis vel Urtica iners, flore luteo, *fructu capsulari* T. & *IB.* 3. 323. est Lamium folio oblongo flore luteo, lc. Rivin. *Ortie jaune*, gelbe taube Waldnessel, bey Waßlenheim, in dem Grund-Thal, zu Baar, bey der Kirchen. *perenn.*

Geranium cicutæ folio minus, & supinum flore rubro, *fructu rostrato*, sive Arvense *Tab. hist. Ic.* 3. 123. Klein Acker Storchen-Schnabel, mit Schirlings-Blättern, *Bec de Grue* fast überall auf denen Aeckern, und neben den Landstrassen, *perenn.* Idem flore albo. T. klein Acker Storchen-Schnabel, mit weiser Blüth, auf denen Ackeren, bey Bennfeld. *perenn.*

Geranium Robertianum T. *flore dilute rubello striato simplici*, Stinckender Storchen-Schnabel, St. Ruprechts-Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 122. & *Rivin. Herbe Robert.* an alten verfallenen Mauren, und andern schattichten Orten *perenn.*

Geranium Robertianum viride T. est Geranium Murale *IB.* 3. 480. vel Fœtens Rivin. Stinckender Storchen-Schnabel, mit grünen Stenglen, auf alten Mauren und Dächern, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Geranium Robertianum flore albo T. Stinckender Storchen-Schnabel, mit weisen Blumen, auf fetten Aeckern zu Illkirch, an der Landstraß gegen Fegersheim.

Geranium pimpinellæ fol. Dillen. seu Robertianum Rivin, Storchen-Schnabel mit Bi-

bernell

bernell Blättern, auf der Hart gegen Moltzheim, an der Landstrasseu gegen Fegersheim. *perenn.*

Geranium Cicutæ folio moſchatum T. Storchen-Schnabel, mit wohlriechenden Schirlings-Blättern, *Ic. IB.* 3. 479. auf denen Ackern, in dem Oſtwinckel. *ann.*

Gladiolus minor, floribus uno verſu diſpoſitis T. *purpureis monopetalis liliaceis, radice bulboſa, fructu oblongo*, braun Schwertel, *Ic. Tab. hiſt.* 1024. *perenn.* auf dem Hochgebürg beym Scheerweiler Schloß. *perenn.*

Globularia vulgaris T., *fructu capſulari*, ſive Globularia, bellidi ſimilis *IB.* 3. 13. ſive Bellis cœrulea, caule folioſo, radice fibroſa, Ic. 6. Tab. hiſt. 708. blaue Maßlieben, auf dem Polygon oder Schießberg, auf der Metzgerau / und zu Oßwald, *perenn.*

Gramen paluſtre cyperoides triquetrum, ſpica integra *IB.* 2. 497. Waſſer Cyper-Graß, an der Breuſch, bey der grünen Wart, auf dem Wacken, neben der Ill. *perenn.*

Gramen cyperoides paluſtre, ſpica diviſa, CBp. an Gramen cyperoides paluſtre majus, ſpica divulſa, bey Gravenſtaden, in einem feuchten Wäldlein, wie auch zu Eſchau, an dem Mühlbach. *perenn.*

Gramen ſylvaticum III. *Tab. hiſt.* 537. *ſpica divulſa*, klein Wald-Graß, an verſchiedenen feuchten Orten, beym Jägerhof, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen cyperoides paluſtre majus, ſpica com-

compacta, CBp. *caule exacte triangulari*, Waſſer Cypern-Graß, an dem Ufer der Preuſch und der Ill. *perenn.*

Gramen cyperoides ſpicatum minus, ſpica longa divulſa. CBp. *Ray hiſt.* 297. im Oßwalder Wald. *perenn.*

Gramen nemoroſum, panicula rufeſcente molli T. ſive Gramen ſylvaticum vel nemoroſum *Tab. hiſt. Ic.* 1. *pag.* 537. eſt, Gramen ſylvaticum parvum tenuifolium rigidiuſculum *IB.* 2. 509. Buſch oder Wald-Graß, auf Wieſen, gegen Oßwald, bey dem Steeg im Oſtwinckel.

Gramen dactylon radice repente ſive officinar T. quod legitimum Clus eſt, CCXVII. in denen Kuchen-Gärten, in der Ruprechtsau und andern Orten. *perenn.*

Gramen dactylon anguſtifolium, ſpicis villoſis T. ſive Iſchæmum II. *Tab. hiſt.* 534. eſt *Gramen digitatum hirſutum IB.* 2. 445. auf denen Wieſen gegen Oßwald, an der Landſtraſſen nach Blobsheim, auf einer dürren Wieſe, an dem Rhein Ziegelofen, *perenn.*

Gramen ſpicatum, ſpica cylindracea molli & denſa T. ſive Alopecuroides *Lob. Ic.* 8. Kolben-Graß, auf denen Wieſen bey Oßwald, auf denen Ackern, vor dem Cronenburger-Hochgericht. *perenn.*

Gramen ſpicatum glumis criſtatis T. Kamm-Graß, bey Mertzweyler, auf denen Wieſen, *perenn.*

Groſſularia hortenſis major, fructu molli

T. *flore ſimplici roſaceo ſubviridi, foliis amplioribus, fructu rubro*, groſſe Sanct Johannis Träublein Staude, mit rother Frucht, *Groſſeiller rouge*, Ic. Tab. hiſt. 1492. in allen Gärten, *perenn.*

Groſſularia hortenſis, majore fructu albicante, *molli globoſo, Groſeiller blanc.* T. grüſſe Johannis-Träublein-Staude, mit weiſer Frucht/ *perenn.* ibid.

Groſſularia ſylveſtris ſpinoſa, ſimplici acino T. ſive Uva criſpa, IB. 1. 47. wilde Stachelbeeren Staude, *Ic. Tab. hiſt.* 1491. *Groſſeiller ſauvageo*, faſt in allen Hägen und Zäunen, in der Stadt, zwiſchen der Mauer, auf dem Graben, gegen dem Spir-Thor zu. *perenn.*

Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro major T. ſive Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente & fructu, & ſchwartze Johannis Beeren-Staude *Ic.* 2. *Tab hiſt.* 1492. & *IB.* 2. 98. *Groſſelier noir.* in denen Hecken und Büſchen, zu Oßwald und Jllkirch im Wört. *perenn.*

Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro minore T. ſchwartze Johannis Beeren-Staude, mit kleinen ſchwartzen Beeren. ibid. *perenn.*

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa hortenſis rubra T. ſive Ribes officinarum vulgaris, gemeine St. Johannis Trauben-Staude, mit rothen Beeren, *Groſſeiler rouge Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1492. in allen Gärten. *perenn.*

Hedera arborea T. ſeu communis major IB. 2. 111. vel *ſcandens & corymboſa, floribus roſaceis, foliis triangulatis, fructu nigro Ic.* 1, *Tab. hiſt.* 1278.

1278. *Lierre*, Epheu, Mauer Epheu, mit grossen Blättern, an denen Stämmen der Bäume, an Mauren hin und wieder. *perenn.*

Hedera communis minor IB. 2. 113. seu *sterilis* Lobel. aut Helix Fuchs. 432. Klein Epheu, unfruchtbahrer, auf Erden kriechender Epheu, mit spitzigen Blättern, *Petite lierre*, an denen Stämmen, unten der Wurtzel zu, Eich- und anderer Bäume. *perenn.*

Helianthemum vulgare, flore luteo T. *simplici rosaceo fructu globoso*, Sonnen-Gunsel, *Ic. Tab. hist.* 1474. *Elianteme*, hin und wieder auf dürren grasichten Orten, *perenn.*

Herniaria glabra T. *flore apetalo*, *fructu capsulari oblongo* sive Millegrana, *Lobel. Ic.* 421. *Herniole ou Turquette*, Harn-Kraut, Bruch-Kraut, in feuchten sandigen Gruben, aller Orten, vor allen Thoren der Stadt. *ann.*

Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum, IB. 2. 1024. *flore semi flosculoso, semine papposo, est Aphaca. Lugd.* 562. gelbe Wegwart, an der Landstrasse, bey Ilkirch, bey der Lohmühl, oberhalb der Stadt, auf der Glacis, vor dem Cronenburger-Thor, neben dem Aeckern, *ann.*

Hieracium majus erectum angustifolium, caule lævi T. sive Hieracium majus Dioscoridis. *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 481. groß Wiesen Habich-Kraut, mit einem glatten Stengel, im Ostwinckel auf den Wiesen, auf der Gallen-Matt, vor dem Weißenthurn-Thor. *perenn.*

Hieracium montanum umbellatum angusti-

folium

folium T. *multiflorum flore parvo*, Berg Habich-Kraut, mit gestirnten kleinen Blümlein, an rauhen steinichten Orten, zu Heilgenstein, *perenn.*

Hieracium montanum glabrum latifolium minus T. *Tab. hist.* 495. klein Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, hinter Baar auf feuchten grasichten Orten. *perenn.*

Hippocastanum vulgare T. sive Castanea equina, *flore simplici rosaceo spicato folio multifido, fructu amaricante echinato*, Roß Castanien-Baum, *Marronier d'Inde Ic.* 2. *Tab. hist.* 1385. aller Orten in Alleen, in der Ruprechtsau, am Jesuiter-Garten. *perenn.*

Iris palustris lutea T. sive Acorus adulterinus IB. 2. 732. *flore monopetalo luteo liliaceo, folio ensiformi, radice tuberosa, fructu oblongo*, gelbe Sumpf-Lilien, Wasser-Schwertel, Ic. Tab. hist. 103. *Flambe bastard, ou Glajeul de marais*, in allen sumpfichten Gräben, vor denen Thoren, *perenn.*

Iris pratensis angustifolia humilior T. kleine Graß-Lilien, est Iris tenuifolia Chabræi. 243. auf feuchten Wiesen beym Mauerhof. *perenn.*

Iris pratensis angustifolia non fœtida altior T. sive Iris tenuifolia major, flore cœruleo & striato angustifolia *IB.* 2. 727. *Ic.* 12. *Tab. hist.* 1073. Graß Lilien, blauer Wiesen-Schwertel, auf denen dunckeln und feuchten Wiesen, beym Mauerhof. *Glayel de prez. perenn.*

Isatis sativa latifolia T. Isatis sive Glastum sativum, *IB.* 2. 909. *floribus luteis cruciformibus*, ra-

dice alba longa, minus fibrosa, fructu lingulari, Weyd, *Pastel ou Guide á feuilles larges, Ic. 2. Tab. hist.* 1114. auf dem Glacis, am Metzger- und Spithal-Thor. *perenn.*

Isatis sylvestris angustifolia T. Isatis sive Glastum spontaneum *IB.* 2. 999. wilde Weid, mit schmahlen Blättern, *Ic. Tab. hist.* 1114. *Pastel sauvages à feuilles etroites.* auf dem Schliessen. *perenn.*

Iuncus angustifolius villosus, floribus albis paniculatis, T. *fructu trigono* sive Gramen Luzulæ affine flore albo *IB.* 2. 492. haricht Wald-Graß, auf dem Hochgebürg Hochfeld. *perenn.*

Lathyrus arvensis repens tuberosus T. sive Chamæbalanus leguminosa *IB.* 2. 324. *floribus papilionaceis elegantissime purpureis suaveolentibus, radice esculenta,* Erckel-Nuß, kleine tief stehende Erdgriebling, nostrat. Sau-Mandeln, *Ic. Tab. hist.* 891. & *in Rivin. Gesse,* in denen fetten Korn-Feldern, zu Brischwickersheim, nahe an der Capell. *perenn.*

Lathyrus latifolius luteus foliis viciæ T. sive luteus sylvestris dumetorum *IB.* 2. 304. *radice fibrosa fructu siliquoso tereti,* gelbe Wicke, *Ic. Tab. hist.* 890. & *in Rivin.* sub nomine Lathyri arvensis, auf denen Wiesen, beym Canal.

Leucanthemum caulevillis canescente T. sive Bellis sylvestris, caule folioso hirsuto major, folio acutiore CBp. Gänse-Blumen, mit rauhen Stengeln, und spitzigen Blättern, zu Dorlisheim, am Dattel-Brunnen, auf denen Matten, beym Mauerhof und allen Lüften, *perenn.*

Lilac T. *flore cæruleo monopetalo infundibuliformi, fructu compresso lingulari*, blaue Zirincken, in Hägen, in der Ruprechtsau, in Gärten, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1459. *perenn.*

Lilium convallium album T. sive Lilium conuallium vulgo *IB.* 3. 531. *flore monopetalo campaniformi, radice alba repente, fructu globoso molli*, Meyen-Blumen, *Ic. Tab. hist.* 1135. *Muguet á fleur blanche*, zu Oßwald, im Ostwinckel, *perenn.*

Lilium convallium latifolium T. Meyen-Blumen, mit grossen Blättern und Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1335. bey Rheinau, unten gegen dem neuen Dörfel, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Lilium convallium floribus è folliculis prodeuntibus Mapp. *Ic. hist. plantar. pag.* 174. *perenn.* auf dem Wangenburger-Gebürg gegen Zabern.

Linagrostis panicula ampliore T. sive Iuncus Bombycinus *IB.* 2. 514. est Gramen tomentarium, Bettgraß, Linagrostis *Tab. hist. Ic.* 540. auf denen feuchten Wiesen bey Oßwald.

Linagrostis panicula tenuiore seu minori T. & Vaill. zu Waßlenheim bey der Papier-Mühle.

Lithospermum minus repens latifolium T. *flore purpureo infundibuliformi, semine subrotundo polito*, sive Lithospermum repens, *majus*, Clus *hist.* CXLIII. Stein-Hirse, auf denen Gebürgen, hinter Heilgenstein. *perenn.*

Lotus pentaphyllos flore majore luteo papilionaceo splendente, *fructu siliquoso* T. sive Loti corniculatæ major species, *IB.* 2. 355. *Ic. Ri-*

vin grosse Vogelwicke, auf dem Schießrein, an denen Gärten, und Gräben, ohnweit der Bruck, nahe der Lohmühl, *Lotier perenn.*

Lotus pratensis siliquosus luteus major & durior. T. *Clus hist.* CCXLIV. sive *Trifolium siliquos. Tab. hist.* 1. 904. *est Lotus tetragonolobus Rivin.* Schoten-Klee, in der Ruprechtsau, gegen der Schiffmatt, bey den Linden-Bäumen. *perenn.*

Lunaria major siliqua longiore, Bœrhav. sive Viola lunaris *Ic.* 2. *Tab. hist.* 696. Mond-Beyel, oder Silberblatt auf dem Gebürg, im Niedecker-Thal, *biennio* durat.

Lunaria major siliqua rotundiore Bœrh. sive Viola lunaris *Ic.* 1. *Tab. hist.* 696. Silberblatt mit runden Schoten, *ibid.*

Lychnis montana viscosa alba latifolia T. sive Polemonium petræum Gesneri *IB.* 3. 351. *florum petalis supra albis, subtus virescentibus, interdiu contrahentibus caryophyllæis, sive Lychnis Sylvestris Tab. hist. pag.* 674. & *Clus. hist.* IX. *pag.* 291. zu Heilgenstein / in denen Holwegen, auf den St. Ottilien-Berg. *perenn.*

Lychnis pratensis flore admodum laciniato simplici T. purpureo, Flos Cuculi dictus, *Tab. hist. Ic.* 15. 677. *Giroste de prez*, rothe Gauch- oder Gugucks-Blumen, auf allen Wiesen, *perenn.*

Eadem flore albo T. weise Guaucks-Blumen, auf der Glacis, vor dem Metzger-Thor, auf denen Wiesen bey der Gansau, *perenn.*

Lychnis sylvestris alba simplex T. *major hirsuta, foliis latioribus*, sive Ocimoides album multiplex,

tiplex, *IB.* 3. 342. sive Ocimastrum *Tab. hist. Ic.* *pag.* 679. weiser Wiederstoß, auf allen Contrescarpes, und an denen Hecken, vor dem Ilkircher Wald, wie auch an denen Landstrassen. *perenn.*

Lychnis sylvestris sive Aquatica purpurea simplex T. flore rubello simplici T. sive *Ocimastrum rubrum Tab. hist. Ic.* 2. 679. rother Wiederstoß, in feuchten waldichten Orten, an Wasser-Bächen, *Basilic sauvage, á fleur rouge, perenn.*

Lychnis sylvestris viscosa angustifolia rubra T. *foliis caryophyllaceis*, *Ic.* 7. *Tab. hist.* 670. *quæ Viscaria Rivin.* wilde purpur rothe Marien-Rößlein, Kleb-Nelcken, in der Hart, bey Ottmersheim, *perenn.*

Eadem alba T. Pech oder Kleb-Nelcken / mit weisen Blumen, in dem Urbis Thal, in denen Hecken. *perenn.*

Lysimachia humifusa, folio subrotundo acuminato, flore luteo T. *monopetalo rotato &, multifido, fructu globoso* sive Nummularia seu Centimorbia *IB.* 3. 370. quæ *Anagallis lutea Lob. Ic.* 466. *Ic. Tab. hist.* 3. 1092. gelber Gauchheil, Wald Pfennig-Kraut, in dem Oberehenheimer und Barrer Wald, *Mouron, á fleur jaune, perenn.*

Malus sylvestris fructu valde acerbo *carnoso globoso*, T. *flore albo rosaceo, fructu albo.* wilder Apfel-Baum, *Pomier sauvage, ou de bois*, in Büschen und Wäldern, in dem Ilkircher Wald, und sonsten an denen Strassen hin und wieder, *perenn.*

Malus acido fructu ſylveſtris T. ſive *Mala ſylveſtria rubentia Tab. hiſt. ic.* 21. 1420. Holtz Aepfel-Baum, mit rother Frucht, *ibid.*

Malus ſylveſtris fructu acido albo T. Holtz Aepfel-Baum, mit weiſer Frucht, *ibid.*

Matricaria vulgaris ſeu ſativa T. *foliis graveolentibus latioribus inciſis, floribus compoſitis radiatis,* ſive Artemiſia tenuifolia *Tab. hiſt. ic.* 3. Mettram, in der Ruprechtsau, an denen Zäunen, der Gärten, *Matricaire, perenn.*

Medica echinata minima T. *IB.* 2. 386. ſive Trifolium echinatum arvenſe, fructu minore echinato, eſt Tribulus minor rectus Dalechamp. Lugd. 513. auf ſandigen ſteinichten Aeckern in der Ruprechtsau, *ann.*

Meliſſa humilis latifolia, maximo flore purpuraſcente T. *ſemine ſubrotundo* ſive *Lamium montanum meliſſæfolio* CBP. *monopetalo labiato ſuave rubente, grati odoris, foliis ex oppoſito binis latioribus, in ambitu ſerratis,* eſt *Meliſſa Fuchs. Lob. Ic.* 515. Berg-Neſſel, mit Meliſſen-Blätter, noſtratibus, Grieß Kraut, Ic. Rivin. *Meliſſe de Montaigne. perenn.*

Menyanthes paluſtre T. ſive *Trifolium Fibrinum majus, flore monopetalo cæruleo infundibuliformi, radice amariſſima ſucculenta,* Ic. Tab. hiſt. pag. 906. Bieber oder Sumpf-Klee / in ſumpfichten Gräben, bey der Lingelsheimer Nachtweyde. *Meniante, perenn.*

Menyanthes paluſtre anguſtifolium & tryphyllum T. *flore monopetalo infundibuliformi, fructu oblon-*

oblongo. T. ſeu Trifolium Fibrinum *Tab. hiſt.* ſchmahles Bieber-Klee, auf dem Hochgebürg Hochfeld beym Quell-Bächlein, *perenn.*

Mercurialis ſpicata ſeu fœmina, T. *flore apetalo viridi*, Bingel-Kraut, Weibl. *Mercuriale femelle*, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 941. *ann.* aller Orten in Gärten, und auf denen Kraut-Aeckern.

Mercurialis teſticulata ſive Mas T. *Mercuriale mâle* Bingel-Kraut, Männlein, *Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 941. cum præced. *ann.*

Meſpilus apii folio ſylveſtris ſpinoſa T. ſive *Oxyacantha vulgaris, flore ſimplici roſaceo albo, fructu globoſo*, Weißdorn, Hagedorn, *Epin blanche Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1448. in Wäldern, Büſchen, in denen Hägen und Zäunen. *perenn.*

Meſpilus folio ſubrotundo, fructu rubro *globoſo* T. ſive Cotoneaſter Geſner. *IB.* 1. 73. eſt *Chamæmeſpilus* Munting. *ubi icon elegans.* Zwerg-Neſpeln, wilde Quitten, hinter dem Ottilienberg, *perenn.*

Meſpilus folio rotundiore ſubtus incano, fructu nigro ſubdulci T. *foſculis albis roſaceis*, ſive Vitis Idæa. III. Clus. hiſt. 62. *Amelanchier*, Fliegen-Beer, im Gebürg, zu Barr uud Oberbronn. *Ic. Tab. hiſt.* 1488. *perenn.*

Meſpilus germanica folio laurino non ſerrato T. ſive *Meſpilus vulgaris. IB.* 1. 69. Neſpelbaum, in Gärten, und in denen Weinbergen, *Neflier Ic. Tab. hiſt.* 1447. *perenn.*

Meſpilus ſylveſtris foliis trifidis ſplendentibus, *Vaillant, floribus roſaceis fœtidis*, Weißdorn, mit

mit 3. eingeschnittenen Blättern, so glänzen, und weisen übelriechenden Blumen, in der Ruprechtsau, an denen Hägen, und an dem Eckbolsheimer Wald, gegen dem Caual. *perenn.*

Millefolium vulgare album T. sive *Stratiotes pennatum* terrestre *IB.* 3. 136. *foliis pinnatis, flosculis albis compositis, radiatis & umbellatis, semine tenui,* Schafgarbe, Garben Kraut, mit weisen Blumen, *Ic.* 3. *Tab. hist. pag.* 372. *Mille feuille, perenn.*

Millefolium purpureum majus T. Garben-Kraut mit rothen Blumen. *perenn.*

Myagrum monospermum latifolium T. est Myagrum monospermum *IB.* 2. 894. *flore cruciformi, fructu unicapsulari,* quod hortense *Hort. Eyst.* zu Ilkirch, neben den Ackern. *ann.*

Myosotis hirsuta altera viscosa T. kleblichter Acker Hünerdarm, Ic. Vaill. Fig. 1. Tab. XXX. auf denen Ackern, in der Ruprechtsau, an dem Weg gegen Eckbolsheim. *perenn.*

Myrrhis palustris latifolia alba T. *flore rosaceo, fructu gibbo striato,* quæ Myrrhis palustris Rivin, & Cicutaria alba Lugd. 789. Wasser Myrrhen Körfel, mit weisen Blumen, in der Ruprechtsau, in Wassergräben, bey der Lohmühl, oberhalb der Stadt, *perenn.*

Myrrhis palustris latifolia rubra T. sive Cicutaria latifolia hirsuta IB. 3. part. 2. 182. Cicutaria rubra *Lugd.* 789. breitblättrichter Myrrhen-Körfel, mit rothen Blumen, auf den Wällen, Cronenburger und Juden-Thors, *perenn.*

Myrrhis tuberosa nodosa, Conyophyllon

Mor.

p. 73. Tab III.

Nissolia. T.

J. Striedbeck. sculp

Mor. Umb. 67. ſive Myrrhis cicutaria, Tab. hiſt. Ic. 292. eſt Myrrhis fœtens Rivin. ſtinckender Myrrhen-Körfel, nach Lingelsheim, an der Landſtraß häufig, auf dem Haulenberg. *ann.*

Nidus avis T. ſive Orchis abortiva fuſca *caule & flore majore fuſco, polypetalo anomalo Ic. IB.* 2. 782. *Nid d'oiſeau*, Vogel-Neſt, Magendrehen, in ſchattichtem Gebürge, auf dem Ottilien-Berg, unter den Bäumen.

Niſſolia vulgaris T. ſive Lathyrus anguſtifolius erectus, folio ſingulari, ſine capreolis Dn. Niſſole HR Monſp. fructu ſiliquoſo, eſt Catanance leguminoſa IB. 2. 309. wilde Acker-Wicke, in denen Gerſten-Feldern, bey Ehrſtein. vid. Tab. noſtr. III.

Nux juglans ſive Regia vulgaris T. *floribus amentaceis, exjulo pendentibus, fructu ovato*, Welſcher Nußbaum, *Ic. Tab. hiſt.* 1382. *perenn.*

Ophris bifolia T. *flore herbaceo polypetalo anomalo, radice fibroſa repente*, ſive Bifolium majus, *IB.* 3. 533. Zweyblatt, zu Oßwald, in der Ruprechtsau, und zu Lingelsheim, in denen Hecken. *Double feuille, perenn.*

Opulus T. ſive Sambucus aquatica IB. 1. 152. *flore ſimplici albo monopetalo rotato umbellato, bacca molli Ic.* 4. *Tab. hiſt.* 1440. Schwelgen-Baum, Obier, in feuchten Wäldern, und auf dem Haulen Berg.

Orchis bifolia latiſſima CBp. *foliis binis ſplendentibus IB.* 2. 772. groſſe Fuchshoden, mit ſehr breiten Blättern, zu Jſkirch, *perenn.*

Orchis bifolia altera T. sive testiculus, vulpinus IV. hermaphroditicus, flore albo calcari longissimo, radice gemina longa. *Ic.* 5. *Tab. hist.* 1054. Orchis hermaphroditica, bifolia IB. 2. 772. est Testiculus vulpinus Hort Eyst. Weiß Knaben-Kraut, mit langen Spörlein, *Couillon de Renard*, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Orchis morio, foliis sessilibus maculatis T. sive *Cynosorchis maculata Tab. hist. Ic.* 5. 1048. *flore purpureo violaceo, testiculo duplici*, est Cynosorchis delphinia maculosis foliis, flore purpureo violaceo IB. 2. 760. Knaben-Kraut, mit purpurfarbenen Blumen, auf denen feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau, auf den Matten, gegen Haßlach und Rideck. *perenn.*

Orchis foliis sessilibus non maculatis T. sive *Orchis V. Clus hist.* 268. vel Orchis major tota purpurea, non maculata IB. 2. 760. est Cynosorchis fœmina HE. Ragwurtz Weiblein, mit purpurfarben Blumen, auf der Gansau, und in der Ruprechtsau, auf trockenen Wiesen. *perenn.*

Orchis morio mas foliis maculatis Vaill. 150. *sessilibus flore magno roseo, bulbo gemino*, Knaben-Kraut, mit bleichrothen Blumen, und gefleckten Blättern, am Wald, auf der Eckbolsheimer Wiese, *perenn.*

Orchis morio fœmina T. & Vaill. 150. *tota purpurea foliis non maculatis Ic. 7. Tab. hist.* 1048. *ibid.*

Orchis fucum referens colore rubiginoso T. & Vaill. 146. Tab. XXX. *flore hirsuto, foliolis superioribus*

perioribus viridibus, calcari non gaudente, bulbo gemino Ic. 3. Tab. hist. 1053. & *Buxbaum Cent. III. Tab.* XXXVIII. five Testiculus sphægodes hirsuto flore *IB.* 2. 767. braune Hummel-Blum, braun Knaben-Wurtzel, auf dürren Orten, zu Oßwald und Lingelsheim. *perenn.*

Orchis fucum referens, floribus variegatis T. Himmel-Blumen, mit bunten Blumen, auf den Paßberg zu Buchsweyler. *perenn.*

Orchis fucum referens flore subvirente T. quæ Melitias *IB.* 2. 767. & *Tab. hist. Ic.* 5. *pag.* 1056. five Testiculus vulpinus sphægodes *Lob. Ic.* 179. Fuchshödlein, mit gelb grünen Mücklein/ auf dem Haulenberg, *perenn.*

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis & purpurascentibus T. cum aviculis testiculata, sive Orchis fuciflora, galea & alis purpurascentibus IB. 2. 766. Knaben-Kraut, oder rothe Hummel-Blum, zu Lingelsheim und Hangenbietheim, *Triple Couillon de chien Ic.* 6. *Tab. hist.* 1051. *perenn.*

Orchis Araneam referens, petalis superioribus magnis, intense purpureis, rostello longiori aviculam mentiente, apice lutea, in extremitate petali inferioris Mapp. *Ic. Vaill. fig.* 10. 11. & 13. *Tab.* XXX. est Orchis Melitias seu Apis cadaverculum exprimens Lob. 180. & Vaill. 152. auf dem Paßberg zu Buchsweyler.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus, folio non maculato T. sive Palmata non maculata *IB.* 2. 774. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1059.

& H.

& H. Eyst. schmahl blättricht Knaben-Kraut, mit langen Sporen, auf feuchten Wiesen, bey Lingelsheim, *perenn.*

Orchis palmata pratensis angustifolia minor T. sive Palma Christi 3. Hort. Eyst. *flore purpureo odoratissimo, longo calcari prædito rubello*, wohlriechend Händlein Wurtz, mit schmahlen Blättern, und röthlichten Blumen / auf der Lingelsheimer Nachweyde. lc. 3. Tab. hist. 1060. *perenn.*

Orchis palmata pratensis angustifolia major. T *floribus dilute purpureis vel Palma Christi tertia HE.* auf der Lingelsheimer Nachtweyde, auf bergichten Wiesen bey Barr. *perenn.*

Eadem flore albo ibid.

Orchis palmata minor calcaribus oblongis T. quæ Palmata angustifolia non maculosa Rivin sive *Palmata rubella* IB. 2. 278. est Palma Christi fœmina Tab. *floribus inodoris rubellis*, Klein Händlein Wurtz, mit langen röthlichten besporten Blumen, zu Mundelsheim, in dem Wald zu Illkirch, zu Hangenbietheim, *perenn.*

Eadem flore albo, sed rarius.

Orchis palmata montana maculata, *flore variegato, foliis pallide viridibus angustioribus, floribus rubris punctatis*, quæ Orchis Palmata alba *IB.* 2. 775. auf dem hohen Andlauer Gebürg, *perenn.*

Orchis palmata Batrachites T. seu *Myodes Lob. ic.* 193. & Vaill. Tab. XXXI. num. 6. *flore galeato viridi* Händlein Wurtz, mit grünen Helm-

Helm-Kappen, auf dem Haulenberg, zu Oßwald und Lingelsheim, *perenn.*

Orchis palmata paluſtris latifolia T. ſive Serapias paluſtris latifolia, flore atro ſub purpuraſcente *IB.* 2.775. *folio maculato, qua Palma Chriſti* 3. *Tab. hiſt. pag.* 1061. **breit blättricht Händlein Wurtz, mit bleich röthlichten Blumen, zu Lingelsheim auf der Nachtweyde, beym Bächlein, bey den 7. Fußfällen, und in der Ruprechtsau.** *perenn.*

Orchis palmata paluſtris altera T. *foliis latioribus maculatis, floribus violaceis* Ic. Tab. hiſt. 9. 1061. ſive Palmata ſerapias paluſtris, leptophylla, violacea maculata & non maculata *IB.* 2.776. **Waſſer Händlein Wurtz, mit** punctirten **Blättern, auf feuchten Wieſen, zu Oßwald und Ruprechtsau,** *perenn.*

Orchis palmata paluſtris maculata T. ſive Palmata paluſtris Nephelodes IB. 2. 777. quæ Palma Chriſti paluſtris 1. Tab. hiſt. p. 1061. **Waſſer Händlein Wurtz, mit gefleckten Blättern,** *Ic. Tab. hiſt.* 7. *pag.* 1061. **zu Lingelsheim, und auf andern feuchten Wieſen,** *perenn.*

Orchis palmata paluſtris tota rubra T. ſive Palmata floribus impenſe rubris IB. 2. 777. *foliis & floribus non maculatis rubris*, quæ Palma Chriſti 2. eſt *Tab. hiſt.* 1061. **Waſſer Händlein Wurtz, mit gantz rothen Blumen, zu Oßwald,** *perenn.*

Orchis flore nudi hominis effigiem repræſentans Mas T. & Vaill. 147. *teſticulata* **Stendel Wurtz,**

Wurtz, wo die Blum einen nackenden Menschen præsentirt, in der Ruprechtsau, auf den Matten, und in dem XV. Wört auf grasichten Boden. *perenn.*

Orchis flore Simiam referens T. sive Cynosorchis latifolia, hiante cucullo minor Tab. hist. Ic. 2. 147. testiculata, sive Orchis Cercopithe cum exprimens lusitanica altera Breyn. Cent. 101. p. 42. gemein Knaben-Kraut, optima icon in Inst. RH. Tournef. Tom. 2. Tab. 247. & Vaill. Tab. XXXI. N. 25. fast aller Orten bey Oßwald, und auf dem Haulenberg. *perenn.*

Orchis papilionem referens foliis maculatis T. *testiculata* seu Orchis ornithophora, folio maculoso *IB.* 2. 759. *Lobel. Ic.* 183. Fuchshödlein, zu Lingelsheim, uud auf dem Gebürg, zu Rappolsweyler, *perenn.*

Orchis barbata odore hirci, breviore latioreque folio T. *calcari donata*, sive Orchis barbata fœtida *Tab. hist.* 1. 1055. & *IB.* 2. 756. *Couillon de bouc*, grosse Bockshödlein, stinckende Geilwurtz, mit breiten Blättern, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler häufig, zu Hangenbietheim, in der Ruprechtsau, beym Jägerhof, in denen Hecken. *perenn.*

Orchis odore hirci minor T. sive Triorchis, minor flore fuliginoso *IB.* 2. 764. *Ic. Tab. hist.* 3. 1053. & *Lob. Ic.* 177. *testiculata cum calcari, potius Cimicum odore, flore obsolete purpureo*, stinckend Wantzen Knaben-Kraut, bey Lingelsheim häufig, auf einer fetten und feuchten Wiesen, lincker Hand beym Krengel. *perenn.* Or-

Orchis latifolia hiante cucullo major T. *testiculata* sive Cynosorchis major trifolia, galea & alis fere cinereis *IB.* 2. 757. est Satyrium triphyllum Tab. hist. 1056. groß Knaben-Kraut, mit Aschen farbigen Blumen, zu Lingelsheim, Oßwald, und anderen Orten mehr. *perenn.*

Orchis latifolia hiante cucullo altera T. sive Cynosorchis prior Dod. pempt. 234. & *IB.* 2. 758. Berg Knaben Wurtz, auf dem Haulenberg, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Orchis latifolia spica compacta T. *purpurea testiculata* vel Cynosorchis III. Dodon. Lobelio major alter IB. 2. 762. sive Cynosorchis major IV. *Tab. hist.* 1047. Knaben-Kraut, mit dichter schön rothen Flor, nostratibus, Blutwurtz, in der Ruprechtsau, in denen Hecken.. *perenn.*

Orchis militaris major T. *testiculata, galea fusca & floribus eleganter punctatis, seu Orchis strateumatica major IB. 2. pag.* 758. sive Orchis latifolia altera Clus hist. 267. quæ Orchis latifolia est H. Eyst. Tab. 195. *Grand Couillon de Chien Ic. Tab. hist.* 5. *pag.* 1050. sub nomine Testiculus V. militaris, groß Knaben-Kraut, mit braun schwartzem Helm, und schönen punctirten Blumen, in dem Sanßauer Wald häuffig, ist unter allen die gröste und schönste.

Orchis militaris minor T. *floribus parvis albis multis punctis purpureis notata testiculata, Ic. Tab. hist.* 7. *pag.* 1051. sive Orchis strateumatica minor *IB.* 2. 19. 758. & Vaill. Tab. XXXI. fig. 29.

Eyst. breit blättricht Knaben-Kraut, mit langen Sporen, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald und Lingelsheim', *perenn.*

Variat colore carneo, lacteo, suave rubente, liturgis purpureis.

Orchis militaris pratensis humilior T. testiculata flore guttato sanguineo. sive Orchis pannonica *Clus hist.* 268. est *Orchis minima Rivin*, klein punctirtes Knaben-Kraut, bey Oßwald auf denen Wiesen.

Orchis militaris montana spica rubente, conglomerata T. *testiculata Ic.* 8. *Tab. hist. pag.* 1051. roth Knaben-Kraut, mit gedrungenem Strauß, in dem Ilkircher Wald. *perenn.*

Eadem flore albo. in dem Ruprechtsauer Wald.

Orchis minor palmata, radice repente, Camerar. ubi opt. icon seu *Orchis repens* H. Eyst. seu Helleborine sylvatica, radice repente Ray. falsch Stendel-Wurtz, in dunckeln und schattichten Orten, unter den Bäumen, in dem Barrer und Oberehenheimer Wald, *perenn.*

Orchis palmata montana maculata T. sive Palmata alba *IB.* 2. 775. vel. Palma Christi maculata, *Tab. hist. Ic.* 6. 1060. Berghändlein-Wurtz, mit weisen Blumen, und gefleckten Blättern, auf Berg Wiesen, hinter Barr. *perenn.*

Orchis palmata pratensis maculata T. *calcaribus longis, flore purpurascente*, sive Palmata speciosiore thyrso, folio maculato *IB.* 2. 774. *Ic.* 5. *Tab. hist. pag.* 1060. Händlein-Wurtz, mit gefleckten Blättern, und rothen Blumen, *Satyrion Royal,*

Royal, auf feuchten Wiesen zu Oßwald, und in der Ruprechtsau, *perenn.*

Orchis palmata pratensis maculata flore albo T. *longis cacaribus*, sive Palma Christi erecta flore candido H. Eyst. debet esse picta, cum maculis, Händlein-Wurtz, mit gefleckten Blättern, und weisen Blumen bey Oßwald. *perenn.*

Orchis palmata pratensis latifolia maculata flore variegato T. sive Palma Christi erecta, flore variegato, Hort. Eyst. Händlein-Wurtz, mit gefleckten Blättern, und bunten Blumen, auf der Nachtweyd zu Lingelsheim, *perenn.*

Orchis bifolia minor calcari oblongo CBP. sive Orchis alba, calcari longo IB 2. 771. Stendel-Wurtzel, mit weisen lang besporten wohlriechenden Blumen, zu Heilgenstein, zu Hangenbietheim. *perenn.*

Papaver erraticum majus T. sive Papaver erraticum rubrum campestre *IB.* 3. 395. *flore puniceo rosaceo, fructu ovato coronato*, rothe Korn oder Klapper-Rosen, Feld Mag-Saamen, *Coquelicoc Ic.* 1. *Tab. hist.* 966. in denen Saam- und Korn-Feldern. *ann.*

Papaver erraticum minus T. kleiner wilder Mohn, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 966. auf steinichten und dürren Korn-Aeckern, *ann.*

Parietaria vulgaris seu officinar. T. & IB. 2. 976. *flore herbaceo apetalo, folio hirsuto, semine oblongo*, Glaß-Kraut, Tag und Nacht-Kraut, *Parietaire Ic. Tab. hist.* 939. an schattichten Orten und zerfallenen Mauren.

Paſtinaca latifolia ſativa T. *flore luteo roſaceo umbellato, radice alba.* Paſteney oder Peſtnäget. *Panais ou Paſtenade Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 198. in denen Gartners-Feldern, *ann.*

Paſtinaca ſylveſtris latifolia T. ſeu *Paſtinaca germanica ſylveſtris IB.* 3. *part.* 2. 149. *floribus luteis roſaceis foliis latioribus diſſectis ſemine ovato*, ſive Branca Leonina *Tab. hiſt. Ic.* 2. 198. *Paſtenade ſauvage*, wilde Paſtenack, auf denen Wieſen, in der Ruprechtsau, *ann.*

Pedicularis pratenſis purpurea, T. ſeu *Criſta Galli, flore rubro IB.* 3. 437. *floſculis monopetalis perſonatis, foliis elegantiſſime diſſectis fructu bifario*, rother Hahnen-Kamm, *Pediculaire de prez, á fleur rouge Ic. Tab. hiſt.* 1180. & *Rivin*, auf feuchten Wieſen zu Oſtwald, *perenn.*

Pedicularis paluſtris rubra elatior, Ray. hiſt. 770. & *in Rivin.* hoher Waſſer, oder Sumpf-Rädel, mit purpurfarben Blumen, cum præced. *perenn.*

Pedicularis pratenſis lutea T. Criſta Galli Fæmina dicta *IB.* 3. 436. Hanen-Kamm, Wieſen-Rödel, mit gelben Blumen / *Crete de Cocq, á fleur jaune* auf allen Wieſen, *ann.*

Pedicularis lutea erectior pratenſis, calice floris hirſuto T. ſive Criſta Galli Mas *IB.* 3. 436. groſſer gelber Hahnen-Kamm, eſt Pedicularis lutea *Tab. hiſt.* 1180. auf Wieſen, in dem Oſtwinckel.

Pedicularis anguſtifolia montana T. *foliis oblongis anguſtis & crenatis, floribus pallide luteis.*

Wald

Wald Hahnen-Rödel, im Gebürg hinter Barr. *ann.*

Pentaphylloides argenteum alatum, seu Potentilla T. sive Potentilla vel Argentina *IB.* 2. 398. *quæ* Anserina officinarum, *flore simplici, rosaceo, foliis serratis subtus incanis*, Silber-Blatt, *Argentine*, Gänserich, an denen Wegen, und Landstrassen, *Ic. Tab. hist.* 342. *perenn.*

Phalangium parvo flore ramosum T. *Ic. IB.* 2. 635, *albo liliaceo, radice filamentosa, fructu subrotundo*, Spinnen-Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 557. Gall. *Phalangium*, zu Oswald in denen Hecken, *perenn.*

Phalangium ampliore flore non ramosum T. seu *pulchrius non ramosum* IB. 2. 635. & *Tab. hist.* 2. *pag.* 557. Erdspinnen-Kraut, in dem Ganßauer und Lingelsheimer Wald, *perenn.*

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta T. Sanguisorba minor IB. 3. part. 2. 113. Klein Sperber-Kraut, klein haaricht Pimpernell, *Ic. Tab. hist.* 316. auf allen Wiesen, *perenn. Petite Pimpernelle.*

Pimpinella sanguisorba minor lævis T. kleine glatte Pimpernell, prioris est varietas in hortis culta mutatur.

Pinus sylvestris vulgaris Genevensis T. & *IB.* 1. 253. *coma brevi, foliis rudioribus & acutioribus, floribus apetalis luteis, fructu squamoso*, Fichten oder Kienbaum, *Ic.* 5. *Tab. hist.* 1345. *Pin sauvage*, in dem Brumbter Wald, *perenn.*

Pinus sylvestris altera montana T. sive Pinus

sylvestris Mugho, sive Crein *IB.* 1. 246. Alpen Keinbaum, *Ic. Tab. hist.* 6. 1345. *perenn.*

Pisum hortense majus T. *flore candido papilioneco, fructu rotundo albo, fructu siliquoso*, runde Garten oder Stecken-Erbsen, mit weiser Blüthe, *Ic. Fuchs hist. plant. pag.* 627. auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Pisum hortense majus flore purpureo T. runde Garten oder Stecken-Erbsen, mit rothen Blumen, *ibid. ann.*

Pisum humile caule firmo T. kriechende Feld-Erbsen, auf denen besambten Aeckern, *ann.*

Pisum siliqua incurva carnosa, seu falcata *Ray hist.* 891. krumme Schoten-Erbsen, *ibid. ann.*

Pisum arvense fructu viridi T. grüne Feld oder Lotharinger Erbsen, auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Pisum arvense fructu albo T. weise Saat-Erbsen, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 883. *ann. ibid.*

Pisum majus quadratum, fructu cinerei coloris T. Lob. Ic. 65. grose 4. eckichte Stock Erbsen, *ibid. ann.*

Pisum umbellatum T sive Pisum proliferum *Tab. hist.* 882. Büschel-Erbsen, *Poir à bougets ann.*

Plantago angustifolia major T. *floce monopetalo hypocrateriformi quadripartito, radice fibrosa, fructu ovato Ic.* 1. *Tab.* 4. 1107. Spitz-Wegerich, auf denen Wiesen, und Reinen der Aecker, *Plantain, à feuilles etroites. perenn.*

Plantago latifolia glabra minor T. kleiner

glate

glatter Breitwegerich, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1107. auf denen Wiesen, zu Eckolsheim, *perenn.*

Plantago angustifolia minor T. kleiner Spitzwegerich, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1107. auf sandigen Orten, beym Canal, auf denen Wiesen zu Oßwald. *Petit plantain. perenn.*

Plantago latifolia sinuata T. gemeiner Breitwegerich, an allen Wegen, auf den Matten, beym Canal. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1107. *perenn.*

Plantago latifolia hirsuta minor T. & Haller. 472. kleiner Breitwegerich, mit haarichten Blättern, auf dürren steinichten Orten, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Plantago trinervia folio angustissimo T. *foliis valde pilosis* Wegerich, mit 3. Rippen, bezeichneten schmahlen Blättern, vor dem Fischer-Thor, auf dem Glacis, neben einer Mauer, am Rhein Ziegel-Ofen, *perenn.*

Plantago latifolia incana T. Schaf-Zunge, oder Breitwegerich, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 1107. *Plantain à la larges feuilles*, aller Orten, auf denen Wiesen, und an denen Wegen, *perenn.*

Pœonia folio nigricante & splendente T. *flore intense purpureo, simplici rosaceo, foliis latioribus dissectis, radice alba crassa, fructu siliquoso cornuto lanuginoso*, rothe Gicht oder Pfingst-Rosen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1171. *Pivoine male*, in Gärten, und in denen Weinbergen.

Pœonia fœmina flore pleno rubro majore T. *radice buboſa*, rothe gefüllte Gicht, oder Pfingst-Ro-

Rosen, *Ic. Tab, hist.* 3. 1172. *Pivoine à fleur double ou Pivoine Femelle, perenn. ibid.*

Pœonia communis vel Fœmina T. *radice bulbosa*, gemeine Pfingst- oder Gicht-Rosen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1171. *perenn.*

Polygonatum latifolium vulgare T. *flore albo simplici monopetalo, campaniformi tubulato diviso. fructu molli globoso*, sive Sigillum Salomonis officinarum, *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 1136. *Seau de Salomon à larges feuilles*, Weiß-Wurtzel, in schattichten Höltzern, zu Holtzheim, und Illkircher Wald. *perenn.*

Polygonatum latifolium maximum T. sive Polygonatum latifolium 1111. *Clus. hist.* 1. *pag.* 275. *plus grande Seau de Salomon*, groß Weiß-Wurtz, mit breiten Blättern, in dem Ganßauer Wald, über dem Krümmeri, gegen Gravenstaden, häufig. *perenn.*

Polygonatum latifolium minus, flore majore T. breit blätterichte Weißwurtz, mit grosen Blumen, auf denen Felsen bey Rappolstein, nahe bey dem alten Schloß, *perenn.*

Prunus sativa vulgaris, fructu magno crasso subacido T. vulgo Prunus damascena, flore rosaceo albo, *folio oblongo serrato*, Pflaumen oder Quetschen-Baum, *Prunier Ic.* 1. *Tab. hist.* 1403. in Gärten und Weinbergen. *perenn.*

Populago flore majore T. *rosaceo fructu vaginulato, radice fibrosa*, Dotterblum, mit grosen Blumen, *Ic. Tab. hist. pag.* 1128. an dem Mauerhof, vor der grünen Wart, am Graben. *perenn.*

Popu-

Populago flore minore T. seu Populago minor *Tab. hist.* 1128. auf der Lingelsheimer Nachtweyde, in sumpfichten Orten, beym Mauerhof. *perenn.*

Prunus fructu ovato magno flavescente, *flore albo rosaceo* T. Spilling, Imperiale jaune, in Gärten und Reben.

Prunus fructu ovato magno rubente T. *Imperiale rouge*, rothe Spilling. *ibid.*

Prunus fructu ovato maximo T. *Prune de Monsieur*, grose Spilling oder Marrunckeu. *ibid.*

Prunus fructu cerei coloris T. sive Prunea cerea *Ic.* 4. *Tab. hist. pag.* 1404. *Prune de St. Catherine*, gemeine Spilling. *ibid.*

Prunus fructu parvo dulci, atro cœruleo T. sive Pruna damascena, *Petit damas noir* Pflaumen-Baum, mit kleinen schwartzen Früchten, in allen Gärten.

Prunus fructu parvo præcoci T. sive Avenaria, *Tabern. hist.* 2. 1403. Haber-Schlehen, in denen Weinbergen.

Pyrus sativa, T. *floribus albis rosaceis*, zahmer Birnbaum, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1422. *Poirier* in allen Gärten. *hujus species fere innumerabiles recenset in Institutione rei Herb. Tournef. pag.* 628.

Pyrus sylvestris T. seu Pyra sylvestria T. *Poirier sauvage*, wilder Birnbaum, Holtzbirn-Baum, *Ic. hist.* 1425. an denen Dörffern, und Landstrassen.

Quercus latifolia Mas, quæ brevi pediculo est T. & *IB.* 1. 70. & *Tab. hist.* 1375. *flosculis rubentibus*

mentaceis fructu glanduloso, Eichbaum mit Früchten, an kurtzen Stielen, *Chene* in dem Ruprechtsauer und Ilkircher Wald.

Quercus cum longo pediculo T. sive Quercus vulgaris cum longis pediculis, *IB.* 1. 70. & *Tab. hist.* 1374. Eichbaum mit Früchten, so an langen Stielen hangen, in allen Wäldern, auf dem Weg gegen Lingelsheim, *perenn.*

Ranunculus aquaticus capillaceus T. sive Ranunculus aquaticus omnino *IB.* 3. 781. est Fœniculum aquaticum, *Tab. hist.* 3. 187. weisser Hahnen-Fuß, mit Stabwurtz-Blättern, in stehenden Wasser-Bächen, in der Ruprechtsau, und zu Ilkirch. *perenn.*

Ranunculus aquaticus capillaceus, cum globulis in extremitate foliorum *Mapp. hist. plant. alsatic. pag.* 262. in der Breusch, oberhalb der grünen Wart, *perenn.*

Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo T. *flore albo rosaceo*, sive Ranunculus aquatilis albus tenuifolius IB. 3. 781. *Grenouillette*, invenitur quandoque flore pleno, in einem stillstehenden Wasser, bey der Gansau, Fluß Hahnen Fuß, *Ic. Tab. hist. pag.* 119.

Ranunculus aquaticus albus fluitans, peucedani foliis. HLBat. seu Millefolium maratriphyllum fluitans, *IB.* 3. 782. *Ic. opt. Mapp. hist. pag.* 262. Lock mit Feuchel-Blättern.

Ranunculus aquaticus albus, foliis circinatis tenuissime divisis, floribus ex alis longis pediculis

diculis innixis Pluck. Phyt. Fluß Hahnen-Fuß, mit gar zarten Blättern, bey Molßheim, in den ausgetretenen Fluß-Wäßerlein, *perenn.*

Ranunculus aquaticus flore albo parvo hederaceo T. *Ic. IB.* 3. 782. & Lugd. 1031. Wasser Hahnen-Fuß / mit Epheu-Blättern, zu Molßheim, in den Gräben, beym Kloster St. Johann, und in den Ganßauer-Wald. *perenn.*

Ranunculus montanus aconiti folio flore albo majore T. sive *Ranunculus IV. Clus hist.* 236. & *Ic.* 5. *Tab.* 108. est Ranunculus flore albo, alpinus major, *IB.* 3. *app.* 861. Wald Hahnen-Fuß, hinter Mutzig, gegen Haßlach, an dem Bach.

Ranunculus montanus folio aconiti, magno flore *globoso luteo Ic. Clus hist.* 237. & *Tab. hist.* 11. 109. Kugel Hahnen-Fuß, auf bergichten Wiesen bey Wimmenau.

Ranunculus pratensis erectus dulcis T. süeßer Hahnen-Fuß, Ancken oder Butter-Blumen, auf denen Wiesen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 117. *perenn.*

Ranunculus pratensis major, radice verticilli modo rotunda T. *acri*, *sive* Ranunculus bulbosus, *Lob. ic.* 667. & *Tab. hist.* 108. Wiesen Hahnen-Fuß, mit knollichter braunen Wurtzel, auf Matten, zu Oßwald und Ruprechtsau.

Ranunculus pratensis minor, radice verticilli modo rotunda T. sive Ranunculus tuberosus major. *IB.* 3. 417. kleiner Wiesen Hahnen-Fuß, mit knollichter brennenden Wurtzel, St. Antoni-

us Rüblein, auf denen Wiesen, bey allen Lüften, in der Ruprechtsau an denen Wegen.

Ranunculus pratensis repens hirsutus T. flore luteo simplici IB. 3. 479. dulci kriechender barichter Wiesen Hahnen-Fuß / auf allen grasichten Orten, ingleichen auf denen Brach-Feldern. *Ic. 6. Tab. hist.* 118. *perenn.*

Ranunculus arvensis echinatus T. seu *arvorun Lob. Ic.* 665. 13. & 14. *Tab. hist.* 110. Acker Hahnen-Fuß, nostratibus Acker oder Frucht-Läuse, á Tabernæmont. *Ranunculus hic dividitur in latifol. & angustifol. sed est naturæ lusus* fast auf allen Frucht-Aeckern. *ann.*

Raphanus major oblongus T. *cortice albo & nigro, Raifort*, grose schwartze und weise Bauren-Rettich, vulg. Sprachmeister, in Gärten, und Garten-Feldern. *ann.*

Raphanus niger, T. gar groser schwartzer Rettich, Pfund-Rettich, Ic. Lob. 202. *ann. ibid.*

Raphanus major orbicularis vel rotundus T. *floribus rubellis*, gemeiner Rettich, mit rothlichten Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 797. ibid. *ann.*

Idemfloribus candidis T. Rettich mit weisen Blumen, *ibid.*

Raphanus minor oblongus T. *cortice rubro & albo*, frühe oder Monath-Rettich, mit rother und weiser Rinde: Radißgen, Ic. Matth. epit. 2. 400. *ann.*

Raphanistrum flore albo cruciformi striato, siliqua articulata glabra minore T. sive Rapistrum flore albo striato, seu Erucæfolio Lob.

Ic.

Ic. 191. Heydrettich, Hederich, auf den Aeckeren bey Gemar, *ann.*

Raphanistrum flore albo striato, siliqua articulata striata minore unicapsulari Moris hist. & *IB.* 2. 851. & *Tab. hist.* 800. weiß Hederich, auf denen Aeckeren, bey Haußbergen und Jllkirch. *perenn.*

Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido cruciformi T. Lampsana flore melino Tab hist. 793. Hederich, wilder Senf, mit schwartzen Körnern, auf allen Frucht-Aeckern. *ann.*

Rapistrum arvense folio auriculato acuto T. *siliqua rotunda floribus albis spicatis sive* Myagro affinis herba, capitulis rotundis *IB.* 2. 895. & in utroque Banhin. Rübsen, unter der Frucht, bey Niederhaußbergen. *ann,*

Rapuncalus folio oblongo spica orbiculari T. *flore cæruleo monopetalo campaniformi. fructu lacunari*, Ic. Rivin sive Rapunculus flore globoso purpureo *IB.* 2. 810. Wald-Rapuntzel, mit runden Blumen, zu Heilgenstein, auf den Gebürg, auf den Bergmatten hinter Baar. *perenn.*

Rapunculus spicatus, T. sive Alopecuroides, *foliis urticæ, spica longiore, floribus monopetalis cæruleis*, Wald-Rapuntzel, *Ic. IB.* 2. 809. Grand reponce, auf den Gebürg, zu Hochfeld.

Rapunculus spicatus flore saturate violaceo foliis maculis nigris notatis, seu comosus IB. p. 2. 809. Wald-Rapuntzel, mit Viol-blauen Blumen, und schwartz gefleckten Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald, *perenn.*

Idem

Idem foliis non maculatis *quod non luſus naturæ eſt*, *uterque non mutatur*, Wald Rapuntzel, mit blauen Blumen, und Blättern ohne Flecken. *perenn.*

Rhamnus T. ſive Rhamnus catharcticus, *flore monopetalo infundibuliformi ex albo virescente*, *foliis pyri*, *baccis nigris*, in officinis, *Spina Cervina* ſeu *infectoria*, Creutzbeeren-Baum, Färberbeer-Baum, *Ic. Tab. hiſt.* 1. *pag.* 1489. bey Zukirch und Lingelsheim. *perenn.*

Roſa ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato, folio glabro T. *fructu rubro rotundo oblongo*, wilde Feld oder Hecken-Roſen, mit rothlichten Blumen, *Eglantier Ic. Tab. hiſt. pag.* 1495. *perenn.* an denen Straſſen.

Roſa ſylveſtris odorata, flore candido T. wilde weiſe Hecken-Roſen, *ibid.*

Roſa ſylveſtris repens alba T. *floribus in umbellam congeſtis*, Haber-Roſe, an dem Weg nach Oßwald, *perenn.*

Roſa ſylveſtris, flore majore & rubente T. ſive *Roſa ſylveſtris flore rubro Hort. Eyſt.* groſe Bütten-Roſen, noſtratibus, Eſſig-Roſen, in Gärten, und zu Haußbergen, *Roſe rouge ou Roſes des Provins*, *perenn.*

Roſa campeſtris, ſpinoſiſſima flore albo odoro T. *foliis rotundis denſe diſpoſitis*, quæ Roſa præcox ſpinoſa flore albo Hort. Eyſt. ſeu Roſa pumila ſpinoſiſſima foliis pimpinellæ glabris, flore albo, IB. 2. 40. weiſe Roſen, mit Pimpernell-Blättern, in dem Eckbolsheimer

Wald/

Wald, bey den Wiesen, neben den Ackern gegen Oßwald. *perenn.*

Rosa sylvestris pomifera major T. sive Rosa pomo spinoso folio hirsuto, *IB.* 2. 38. Wilde Rosen, mit stechender grosen Frucht, auf dem Gebürg, zu Niedeck. *perenn.*

Rosa rubra simplex T. *IB.* 2. 34. seu Damascena *Lob. Ic.* 206. gemeine Garten-Rosen, mit einfachen Blättern, *perenn.*

Rosa rubra multiplex T. gefülte Garten-Rossen, mit rothen Blumen, *Tab. hist.* 2. 1493.

Rosa purpurea T. seu *Provincialis major* Tab. hist. 3. 1494. seu Rosa rubello flore majore multiplicato IB. 2. 36. grose gefülte Provinz-Rosen. *perenn.*

Eadem flore simplici.

Rosa maxima multiplex T. seu Hollandica rubella plena, seu Centifolia, *IB.* 2. 37. die gröste gefülte Holländische Rose. *perenn.*

Rosa alba vulgaris major T. seu Rosa alba, *Tab. hist. flore semipleno*, weise Garten Rosen.

Rosa flore albo pleno T. Ic. Hort Eyst. & *Tab. hist. pag.* 1493. weise gefülte Rosen. *perenn.*

Rosa lutea multiplex T. IB. 2. 48. seu Rosa flava plena, Clus hist. pag. 114. gelbe gefülte Rosen. *perenn.*

Rubus Idæus spinosus T. *flore albo rosaceo rubro globoso, odoro IB.* 2. 59. & in *Matthiol. epit.* 357. Holbeer, Himbeer-Staude, mit rother wohlriechender Frucht, in denen bergichten Büschen, bey Barr. Framboisier, *perenn.*

Rubus

Rubus Idæus ſpinoſus fructu albo T. Hohlbeer-Staude, mit weiſer Frucht, hin und wieder in Gärten, in dem Hochgräflichen Leinningiſchen Garten. *peeenn.*

Rubus repens fructu cæſio T. *cæruleo* ſive Rubus minor, fructu cœruleo *IB.* 2. 59. Klein kriechende Kratzbeer, oder Brombeer Staude, neben denen Aeckern, und Gräben gegen Oßwald, vor dem Illkircher Wald. *perenn.*

Rubus vulgaris fructu nigro T. *albo roſaceo* ſive Rubus major *IB.* 2. 57. *Ic. Tab. hiſt. pag.* 1297. *perenn. Ronce*, Kratz-oder Brombeer-Staude, mit weiſer Blüthe, in dem Eckbolsheimer Wald.

Rubus vulgaris fructu nigro, flore purpuraſcente noſtr. Brombeer-Staude, mit rother Blüthe. *ibid.*

Prior ſpecies non raro occurrit. etiam flore pleno, foliis laciniatis.

Ruta hortenſis latifolia T. *floribus luteis roſaceis, foliis ſaturate viridibus graveolentibus, fructu tetragono*, Garten-Raute, *Rue Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 387. *perenn.*

Salix humilis anguſtifolia T. *ſeu repens, ante folia, julos ferens ſuaveolentes.* Girrl-Weyde, Ic. IB. 1. 214. & Lobel. Ic. 173. an der Ill häufig, *hæc prima inter ſalices floret. perenn.*

Sambucus humilis, ſive Ebulus officinarum T. ſive Sambucus herbacea IB. 1. 546. *flore albo roſaceo multifido, fructu racemoſo globoſo.* Attich, niedriger Hollunder, Ic. Tab. hiſt. 1160. *Veble*

zu Bischofsheim und Höhnheim, am Weg. *perenn.*

Sambucus fructu in umbella nigro T. *flore albo monopetalo rotato* Hollunder-Staude, Holder-Baum, mit schwartzen Beeren, *Sureau Ic.* 1. *Tab. hist.* 1440. aller Orten, in Hägen und Hecken, bey der Catharinen-Brucke, beym Sand-Platz. *perenn.*

Sambucus fructu in umbella viridi T. sive Sambucus fructu albo *Lob. Ic.* 162. Holderbaum, mit weisen Beeren, in der Stadt, in Gärten, in den Hecken, beym Rhein-Giesen. *perenn.*

Sanicula officinarum T. sive Sanicala Mas Fuchs IB. 3. 639. *flore rosaceo, umbellato sub viridi* Sanickel, *Sanicle*, Ic. Tab. hist. 1. 244. & in Rivin. in Höltzern zu Oßwald, und Ganßauer Wald. *perenn.*

Satureja sativa T. sive hortensis *flore galeato purpurascente monopetalo*, Saturey, Bohnen-Kraut, Ic. 1. Tab. hist. pag. 744. *Sarriette*, aller Orten in Gärten, *ann.*

Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum T. *flore ex cœruleo purpurascente composito*, *folio laciniato*, Apostem-Kraut, blaue Scabiosen, *Scabieuse vulgaire*, *Ic. 6. Tab. hist.* 442. auf allen Wiesen. *perenn.*

Scabiosa major, flore ex cœruleo purpurea T. Ic. 2. *Tab. hist.* 441. grose purpurblaue Scabiosen, neben dem Canal, auf denen Wiesen zu Lingelsheim, bey der Capell, *perenn.*

Scabiosa

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima T. sive Pannonica purpureo flore IV. Clus hist. 11. breitblättrichte rothe Berg-Scabiosen, *Ic. Tab. hist.* 7. 442. auf dem Gebürg, hinter Baar. *perenn.*

Scandix vulgaris, semine rostrato T. *flore rosaceo albo*, sive Pecten veneris IB. 3. part. 2. pag. 71. & in Rivin. Nadelkörfel, *Peigne de Venus*, in denen Frucht-Feldern, fast aller Orten, Ic. 1. Tab. hist. 288. *ann.*

Scirpus palustris altissimus T. sive Iuncus altissimus seu maximus Holoschænos IB. 2. 522. *caule medulloso floribus apetalis stamineis, semine triangulari*, grosse Weyher-Binsen, Ic. Tab. hist. 565. in stillstehenden Wasser-Graben, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cœruleo T. sive Sclarea sylvestris flore magno cœruleo IB. 3. 11. *monopetalo labiato, semine subrotundo*, wilder Scharlach, Ic. 4. Tab. hist. pag. 705. & in Rivin. *sub nomine*, Hormin. pratense, *Toute bonne*, auf denen Wiesen, auf allen Contrescarpes. *perenn.*

Variat quandoque vel flore rubente vel albo.

Sclarea major, foliis in profundas lacinias incisis T. sive Gallitricum sylvestre, coma virescente IB. 3. 312. quæ Hormini sylvestris IV. prima species. Clus. hist. XXX. Scharlach, mit tief eingeschnittenen Blättern, auf dem Glacis, vor dem Spithal-Thor, auf den Wiesen zu Oßwald und Gravenstaden. *perenn.*

Se-

Senecio minor vulgaris T. sive Senecio vulgaris Erigeron IB. 2. 1041. *flore compositio luteo flosculoso papposo, semine papposo* Ic. 1. Tab. hist. pag. 462. *Seneçon*, Creutzel oder Canarien-Kraut, in allen Gärten und Feldern. *ann.*

Sideritis foliis hirsutis, profunde crenatis T. *flore monopetalo ochroleuco labiato, semine oblongo*, Zeißgen-Kraut, Beruf oder Glied-Kraut, *Crapaudine* Ic. 5. Tab. hist. 370. & Rivin, neben denen Landstrassen, an der Klamm zu Achenheim. *perenn.*

Sinapi rapifolio T. *flore subluteo cruciformi, siliqua latiuscula glabra, semine rufo*, Ic. 1. Tab. hist. 838. Wilder Senf, mit braunrothen Saamen, zu Gundershofen, neben den Aeckern, *Moutarde sauvage. ann.*

Sisymbrium aquaticum T. *supinum pumilum, flore albo simplici cruciformi, siliqua bipartita* sive Nasturtium aquaticum IB. 4. 884. Brunnen oder Wasser-Kresse, *Cresson d'eau ou de fontaine*, Ic. 1. Tab. hist. pag. 846. in fliesenden Wasser-Bächlein, auf dem Wacken, in Gräben. *perenn.*

Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo T. sive Eruca latifolia Barbarea dicta IB. 2. 862. & Tab. hist. Ic. 1. 843. Barbarea minor Boerhav. *Herbe de St. Barbe*, an denen Gräben, und andern feuchten Orten. *perenn.*

Sisymbrium aquaticum raphani folio, siliqua breviore T. sive Rapistrum aquaticum, Tab. hist. 1, 792. Wasser-Kresse, oder Hederich,

in stillstehenden Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, *Raifort sauvage, perenn.*

Sisymbrium aquaticum, foliis inprofundas lacinias divisis, siliqua breviore, T. *flore luteo cruciformi* seu Raphanus aquaticus Tab hist. 3. 797. Wasser-Rettich, mit tief eingeschnittenen Blättern, vor dem Fischer-Thor, unten an dem Glacis, an der Ill, oberhalb der grossen Schliesse, *perenn.*

Sisymbrium palustre repens nasturtii foliis T. sive Eruca palustris minor. Tab. hist. 2. 836. *Roquette sauvage*, kleine Wasser-Raucke, aller Orten in feuchtem Grunde, neben, und an denen Wasser-Flüssen. *perenn.*

Smilax unifolia humillima T. sive Unifolium vel Ophris unifolia IB. 3. 534. *flore monopetalo albicante rosaceo, folio nervoso cordato, fructu molli subrotundo*, Ein Blatt, potius Hertz oder 2. Blatt, Ic. Tab. hist. 1134. in denen Hecken, zu Oßwald, im Ostwinckel, auf dem Gebürg, hinter Barr. *perenn.*

Solanum scandens T. sive Dulcamara vel Amara dulcis *Glycipicros*, IB. 2. 109. *floribus roseis graveolentibus monopetalis cæruleis rotatis, baccis rubris*, Hundsch-Kraut, Ic. Tab. hist. 1290. an denen Wasser gestaden, gegen der grünen Wart, und auf der Gallen-Matt.

Staphylodendron Matthioli T. sive Pistacia sylvestris, *flore albo rosaceo racemo oblongo pendente, foliis fraxini, fructu vesiculari*, Pimpernüßlein-Baum, hin und wieder in der Ruprechtsau, in dem

dem Ganßauer, und Jlkircher-Wald. Ic. Tab. hist. 1430. *Nez coupez ou Pistachier sauvage. perenn.*

Stellaria aquatica Vaill. 190. & Lobel. Ic. 792. sive Fœniculum stellatum Tab. hist. 6. 187. *oblongis flosculis dipetalis albis, ex foliorum alis prodeuntibus*, auf der Wiese, beym Rhein Ziegel-Ofen, zu Eckbolsheim in dem Wald, in sumpfichten Orten. *perenn.*

Stellaria minor & repens & fluitans, nostr. seu *Alsine fluviatilis* Tab. hist. Ic. 10. pag. 1090. in feuchten Gruben, bey dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, neben dem Seiler-Bahn, vor dem weisen Thurn. *perenn.*

Stramonium fructu spinoso, flore albo simplici T. *monopetalo infundibuliformi*, live Pomum spinosum IB. 3. 624. Stech-Aepfel, *Pome Epineuse*, vor dem Metzger-Thor, lincker Hand, ohnweit dem Wirthshauß zum rothen Ochsen häufig. *perenn.*

Symphytum majus vulgare T. sive Consolida major, *flore purpureo monopetalo infundibuliformi, foliis oblongis hirsutis, radice crassa nigra, semine polito*, Schwartz oder Schmeer-Wurtz, Wallwurtz, Ic. 2. Tab. hist. 949. est Consolida Rivin. *Grande Consoude ou Oreille d'ane*, auf allen feuchten Wiesen. *perenn.*

Symphytum majus, sive Consolida major flore purpureo cœruleo T. *quæ Mas* est Symphytum magnum IB. 3. 593. Wallwurtzel, mit purpur farben Blumen. ibid.

Symphytum majus, flore albo, quæ fæmina T. Wallwurtzel, mit weisen Blumen. *ibid.*

Syringa alba sive Philadelphus Athenæi T. *flore albo rosaceo, fructu turbinato*, wilder Iasmin, Ic. Tab. 1. hist. 1457. in der Ruprechtsau, in denen Hägen und albier in vielen Gärten. *perenn.*

Tamnus racemosa T. *flore minore luteo pallescente monopetalo campaniformi, fructu ovato* sive Bryonia nigra seu lævis racemosa scandens, foliis cordatis splendentibus quæ sylvestris est Lob. Ic. 625. & Tab. hist. 1. 1288. *carot claviculis, hinc non ad Bryoniam pertinet*, est Vitis nigra Matthiol, schwartze Stick Wurtzel, falsche Mechoacana, *Bryone noire, ou faux Mechoacanne.*

Thlaspi vulgatius T. & IB. 2. 921. sive Thlaspi Vaccariæ folio incano majus, flore albo cruciformi, *fructu subrotundo plano*, quod Thlaspi majus est Tabern. hist. 2. 849. gemeiner wilder Bauren-Senf, grose Hirten-Tasche, *Moutarde sauvage*, auf denen Aeckeren, und in denen Weinbergen. *ann.*

Thlaspi arvense siliquis latis T. IB. 2. 923. seu Thlaspi majus Tab. hist. 1. 849. breit Täschel-Kraut, Bauren-Senf, mit breiten Taschen, auf denen Felderen, und Gartners Aeckern. *ann.*

Thlaspi umbellatum arvense amarum IB. 2. 925. Iberidis folio, Tab. hist. 10. 851. bitter Bauren-Senf, zu Holtzheim, auf denen Aeckeren, bey der Capell, auf dem Ottilien-Berg, Rotunda genannt, *ann.*

Thymus vulgaris folio latiore T. *flore monopetalo labiato candicante.* Thymian, noſtratibus Kümmig, Ic. in Rivin & Tab. hiſt. 2. 742. in Gärten, *ann.*

Tilia fœmina folio majore T. *flore roſaceo luteolo, fructu unicapſulari* Linden-Baum, mit breiten Blättern, Ic. 2. Tab. hiſt. 1396. auf denen Wällen der Stadt, auf der Promenade in der Stadt, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Tilia fœmina, folio minore T. & IB. 1. 137. ſive *Tilia ſylveſtris foliis Ulmi*, wilder Linden-Baum, mit kleinen Blättern, Ic. 1. Tab. hiſt. 1396. *cum præced. perenn.*

Tithymalus latifolius cataputia dictus T. *floribus monopetalis campaniformibus, fructu trigono* ſive Eſula major Rivini vel Lathyris ſive Cataputia minor IB. 3. 880. Spring- oder Treib-Körner, hin und wieder in Gärten. *ann.*

Tithymalus characias folio lanuginoſo T. ſive Tithymalus Clus. 11. hiſt. CLXXXVIII. in der Ruprechtsau, gegen dem Rhein zu. *perenn.*

Tithymalus ſylvaticus lunato flore T. *folia toto anno retinens*, immer grünende Wolfs-Milch, Ic. Optim Garidel. hiſt. plant. Tab. 102. & IB. 3. 671. in dem Oberehenheimer Wald.

Tragopogon pratenſe luteum majus T. *flore ſemi floſculoſo fructu pappoſo, Scorzonere de prez*, Ic. 1. Tab. hiſt. 994. gelber Bocks Bart, auf denen Matten zu Oßwald; und auf der Contreſcarpe, vor dem weiſen Thurn. *ann.*

Tragopogen pratense luteum minus Moris. H. R. Bles. & T. kleiner Bocks-Bart, auf denen Wiesen, in der Ruprechtsau, *ann.*

Tragoselinum majus umbella candida T. sive Pimpinella saxifraga major hircina IB. 3. part. 2. 109. *umbella candida, floribus albis rosaceis, fructu oblongo striato.* Steinbocks Pimpernell. est Pimpinella Rivin. Ic. 1. Tab. hist. 255. *grande Boucage*, zu Oßwald. *perenn.*

Tragoselinum minus T. sive Saxifraga hircina minima, Pimpinella crispa Tragi IB. 3. part. 2. 113. sive Pimpinella saxifraga minor, *foliis crispis albis rosaceis umbellatis*, Krauß Bocks-Peterlein, Ic. 2. Tab. hist. pag. 255. *petite boucage*, auf dürren Orten, in der Klamm, zu Achenheim, und Mittelhaußbergheim, auf der Gansau. *perenn.*

Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, seu Agrarium, T. aut Lupulinum Rivini, *flore luteo pupilionaceo majore*, groser gelber Feld oder Wiesen-Klee, auf der Wiesen, zwischen dem Canal, und Eckbolsheimer Wald. *ann.*

Trifolium pratense luteum, capitulo breviore, foliis meliloti, *nostr.* est Trifolium pratense luteum Fuchs, vel Trifolium pratense luteum fœmina, flore pulchriore seu Lupulino. IB. 2. 381. kleiner Wiesen oder Hopfen-Klee, *ann.*

Trifolium montanum purpureum majus T. seu 11. Clus hist. CCXLV. groser Berg-Klee, mit rothen Blumen / Ic. IB. 2. 375. & in Rivin. auf dem Gebürg, gegen hohen Andlau, *perenn.*

Tri-

Trifolium montanum album T. ſive Trifolium majus Clus. hiſt. CCXLV. eſt Anguſtifolium Rivin. groſer Berg-Klee / mit weiſen Blumen, zu Oſtwald in denen Hecken, auf dem Gebürg zu Barr, *perenn.*

Trifolium pratenſe album T. *foliis oblongis imis cordatis Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 907. *& in Rivin.* gemeiner blättrichter Wieſen Klee, *Trefle des prez à fleurs blanches.* auf allen graßichten Orten und Wieſen, *perenn.*

Trifolium pratenſe flore albo minus, & ſemine glabrum T. *foliis ſubrotundis maculatis floribus ſuaveolentibus*, & IB. 2. 280. wohlriechender Wieſen-Klee, auf der Metzgerau und Schießrein. *perenn.*

Trifolium pratenſe album inodorum, folio ſubrotundo non maculato, *noſtr.* kleiner weiſer Weg-Klee, ohne Geruch, und ohne gefleckte Blätter. ibid *perenn.*

Trifolium pratenſe purpureum T. Ic. ſive Trifolium purpureum vulgare IB. 2. 374. Tab. hiſt. 2. 908. & in Rivin. brauner Wieſen-Klee, *Trefle á fleur rouge*, *perenn.*

Trifolium ſpica ſubrotundo rubra T. ſive Lagopus maximus IB. 2. 376. groſer Haſen-Klee, *Pied de Lievre*, bey dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Hrifolium majus purpureum, foliis longioribus & anguſtioribus, ſpica longa rubicundiore, Ray. ſynops, groſer Wieſen-Klee, mit langen ſattrothen Blumen, *Eſpercette.* bey der Taback-Mühl, auf dem Schießrein.

Turritis T. *flore cruciformi, fructu siliquoso, & Lobel. Ic.* 220. seu *Turritis vulgatior, IB.* 2. 836. & *Tab. hist.* 849. Thurn-Kraut, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wört am Rhein, auf dem Gebürg bey Wassenburg, hinter Oberbronn. *perenn.*

Turritis minor T. Bot. Monsp. sive Barbarea muralis IB. 2. 869. kleiner Mauer oder Berg-Kresse, auf steinichten Aeckern, unten am Hochgebürg, Hochfelden, *ann.*

Turritis petræa seu Saxatilis, foliis imis hirsutis asperis ac sinuatis, per humum sparsis, flosculis cruciformibus ex pallide cœruleo albicantibus, Stein oder Mauer Leucojen Ic. opt. vid. Tournef. Alsat. pag. 132. an der Mauer, einer verwüsten Capell, auf dem Gebürg St. Ottiliæ, ingleichen auf dem alten Berg-Schloß, Wassenburg zu Oberbronn. *perenn.*

Typha palustris major T. *floribus apetalis exiguis, folio triangulo*, grose Liesch oder Narren Kolben, *Ic. Tab. hist.* 558. *grande Masse* in allen Gräben der Stadt, *perenn.*

Typha palustris minor T. IB. 2. 540. klein Narren oder Rohr-Kolben, Ic. 2. Tab. hist. 559. in dem XV. Wört, an der grosen Rheinbruck.

Typha palustris clava gracili T. seu media IB 2. 540. lange schmahle Narren oder Wasser-Kolben, neben dem Canal, bey der ersten Schliese, in der Tieffe, *perenn.*

Veronica Mas supina & vulgatissima T. sive Veronica vulgatior folio rotundiore IB. 3. 282. est Veronica officinarum serpens, folio rotun-

rotundiore ſerrato, *flore monopetalo dilute cæruleo rotato fructu membranaceo, Veronique mâle* Ic. I. *Tab. hiſt.* 772. gemeiner Ehrenpreiß, Männlein, in Wäldern, und andern heckichten Oertern, auf der Schlut, bey allen Lüften, in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Veronica ſpicata minor T. ſeu recta minor IB. 3. 282. vel recta minima, Clus. hiſt. 347. Ic. Tab. hiſt. 6. 773. kleiner aufrechtſtehender Ehrenpreiß, auf dürren Wieſen, gegen Oßwald, auf der Metzgerau. *perenn.*

Veronica pratenſis ſerpillifolia T. quæ repens minima Rivini, ſeu Betonica Pauli ſerpillifolia *IB.* 3. 285. *flore ex purpureo candido monopetalo rotato*, klein Wieſen Ehrenpreiß, kleiner Ehrenpreiß Weiblein, *Ic.* 2. & *Tab. hiſt.* 773. *perenn.*

Veronica minor, foliis imis rotundioribus T. ſive Chamædrys, ſpuria minor rotundifolia latifolia IB. 3. 286. quod Teucrium pratenſe ſupinum & ſpurium chamædryoides *Lob. Ic.* 490. falſch Wieſen Gamenderlein, wilder Ehrenpreiß, mit runden Blättern, vor dem Metzger-Thor, auf feuchten Wieſen, am Weg, nach der Spital-Mühl, an dem Weg nach der Schleif-Mühl. *perenn.*

Veronica ſupina Teucrii facie T. & Lobel. Ic. 473. ſive Chamædrys ſpuria anguſtifolia *IB.* 3. 285. wilder Ehrenpreiß, mit ſchmahlen Blättern, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 771. auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, auf der Eliſabethen oder Elsbetten Wall. *perenn.*

Veronica major frutescens, sive Teucrium IV. Clus. hist. 349. groser wilder Ehrenpreiß, mit breiten Blättern, est Veronica montana Rivin. auf denen Berglein, bey Niederhaußberg, neben denen Aeckern, zwischen Brumbt und Hagenau. *perenn.*

Viburnum T. sive Lantana IB. 1. 557. *flore albo monopetalo rotato, foliis crassioribus incanis parumper serratis, fructu globoso molli, Viorne Ic. Tab. hist.* 1. 461. kleiner Mehl oder Schlingbaum, auf dem Haulenberg, zu Illkirch in dem Wald, zu Oßwald, *perenn.*

Vicia sativa vulgaris semine nigro T. sive angustifolia *Rivin. flore purpureo papilionaceo, fructu siliquoso*, Feld oder Vogel-Wicken, Tauben-Wicke, auf denen Frucht-Aeckern, *ann.*

Vicia sativa vulgaris alba T. Vogel-Wicke, mit weisen Körnern, ibid. *ann.*

Vicia maxima dumetorum T. sive Cracca major *Tab. hist. Ic.* 2. 892. quæ Vicia sepium Rivin. *Vesse sauvage*, grose Wald-Wicke, Zaun-Wicke, in allen grasichten Büschen und Orten, *ann.*

Vicia multiflora T. sive *perennis, cæruleo spicato flore*, est Aracus *Tab. hist.* 891. seu Cracca Rivin. Vogels-Wicke, mit vielen Blumen, von satt blauer Farbe. *perenn.*

Vicia segetum cum T. *singularibus siliquis glabris brevibus*, Cracca minor siliquis gemellis, Flor. Jen. kleine Wicke, mit glatten Schoten, auf denen Feldern, bey Ober und Niederhaußbergen, *ann.*

Vicia

Vicia ſegetum, cum ſiliquis plurimis hirſutis T. & IB. 2. 315. *floſculis ex albo purpureis ſemine maculato* quæ Cracca minor Rivin *Ic.* 3. *Tab. hiſt.* kleine Feld-Wicke, mit vielen rauchen Schotten, unter dem Getreide bey Illkirch. *ann. Veſſeron.*

Vicia ſegetum ſingularibus ſiliquis glabris T. Wicke, mit einzeln blauen Blümlein und Schoten, an den Pulver-Magezin, zwiſchen dem Steinſtraſſer und Cronenburger Wall, auf denen Aeckern, zwiſchen Lingelsheim und Enſißheim, *ann.*

Viola martia arboreſcens purpurea T. *flore polypetalo anomalo*, ſive Iacea tricolor ſurrectis caulibus, arborea quibusdam dicta *IB.* 3. 547. blaſſe blaue Berg-Violen, Ic. Tab. hiſt. 681. & Garidel Hiſt. plant. Tab. 99. in dem Gebürg, bey hohen Andlau, in dem Ganßauer Wald, *perenn.*

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, *fructu nigricante molli, flore albo monopetalo campaniformi pendulo*, ſive Vitis Idæa. anguloſa IB. 1. 520. vel Myrtillus, *Tab. hiſt.* 1487. eſt Vaccinium Rivin Heidelbeer-Staude, mit ſchwartzer Frucht, *Myrtile* auf dem Barren Gebürg, *perenn.*

Vitis Idea foliis oblongis crenatis, fructu albo Mapp. hiſt. 334. weiſe Heidelbeeren Staude, auf dem Gebürg gegen Wangenburg, und zu Niedeck, oberhalb dem Berg-Schloß. *perenn.*

Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris, T. ſive Vitis Idæa ſemper virens, fructu rubro *IB.* 1. 522. Vaccinia rubra Lobel.

Ic.

Ic. tom. 2. 109. Steinbeer oder rothe Preißelbeeren, auf dem Ottilien Berg, auf dem Hochgebürg Hochfelden häufig, *Cousines rouges. perenn.*

MENSIS
JUNIUS ET JULIUS.

Acetosa rotundifolia hortensis T. *repens folio succulento pallide virente; floribus apetalis stamineis semine triangulari Ic.* 3. *Tab. hist.* 826. Garten-Ampfer, *Ozeille ronde, perenn.*

Acetosa rotundifolia alpina T. fol. asari rund blättrichter Berg Ampfer, an denen Felsen und Steinritzen, bey der schwartzen See, oberhalb Peris. *perenn.*

Acetosa lanceolata elatior, angustifolia Moris hist. Oxon. part. 2. 583. ubi Icon. auf dem St. Ottilien Berg, auf dem Gebürg zu Wassenburg, *perenn.*

Aconitum lycoctonum luteum T. *flore polypetalo anomalo* sive Napellus flore luteo anomalo Ic. in Rivin & in H. Eyst. gelbe Narren-Kappen, oder Eisenhütlein, Gift-Kraut, Tue Loup. ou, *Aconite à fleur jeaune*, in dem Münster-Thal, in dessen feuchten Thälern, an dem Felsen, bey Befort.

Agaricus intybaceus T. sive Fungus fimbriatus, & pulchre cristatus edulis nostr. est Fungus intybaceus *IB.* 3. 839. Eich-Schwamm, Fette Henne, in dunckelen Eich-Wäldern, unten an denen Stämmen.

Agari-

Agaricus varii coloris ſquamoſus T. ſive Fungus ceraſorum imbricatim alter alteri innatus variegatus, CBp. Ic. Clus hiſt. gen. V. perniciof. fungor. CCLXXVII. Kirſchen-Schwamm, mit mancherley Farben, an denen alten Kirſchbäumen.

Agaricus fraxineus niger, durus orbicularis T. Eſchen-Schwamm, an alten Eſch-Stämmen, und auch Eichbäumen, in dem Ilkircher und Ganßauer-Wald.

Agrimonia officinarum T. Agrimonia ſeu Eupatorium IB. 2. 398. *floſculis luteis roſaceis ſpicatis, radice nigra, fructu hirſuto oblongo echinato, caule hirſuto, folio ſerrato fiſſo*, Odermennig, *Aine Ic. Tab. hiſt.* 330. in denen Hecken, aller Orten, *perenn.*

Alcea majore & procerior T. & *Ray hiſt.* 605. *flore monopetalo campaniformi roſaceo foliis diſſectis*, hoch aufgeſchoſſen Sigmars-Kraut, hin und wieder an denen Rändern der Wälder, in den Ganſauer Wald, am Waſſer. *perenn.*

Alcea vulgaris major T. ſeu Alcea vulgaris *IB.* 2. 953. Sigmars-Kraut, Fellriß, *Alcée ou Mauve ſauvage Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1155. in der Ruprechtsau, vor dem weiſen Thurn, auf der Contreſarpe, *perenn.*

Alcea foliis rotundis laciniatis T. ſive Malva vulgaris erecta, foliis imis rotundioribus parum crenatis, ſuperioribus profunde diſſectis nob. quæ Alcea fruticans HEyſt. Ic. vid. Tab. noſtr. IV. Fellriß, deſſen unterſte Blätter rund ſind, in dem

Ilkir-

Jlkircher Wald, und auf der Contreſcarpe am weiſen Thurn, *perenn.*

Alchimilla vulgaris T. Pes Leonis ſive Alchimilla *IB.* 2. 598. *folio rotundo crenato, floribus ſubluteis apetalis hirſutis verticillatis*, Sinau, unſer lieben Frauen Mantel, *Ic. Tab. hiſt. pag.* 249. auf denen Wieſen, bey Oßwald, auf dem Haulen Berg. *perenn.*

Alchimilla ſupina gramineo folio, flore minore T. ſive Polygonum minus 111. Dodon. aut tenuifolium *IB.* 3. 377. Polygonum minus polycarpum, *Tab. hiſt. Ic.* 5. 1215. Johannis Blut, mit grünen Blümlein, auf dürren Aeckern häufig, zwiſchen der Frucht, *ann.*

Alga fontalis trichodes, vel Trichomanes aquaticum Lugdunens. 1023. eſt Muſcus longiſſimus aquaticus capillaceo folio T. im Rheingieſen, in denen Quellwäſſerlein, *quo jure vero Tournefort hanc algam Muſcis admiſcuerit, pariter cum Rupp. in flora Ienenſi non capimus, quem & ſequutus eſt Do. Mappus* in ſua hiſt. pag. 203. *qui tamen hanc, plantam duplici nomine inſignitus eſt, vid. ejus pag.* 12.

Alga viridis capillaceo folio T. ſive Conferva Plin. Lob. Ic. 257. eſt Alga vulgatiſſima & longiſſima Rupp. flor. Ien. 308. Moß-Graß, Waſſer-Graß, in allen ſtillſtehenden Pfudeln, und andern Waſſerbächen.

Alga tenuioribus filamentis & inſtar capillarium vaſorum diviſis ſegmentis Rupp Flor. Ien. 408. ſive Trichomanes aquaticum Dalechamp.

in denen Gräben, gegen der Pulver-Mühl, hinter dem Becken-Wäldlein, wie auch in dem Rheingiesen.

Alga bombycina CBp. & Prodr. 155. seu Conserva reticulata Dillen 199. Kasten oder Brunnen-Mooß, in stillstehenden Wasser-Pfützen, an denen Brunnenstein.

Allium montanum angustioribus foliis, caule maculato T. *flore albo liliaceo caule maculato radice cæpacea oblonga capillosa* & Hort. Eyst. *Ic. Tab. hist.* 875. sive Victorialis longa Clus. 189. Allermans Harnisch, Berg oder Schlangen-Knoblauch / mit schmahlen Blättern, bey der Seegmühl, hinter Otterott, in denen Hägen, an dem Weg, oberhalb Mittelbergen. *perenn.*

Allium montanum capite rotundo T. Allium sphærocephalum purpureum sylvestre *IB.* 2. 562. Allium seu Moly montanum V. Clus. hist. 193. *Ail sauvage*, Berg-Knoblauch, in denen Feldern, bey Oßwald, hinter dem Bruckhof, bey dem Gartners-Aeckern. *perenn.*

Alsine plantaginis fol. *IB.* 3. 363. & Chabræi 450. *floribus rosaceis albis, fructu subrotundo*, zu Baar, an denen alten Weiden-Bäumen, zu Oberbronn in feuchten Orten des Bergs.

Alsine altissima nemorum T. *seu major. IB.* 3. 362. *repens perennis floribus rosaceis amplioribus albis*, groß Vogel-Kraut, groser Wald Hüners-darm *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1086. in feuchten Hecken und Büschen, an dem Eckbolsheimer Wald, am Canal. *perenn.*

Alsine

Alsine aquatica media T. sive longifolia, uliginosis locis proveniens, quæ Fontana est *Tab. hist. Ic.* 8. *pag.* 1089. Brunnen Vogel-Kraut, Meyerich, zu Oberbronn, unter denen Bäumen / im Gebürg, wo das Wasser immerzu abläuft. *perenn.*

Alsine hyperici folio Vaill. Hünerdarm, mit dem St. Johannis-Kraut Blatt, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler, und Oberbronner Gebürg. *perenn.*

Duas has species Dn. Mappus pag. 16. & Dn. Dr. Haller, pag. 385. *cum Vaillantio conjunxit, cum tamen foliorum ratione, quam maxime interse differunt, quasque etiam pro diversis, speciebus Tournefort in Inst. RH.* 242. & 243. *recenset.*

Alsine spergulæ facie minima seminibus nudis T. auf kleinen Hügeln bey Gemar.

Alsine minor multicaulis T. sive Alsine minima *IB.* 3. 364. *Ic. Tab. hist.* 4. *pag.* 1087. Kleiner Hünerdarm, mit vielen Stengeln, auf sandigen Boden aller Orten, *ann.*

Alsine minor capitulis lini CB. & Bœrhav. sive Petræa minima *Tab. hist. Ic.* 3. 1088. klein Stein-Vogel-Kraut, auf steinigten Aeckern, zwischen denen Steinritzten, auf der Mauer am Graben, zwischen dem Steinstrasser und Spirer Thor. *ann.*

Alsine spergulæ facie minor, sive Spergula minor, flosculo sub cæruleo T. *rosaceo foliis tenuissimis, circa geniculum positis* seu Spergula purpurea *IB.* 3. 722. *Ic. Tournef. alsat. Tab. IV.* Klein Spergel-Kraut, mit blaulichten Blumen, auf

der

der Insul, wo die Preusch in die Ill fälst. *ann.*

Alsine saxatilis & multiflora capillaceo fol. T. quæ Auricula muris, pulchro flore, folio tenuissimo *IB.* 3. 360. *Ic.* elegans Vaill. *Tab.* 2. *fig.* 3. zwischen denen Ritzen der Felsen, des Männleinsteins, bey dem St. Ottilien Gebürg. *ann.*

Alsine tenuifolia muscosa T. seu Alsine muscosa, Lugdun 1235. & *IB.* 3:365. auf feuchten Aeckern bey Illkirch, welche unter Wasser gestanden.

Alsine maxima solanifolia T. *foliis cordatis & undulatis*, Wald Hünerdarm, mit breiten hertzförmigen Blättern, in dem Oberehenheimer Wald, auf dem Gebürg, St. Ottiliæ, *perenn.*

Alsine arenaria dicta Vaill. pag. 7. *flosculit albis rosaceis foliis tenuissimis*, est Arenaria *IB.* 3. 723. auf einer feuchten Wiese, oberhalb der Schiffmatt, bey dem Eckbolsheimer Ziegelofen, an denen Gräben, auf den Aeckern, nahe am Wirthshäusel, zwischen Lingelsheim und Ensisheim. *ann.*

Alsine palustris, folio gramineo angustiore, Dillen. vor dem Spithal-Thor, unten an dem Glacis, in der Ruprechtsau, in feuchten Gräblein.

Alyssum fœtidum T. *flosculis cruciformibus pallide luteis, foliis glasti, pallide virentibus auriculatis, capsula orbiculata*, stinckender Lein- oder Flachs-Dotter, Ic. Tournef. Alsat. *sub nomin.* Myagr. fœtid. pag. 94. in denen Gräben, an der Landstrasse, zwischen Lingels- und Ensisheim, bey Oßwald. *Myagrum puant, ann.*

Alyſſum ſegetum, foliis auriculatis acutis, T. flore & ſemine majore, eſt Myagrum ſylveſtre Zwing. vid. Ic. p. 434. aut Myagrum 1. Tab. hiſt. vel Turcium *IB.* 2. 893. Lein oder Flachs-Dotter, in denen Flachs-Stückern. *ann.*

Alyſſum ſerpillifolium, floſculis albis cruciformibus, capſula bipartita, radicula tenui filamentoſa, gar kleiner Lein-Dotter, in denen Reben, zu Oberbronn, *ann. vid. Tab. noſtr. V.*

Anblatum flore è rufo candicante T. ſive Anblatum Cordi hiſt. 89. eſt Squamaria Rivin. 12. *Tab. hiſt.* 1231. Ohnblatt, Schuppen Wurtz, in dunckeln bergichten Wäldern, in dem Rhein-Wört, zwiſchen denen Wurtzeln der Bäume, *perenn.*

Angelica pratenſis altera apii folio T. quæ Angelica tenuifolia eſt Rivin. auf denen Wieſen, hinter dem Spithal-Garten, auf der Contreſcarpe, vor dem Steinſtraſſer-Thor, rechter Hand. *Tab. hiſt.* eſt Hippomarathum 2. 161. *perenn.*

Angelica ſylveſtris minor, ſive erratica T. vel repens *IB.* 3. *part.* 2. 145. *floribus roſaceis umbellatis albis, foliis latioribus atro virentibus, ſemine oblongo ſtriato,* ſive Herba Gerardi *Tab. hiſt. pag.* 243. eſt Podagraria Rivin. Kleine wilde Angelica oder Geißfuß, hin und wieder in dem Zäunen, *perenn.*

Anonis ſpinoſa T. ſive Reſta bovis vulgaris purpurea *IB.* 2. 395. *trifolia, flore purpu-*

p. 114.

Tab. V.

Alyssum Serpilli fol.



J. Striedbeck. Sculp:

reo simplici papilionaceo, radice longa alba fru-Au siliquoso brevi, Arete beuf Hauhechel, Stall-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 913. & *Rivin.* aller Orten, auf dürren Heyden, bey allen Lüften häufig, *Perenn.*

Anonis spinosa flore albo T. & *IB.* 2. 395. Hauhechel, mit weisen Blumen, *Ic. Tab. hist.* 2. 913. *perenn.* bey der hohen Wart, zu Ilkirch, an denen Aeckern. *perenn.*

Anonis spinosa fruticosa erecta, flore purpureo, Vaill. sive Anonis Hort. Eyst. Tab. 263. neben dem Canal, und zu Oßwald. *perenn.*

Anonis spinis carens purpurea T. sive Anonis non spinosa purpureo flore *IB.* 2. 393. *Ic. Tab. hist.* 3. *pag.* 913. Hauhechel ohne Stacheln, an denen Rändern der Frucht-Aecker zu Ilkirch, in dem Wald, zu Oberbronn, an dem breiten Weg, in der Luß, copiose, *Arete beuf, sans epines. perenn.*

Aparine vulgaris semine minori T. duro, *flore albo cruciformi, fructu semine globulari, caule quadrangulo, fructu lævi,* Kleb-Kraut, mit kleiner Frucht, *Ic. Vaill. Tab. IV. fig.* 3. in der Ruprechtsau, auf denen Linsen-Feldern. *perenn.*

Asparagus sativa T. *foliis Anethi, floscul is luteis rosaceis divisis, baccis, rubris, radice squamosa alba* Spargen, *Asperge Ic. Tab. hist.* 414. in Gärten, und Gärtners-Feldern. *perenn.*

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio T. florib. rosac. seu Asparagus sylvestris, Matthioli Epit. 260. Turionibus amaris, non dulcibus, uti Mappus existimat, wilde Spargen, auf dem Glacis, *Asperge sauvage*, auf dem Glacis, vor dem Juden-Thor, zu Ilkirch, in denen Hecken, in horto medico. *perenn.*

Asplenium sive Ceterach T. *foliis pulchre sinuatis*, klein Miltz-Kraut / Stein-Farren, *Ic. Tab. hist.* 1191 in dem Niedecker-Thal, hinter Haßlach, in Ritzen rauher Felßen, *perenn.*

Aster montanus luteus, salicis glabro folio T. sive Bubonium luteum, *Tab. hist.* 2. 716. gelb Bergstern-Kraut, mit weyden ähnlichen Blättern, zu Oßwald im Ostwinckel, in denen Hecken häufig. *perenn.*

Aster omnium maximus, Helenium dictus, sive Helenium vulgare, seu Enula Campana *IB.* 3. 108. *flore luteo radiato, folio integro lato in cano semine papposo*, Alant-Wurtzel, *Aunée ou Enule Ic. Tab. hist.* 953. auf der Wiesen zu Hochfeld, und Ringendorf häufig. *perenn.*

Aster palustris luteus laciniatus T. seu altissimus sauveolens, *foliis dissectis serratis, floribus luteis radiatis*, sive Conyza helenitis, foliis laciniatis, Lob. Ic. 347. Wasser Wund-Kraut, in denen Gräben um die Stadt, zwischen den Rohren. *perenn.*

Aster arvensis cœruleus acris T. sive Conyza cœrulea *IB.* 2. 1043. scharfe kleine Dürr-Wurtzel, oder Beruf-Kraut, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1244.

Hin und wieder an dürren Orten, in der Ruprechtsau, *ann.*

Altragalus luteus perennis procumbens T. ſive *Glycirhiza ſylveſtris, floribus luteo palleſcentibus papilionaceis, fructu ſiliquoſo bicapſulari,* elt Fœnum græcum ſylveſtre IB. 2. 330. wilder fœnum grœcum, Stein-Wicke, Gliedweich, beym Schnackenloch, und St. Gallen, auf dem Glacis, vor dem weiſen Thurn-Thor, *Fœnugréc ſauvage. perenn.*

Aſtragalus luteus perennis, ſiliqua gemella rotunda, Veſicam referente, T. ſive Cicer ſylveſtre multifolium *IB.* 2. 294. *Tab. hiſt. ic.* 2. 885. eſt Glaux Rivin. wilde Ziſſer-Erbſen, auf denen Wieſen, in der Wantzenau, an denen Furchen der Aecker, bey Ehrſtein, *Pois chiches ſauvages ann.*

Aſtragalus flore viciæ, dilute purpuraſcente Moris hiſt. Ox. part. 2. 106. *ſeu Onobrychis ſubcæruleo flore IB.* 2. 337. quæ Onobrychis II. Clus. hiſt. CCXXXIX. wild Süß-Holtz, mit blauen Blumen, *ruriſſimi apud nos ejus proventus eſt, invenitur quandoque,* auf der Metzgerau beym alten Schießberg. *perenn.*

Aſtrantia major, corona floris purpuraſcente T. radice nigra, acri ſive Aſtrantia Riv. *ic. Tab.* 67. *optim. Icon. vide,* Hort. Eyſt. ſchwartzer Sanickel, ſchwartze Meiſterwurtz, auf dem Hochgebürg Hochfelden, auf dem Hauen Berg, per me luxuriat. *perenn.*

Avena vulgaris alba T. *floribus apetalis gramineis, fructu oblongo*, weiser oder gemeiner Habern, *Avoine blanche, Ic. Tab. hist.* 642. auf denen Saamen Feldern, *ann.*

Avena nigra T. schwartzer Habern. ibid.

Ballote T. sive Marrubium nigrum fœtidum IB. 3. 318. quod Marrubiastrum *Tab. hist.* 926. & Rivin, *flore monopetalo verticillato labiato purpureo, fructu quinquepartito, semine oblongo*, stinckender schwartzer Andorn, *Marrube noir puant*, an denen Garten-Zäunen, hin und wieder vor dem Fischer-Thor.

Ballote flore albo T. weiser stinckender Andorn, *rarissime occurrit, prioris est varietas, invenitur tamen quandoque cum præcedente.*

Balsamina lutea, sive *Noli me tangere* T. & IB. 2. 908. *flore pendulo polypetalo patulo luteo, folio oblongo latiusculo, fructu tumido acuminato* vel Impatiens Rivin. Spring-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 1254. in denen Wörten bey Jlkirch, zu Mutzig an dem Bach.

Barba capræ floribus oblongis albis rosaceis T. *oblongo semine* sive Barba capri *IB.* 3. 488. aut *Drymopogon. Tab. hist. Ic.* 1163. Geiß-Bart/ mit langen flockichten Blumen, auf einer feuchten Wiese, zwischen dem Mauerhof und Oßwalder Schlut, an dem Brückel.

Belladona majoribus foliis & floribus T. *fructu globulari molli, multis Solanum Maniacum* IB. 3. 611. *floribus monopetalis campaniformibus, fructu globoso nigricante molli*, Toll oder Wuthbeeren Kraut, wild

p. 109.

Tab. IV.

Alcea fol. rotund. laciniat

J. Striedbeck sculp.

wild Wald Nachtschatten, *Ic. Tab. hist.* 977. auf dem Lützelsteiner Gebürg, *perenn.*

Beta alba vel pallescens quæ Sicla officinar. T. *radice fibrosa, storibus stamineis, folio latiori costa spissa, fructu globoso*, Mangold, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 814. *Poire blanche*, in Gärten, und Garterns Feldern. *ann.*

Beta rubra radice rapæ T. rothe Rube oder Mähre, *Betterave Ic.* 3. *Tab. hist.* 814. ibid. *ann.*

Betonica purpurea T. *flore monopetalo labiato, semine oblongo*, braune Betonien, *Betoine Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 931. in Rivin. auf denen Wiesen, und in denen Hecken, zu Oßwald, *perenn.*

Eadem flore albo ibid. *sed rarius.*

Brassica campestris perfoliata, flore albo cruciformi T. & Clus. hist. CXXVII. seu *Perfoliata siliquosa IB.* 2. 835. & *Tab. hist.* 2. 1140. Feld-Kohl, Durchwachs, mit Steckruben Blättern, fast auf allen Kraut-Aeckern.

Brunella folio laciniato T. *flore monopetalo labiato purpureo, semine subrotundo*, Brunellen, mit zerschnittenen Blättern, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 2. 943. & in Rivin *perenn.* in dem Gansauer Wald häufig.

Brunella folio laciniato flore albo T. *sive non vulgaris*, 2. *Clus hist. pag.* XLIII. Brunellen, mit eingeschnittenen Blättern, und weisen Blumen, auf der Lingels- und Oßwalder Nachtweide häufig.

Brunella major folio non dissecto T. sive Brunella flore minore vulgaris *IB.* 3. 428. *flore pur-*

purpurascente, grose Brunellen, mit gantzen Blättern, und purpur rothen Blumen, *Ic. Rivin.* an denen Zäunen, gegen dem Schnackenloch, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Brunella major folio non dissecto, flore albo T. grose Brunellen, mit weisen Blumen, *rarissimi est proventus.*

Brunella, cœruleo magno flore T. *folio integro* sive *Brunella*, *Clus. hist. XLIII.* est Brunella flore magno, folio non laciniato *IB.* 3. 429. blaue grosse Brunellen, mit gantzen Blättern/ *Ic.* 1. *Tab. hist.* 944. & *in Rivin.* sub nomine Brunella majore flore, in dem Ilkircher Wald, nahe an denen Aeckern, auf der Oßwalder Nachtweyd, *perenn.*

Buglossum angustifolium majus T. seu vulgare majus *IB.* 3. 578. *flore cæruleo monopetalo infundibuliformi, semine viperini capitis æmulo,* grosse wilde Ochsen Zung, mit blauen Blumen, *Ic. Tab. hist.* 803. auf dem Glacis, vor dem Cronenburger-Thor, in dem XV. Wört, *Bugloße sauvage perenn.*

Buglossum angustifolium majus *flore albo* T. sive *Buglossum Italicum* Hort. Eyst. grose schmahle blättrichte Ochsen-Zung, mit weisen Blumen, auf denen Matten, im Urbis Thal.

Buglossoides Echii folio hirsuto, floribus minoribus eleganter cœruleis nostr. quod Buglossum sylvestre minus CB. est Echium Fuchsii pag. 269. vel Echioides flore cœruleo Rivin. wilde kleine Ochsen-Zung, mit Himmel blauen

Blumen, hin und wieder neben den Aeckern, gegen Oßwald, in der Seiler-Bahn zu Hört, wie auch nahe an dem Wald, zu Sultz häufig, vor dem Thor in einer Gruben, *petite buglosse ann.*

Buglossum arvense annuum, lithospermi folio T. *radice rubra, flore albo monopetalo infundibuliformi* seu Lithospermum arvense nigrum, flore albo, semine Echii, IB. 2. 592. est Echioides, flore albo, Rivin, wilder kleiner Meer-Hirse, kleine Ochsen-Zung, mit weisen Blumen, und röthlichter Wurtzel, aller Orten, auf denen besamten Feldern.

Bupleurum montanum latifolium T. sive Perfoliata longifol. Dalechamp. Lugd. pag. 1321. non bene, melior Ic. sub nomine Perfoliatæ montanæ Thalii. Hort. fig. XXXVIII. zwischen denen Steinen beym Sultzbad. *perenn.*

Butomus flore roseo T. sive Iuncus floridus major paludosus, *IB.* 2. 524. *floribus sub purpureis, folio gramineo triangulo, semine oblongo, Ic.* 6. *Tab. hist.* 567. Cyper oder purpur Schwertel, in denen Gräben, vor dem Spital-Thor, an der Straß. *ann.*

Cacalia foliis crassis hirsutis T. sive Cacalia quibusdam IB. 3. 569. *flosculis flosculosis purpurascentibus, semine papposo,* sive Cacalia incano folio, Clus. hist. CXV. Wald Roßhub, mit dicken haarichten Blättern, in dem Gebürg, hinter dem klingen Thal, bey der Eisenhütte. *perenn.*

Cacalia tomentosa T. *foliis magnis subrotundis, floribus subpurpureis flosculosis*, grose Wald Roßhub, mit wollichten weiß grauen Blättern, *Pied de Cheval* in dem Oberehenheimer und Barrer Gebürg. *perenn.*

Calceolus Marianus T. *flore luteo polypetalo anomalo, folio latiore nervoso fructu feneſtrato*, rothe Marien-Schüblein, Endlein, Meyen-Schellen, Sabot ou *Soulier de noſtre Dame Ic. Hort. Eyst. & Garidel, Tab.* 17. eſt Damaſonii ſpecies ſive Calceolus divæ Mariæ *IB.* 3. 518. zwiſchen Dorlisheim und Mutzig, auf kleinen Bergle in häufig. *perenn.*

Campanula arvenſis erecta T. Viola Pentagonia, *Tab. hiſt. Ic.* 683. *flore cæruleo moncpetalo, campaniformi*, *Doucette*, Frauen-Spiegel, mit ſchönen Viol blauen Blumen, in denen Frucht-Feldern in der Ruprechtsau, neben dem Jeſuiter Garten, ingleichen um Höhnheim, *ann.*

Campanula arvenſis erecta flore albo T. Frauen Spiegel, mit weiſen Blumen, in der Frucht gegen Haußbergen, *ann.*

Campanula nemoroſa anguſtifolia, magno flore major, T. ſive *Rapunculus nemoroſus Tab. hiſt. Ic.* 6. 795. Wald Rapuntzel, mit groſen Glocken, gegen Oßwald, unter den Wachholder Stauden, auf dem Gebürg gegen Mutzig. *perenn.*

Campanula nemoroſa anguſtifolia, magno flore minor T. ſeu Rapunculus nemoroſus parvo flore *Ic.* 7. *Tab. hiſt.* 794. kleine Waldglöcklein, mit ſehr ſchmahlen Blättern, vor dem Ganſauer Wald. *perenn.*

Cam-

Campanula nemorosa anguſtifolia, parvo flore major T. ſive Ranunculus nemorosus anguſtifolius, parvo flore 3. *Tab. hiſt.* 794. kleine Waldglöcklein, mit sehr schmahlen Blättern, vor dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Campanula perſicæ folio T. ſeu Campanula anguſtifolia cœrulea *IB.* 2. 803. *Ic. Clus. hiſt.* CLXXI. *flore magno cœruleo, folio anguſto atque oblongo parum crenato, radice lacteſcente. Ic. Tab. hiſt.* 2. *pag.* 699. Waldglöcklein, mit grosen blauen Blumen, und Pfersich ähnlichen Blättern, hinter Barr, auf denen Bergmatten, auf dem Gebürg, bey Waßenburg, und auf dem Haulenberg. *perenn.*

Campanula perſicæ folio flore albo T. ſeu Campanula *anguſtifolia alba IB.* 2. 803. Waldglöcklein, mit weisen Blumen, im Reichstätter Wald, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Campanula hortenſis rapunculi radice T. *repente, flore minore cœrulec, Ic. IB.* 2. 806. wilde Milchglöcklein, auf Wiesen, zwischen Lingelsheim und Oßwald. *perenn.*

Campanula minor vulgaris rotundifolia T. ſive Campanula minor, rotundioribus imis foliis Clus. hiſt. CLXXIII. blaue Wiesen, oder Puschglöcklein, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 794. überall an abhangenden grasichten Orten, und auf denen Wällen der Stadt, *perenn.*

Caryophyllata alpina lutea T. ſeu Caryophyllata montana, flore luteo magno, *fructu globoſo, ſemine caudato, Ic. IB.* 2. 398. Benedicten

Wur-

Wurtzel, mit grosen gelben Blumen, auf Berg Wiesen, hinter Rappolsweiler. *perenn.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius T. *fructu cylindraceo flore, caryophyllæo rubro simplici seu* Vulgatissimus *IB.* 3, 334. sive Caryophyllus montanus 1. *Tab. hist. Ic.* 12. 668. *Oillet rouge sauvage*, rothe Feld-Negelein, wilde Gras-Blümlein, auf denen Wiesen, bey dem Canal, und sonst andern grasichten Orten, *perenn.*

Caryophyllus sylvestris prolifer T. *floribus fasciculatis*, sive Armeria prolifera, seu Betonica coronaria squamosa sylvestris, *IB.* 3. 335. allerwegen, auf dürren grasichten Orten, auf der Wiese, bey der grünen Wart. *perenn.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius T. sive Caryophyllus montanus albus 11. *Tab. hist.* 668. Donner-Nägelein, mit weisen Blumen / zu Mutzig auf Hügeln, rarissime occurrit.

Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico T. *rubello, radice longa tenui fibrosa*, sive Betonica coronaria, aut *Caryophyllæa repens rubra*, *IB.* 3. 328. est Caryophyllus sylvestris 1. Clus. hist. pag. 282. Donner-Nägelein, mit einzeln Blumen, auf der Contrescarpe, lincker Hand, am weisen Thurn, vor dem Ganßauer Wald, auf dürren sandigen Boden. *perenn.*

Caryophyllus flore tenuissime dissecto T. sive Superba alba, medio corolla purpuro violacea obsoleta cincta, Lobel. Ic. 450. sive Caryophyllæa superba elatior vulgaris *IB.* 3. 330.

330. *Mignardiſe*, wilde Feld-Nägelein, Muth-willen, in dem Ganſauer Wald, auf Wieſen, wo die Preuſch in die Ill fält.

Caryophyllus ſylveſtris, floribus lanugino-ſis hirſutis candidis T. *ſine corniculis*, ſeu Betonica minus ramoſa coronaria *IB.* 3. 332. auf Brach-Aeckern bey Ehrſtein. *ann.*

Caryophyllus barbatus ſylveſtris T. ſeu Viola barbata anguſtifolia Dalechamp. *IB.* 3. 335. unter den Bäumen, auf der Lingelsheimer Nachtweyd, auf Matten, bey Oßwald. *perenn.*

Cataria major vulgaris T. ſive *Nepeta officinarum* Mentha Cataria *IB.* 3. *part.* 2. 225. *eſt Nepeta major Rivini, flore monopetalo labiato, foliis canescentibus, odore atri aromatico ſemine, ſubrotundo,* Katzen-Nept, Katzen-Müntz / *Herbe aux chats.* beym Wickhäuſel, in des Zollers Garten, an denen Zäunen. *perenn.*

Centaurium luteum perfoliatum T. & IB. 3. 353. *flore monopetalo, infundibuliformi luteo, radice alba fibroſa, fructu cylindraceo*, gelb tauſend gulden Blum, *Centaurée jaune Ic. Tab. hiſt.* 4. 1166. bey dem Engelländiſchen Hof, und zu Oßwald häufig.

Cepa fiſſilis T. *flore albo liliaceo, fructu ſubrotundo*, Schleiß-Zwiebel, *Ciboule, Ic. Matthiol. epit. pag.* 326. auf denen Gartnes-Feldern, *ann.*

Cepa ſectilis juncifolia T. ſive *Porrum ſectivum juncifolium Moris Hiſt. Ic. Tab. hiſt.* 873. Schnittlauch, in allen Gärten.

Cepa ſectilis, caule, floribus & ſemine vulgaris

garis Cepæ similibus, ut & Bulbulis oblongis, minime capitatis, nostr. Schnitt oder St. Jacobs Zwiebeln, *Oignon de St. Jacque Ic. Matth. epit.* 325. in Gärten und Gartners-Feldern, *perenn.*

Cepa vulgaris T. *rotunda, floribus & tunicis purpurascentibus liliaceis, foliis fistulosis*, gemeine Zibeln, *Oignon Ic. Tab. hist.* 2. 870. in Gärten, und Gartners-Feldern, *ann.*

Cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis T. sive *Cepa alba rotunda. Tab. hist.* 1. 870. weise Zibeln.

Cepa vulgaris oblonga T. & *IB.* 2. 547. Winter Zibeln, *ibid.*

Cepa ascalonica T. sive sterilis vel *fissilis IB.* Schalotten, *Ic. Matth. Epit. cap.* 327. *perenn.* in Gärten.

Cepa juncifolia minor purpurascens T. sive Porrum sylvestre latifolium purpurascens majus, wilder oder Zauber-Knoblauch, *Ic. Tab. hist* 872. *Porreau sauvage*, auf denen Brach-Aeckern, bey Ilkirch. *perenn.*

Cepa tenuifolia, sphærocephalos purpurascens T. sive Porrum sylvestre 11. *Tab. hist.* 872. wilder Knoblauch, Brißlauch, mit Binsen förmigen Blättern, auf denen Aeckern und Wiesen, beym Mauerhof. *perenn.*

Chamædrys palustris canescens T. *IB.* 2. 292. sive Scordium officinarum, *flore purpureo monopetalo labiato, folio villoso allium redolente, semine subrotundo*, Lachen Knoblauch, Ic. 1. *Tab. hist.* 1144. & *H. E. atque Rivin.* Germandrée d'Eau

ou

ou Scordium, auf wäſſerichten Wieſen, beym Mauerhof, und Oßwald, *in hortum medic, per me tranſpoſitum, luxurioſe viget. perenn.*

Chamædrys major repens T. *flore purpureo monopetalo labiato, ſeu vera exiſtimata, IB.* 3. 288. & *Tab. hiſt. Ic.* 1. 769. & *in Rivin.* Edel oder groß Gamanderlein, Bathengel, bey der hohen Wart, auf rauhem ſandigem Boden, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Chamædrys minor repens T. ſive *Chamædrys vulgaris vel.* 2. *Clus. hiſt.* 351. gemein Gamanderlein, auf allen rauhen ungebauten Orten, *perenn.*

Chamædrys minor repens flore niveo T. ſive *Chamædrys albo flore, Clus. hiſt.* 351. Gamanderlein, mit weiſen Blumen, unter den andern ed rarius, auf der Metzgerau. *perenn.*

Chamæmælum inodorum T. ſive Cotula non fœtida *IB.* 3. 120 eſt Cotula *Tab. hiſt.* 70. Kroten Chamillen, Chamillen ohne Geruch, faſt neben allen Aeckern, male dicitur inodorum, dum non omnis odoris expers eſt.

Chamæmælum fœtidum T. flore radiato, *folio amaro*, ſive Cotula fœtida, *IB.* 3. 120. *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 60. Hunds-Chamillen, Krotten Dill, *Camomille puant*, aller Orten, auf denen Feldern, an dem Weg gegen Eckbolsheim. *ann.*

Chamæpythis lutea vulgaris T. *ſeu odorata, flore luteo, monopetalo unilabiato, folio trifido oblongo*, Erdpin, Feld Cypreſſe, Schlangen-Kräutlein, *Ic. Tab. hiſt. pag.* 776, & *in Rivin.*

Ives-

Ivette ou Ive musquée, auf denen eingeerndten Feldern, bey Illkirch, Oßwald, und anderen Orten. *perenn.*

Chamæspartium IB. sive Geniſtella herbacea T. *humilis & ſagittalis, flore luteo papilionaceo*, quæ Chamægeniſta 11. Clus. hiſt. 104. niedrige Erdpfrimmen, *Ic. Tab. hiſt.* 12. 1512. zu Lingelsheim, auf graßichten Reinen, zwiſchen denen Aeckern, an der Landſtraß, oberhalb Lingelsheim, *perenn.*

Chærophyllum ſylveſtre, ſeminibus brevibus hirſutis T. ſtriatis, *floſculis albis roſaceis umbellatis*, ſeu *Caucalis foliis chærefol. Rivin.* & *Tab. hiſt.* 285. *Perſil d'asne*, Eſels-Körfel, Eſels-Peterlein, an dem Weg gegen Illkirch, neben den Hecken, *ann.*

Chærophyllum ſylveſtre alterum, geniculis tumentibus, HRP. ſive Myrrhis annua nodoſa, ſemine aſpero, *Moris, H. R. Bles, radice alba fibroſa*, um den Schießrein, an denen Zäunen, nahe der Lohmühl, vor dem weiſen Thurn an Weg, nahe bey der grünen Wart. *ann.*

Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis, quæ prima Dioſcorid. T. ſemine pappoſo, vel Chondrilla viminea. *IB.* 2. 1021. *Tab. hiſt.* 7. 487. Klebrichte Acker-Chonrillen, an denen Aeckern, in dem XV. Wört gegen dem Rhein. *perenn.*

Cichorium ſylveſtre ſeu officinarum T. *IB.* 2. 1007. *flore cæruleo compoſito ſemifloſculoſo, radice alba amara, ſemine angulato*, wilde Wegwart oder Wegweiß, mit blauen Blumen, Ci-

chorée ſauvage Ic. Tab. hiſt. 1. 467. aller Orten, neben den Landſtraſſen, *perenn.*

Idem flore albo T. wilde Wegwart, mit weiſen Blumen, an der Landſtraß, nahe dem Rebberg bey Ittenheim, *perenn.*

Cichorium anguſtifolium T. ſive *Endivia ſativa, anguſtifolia vulgaris*, Endivien, mit ſchmalen Blättern, *Ic.* 3. *Tab. hiſt.* 477. *Scariole, ou Endive*, in Gärten, und Gartners-Felderen. *perenn.*

Cichorium criſpum T. ſive *Endivia foliis criſpis*, krauſe Endivien, *Ic.* 2. *Tab. hiſt. pag.* 477. Endive creſpée ibid. *perenn.*

Cichorium latifolium, ſive Endivia vulgaris T. gemeine breitblättrichte Endivien, *Tab. hiſt.* 1. 476. *Endive á feuilles larges.* ibid.

Cichorium ſativum T. *flore cæruleo*, zahme oder Garten-Wegwart, Cichorien, mit blauen Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 467. *ann.*

Idem flore albo T. zahme Wegwart, mit weiſen Blumen. ibid.

Cicuta major T. *floribus albis roſaceis umbellatis graviſſimi odoris, caule maculoſo fiſtuloſo, fructu globoſo, Ic. Tab. hiſt.* 1170. *& in Rivin.* Schirling, Dollkörfel, aller Orten in denen Hecken, an denen Aeckern, vor dem Spithal-Thor. *ann.*

Cicutaria latifolia fœtida T. ſive Cicutaria quorundam IB. 3. *part.* 2. 184. *caule geniculato, foliis Myrrhidis latioribus & nigrioribus, floribus albis umbellatis, ſemine longo ſtriato*, ſtinckender Schirling, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 1170. *Cique puant*, in feuchten

ten schattichten Orten, vor dem Metzger-Thor, an dem Gatter.

Cicuta minor petrosselino similis T. *foribus albis cordatis, fructu globoso*, sive Cicutaria fatua, Lob. Ic. 280. aut Cicutaria Apii folio *IB.* 3. *part.* 2. 179. *Ic. Tab. hist.* 273. Cynapium Rivin. Hunds-Peterlein, kleiner Schirling, in allen Gärten, und Gärtners Feldern. *ann.*

Convolvulus major albus T. & H. Eyst. sive Convolvulus major *IB.* 2. 154. *flore campaniformi fructu subrotundo*, weise Winde, oder Zaunglocken, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1. 263. aller Orten, in denen Zäunen. *perenn.*

Convolvulus minor arvensis, flore roseo T. sive Helxine cissampelos Fuchs. 258. vel Convolvulus minor *IB.* 2. 157. kleine Kornwinde, mit röthlichen Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1263. *petit Liseron*, auf denen Frucht-Feldern zu Oßwald, *perenn.*

Convolvulus minor arvensis, flore purpureo, radiis albis picto T. kleine Kornwinde, mit röthlichten u. weiß gestriften Blumen. ibid. *perenn.*

Convolvulus minor arvensis flore candido T. kleine Kornwind, mit gantz weisen Blumen, auf denen Aeckern, bey Haußbergen und zu Illkirch. *perenn.*

Convolvulus minor arvensis flore albo, cum umbilico purpureo T. weise Kornwind, mit rothem Boden, auf den Aeckeren, bey Oberhaußbergheim. *perenn.*

Convolvulus angustissimo folio nostras cum

auri-

auriculis Pluck. Phytogr. Tab. 24. fig. 3. kleine Kornwind, mit sehr schmahlen Blättern, und geöhrten Blümlein, in Ostwinckel zu Oßwald *perenn.*

Conyza linariæ folio T. sive Helichrysos Tragi, vel Linaria III. *IB.* 3. 151. *capitulo luteo, flosculis flosculosis, semine papposo*, quæ Linaria aurea, H. Eyst. seu Linaria aurea major, Tab. hist. 1209. gulden Lein-Kraut, bey Gemar, auf saudigem Boden. *perenn.*

Corallina fœniculi folio breviore T. sive Fucus ferulaceus Lob. Ic. 255. *flore ranunculi & capitulo* est Peucedanum aquaticum *Tab. hist. Ic.* 6. *pag.* 187. existimat Dn. Mappus quod Potamogeton sit ingens gramineo fol. *vid. hist. ejus pag.* 251. *quod etiam nos confirmamus cum* Vaill. Tab. 32. f. 5.

Coriandrum majus T. seu *sativum*, *flore albo rasaceo, umbelluto foliis inferioribus latioribus, superioribus tenuius dissectis, fructu globulari Ic. Tab. hist.* 176. & *in Rivin*, Coriander, auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Coronopus sativus seu hortensis T. *flore monopetalo albo cruciformi, fructu ovato*, zahmer oder Garten Kräben-Fuß, Corne de cerf. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 302. in Gärten, *ann.*

Cruciata palustris alba T. *flosculis albis campaniformibus, fructu gemello*, sive Gallium album *Tab. hist. Ic.* 2. 433. weiß sumpficht Wald-Stroh, in sumpfichten Orten, gegen Oßwald, und zu Lingelsheim, *perenn.*

Cruciata minima T. klein ſumpficht Wald-Strob, in dem XV. Wört, in der Ruprechtsau, in feuchten Gräben.

Coronilla herbacea flore vario T. ſive Melilotus Tragi, *IB.* 2. 349. *monopetalo papilionaceo fructu ſiliquoſo, Ic. in Rivin. & Garidel. hiſt. plant. Sainfoin* gemahlte Vogelwicke, bey Achenheim in der Klamm, hin und wieder auf dem Glacis, vor denen Thoren. *perenn.*

Cyperoides veſicarium glabrum, ſpica pendula longiore T. & *anguſtiore*, e ſpicis viridantibus vel ſubfuſcis, blaſenförmiges glattes Cypern-Graß, mit hangender Blüthe, in ſumpfichten Orten, bey Illkirch, *perenn.*

Cyperoides veſicarium humile, locuſtis rarioribus T. unter dem Graß, in ſumpfichten Orten, in der Ruprechtsau.

Cyperoides ſpica pendula breviore T. ſive Pſeudo cyperus Lobel. ſpicis vel paniculis pendentibus, ex longis pediculis, *IB.* 2. 496. in moraſtichen Orten, in der Ruprechtsau, gegen dem Rhein.

Cyperus rotundus inodorus germanicus T. ſeu Cyperus aquaticus ſeptentrionalis Lob. *Ic.* 77. & *IB.* 2. 503. runder wilder Galgant, nahe an der Brenſch, bey der grünen Wart. *perenn.*

Cyperus vulgatior panicula ſparſa T. ſive *Gramen* cyperoides aquaticum vulgatius Lob. Ic. 20. & Scheuchz. Agroſtaph. 398. & 400. Tab. IX. fig. 7. & 8. item *Tabern. hiſt.* 6. *pag.* 533. groß Cypern-Graß, mit flatterichtem Strauß, in denen Gräben um die Stadt, an der Ill, an

Herrn

Herrn Prætoris Schloß-Garten, zu Illkirch.

perenn.

Cyperus maritimus capitulis glomeratis T. five Iuncus acutus maritimus, caule triangulo CBprodr. 22. in dem Rheingiesen häufig, auf der grünen Wart, auf feuchten Matten, *perenn.*

Cyperus gramineus T. & IB. 2. 504. est Cyperus graminea five miliacea *Lob. Ic.* 79. Cypern-Graß / mit flatterichtem Hirse Strauß, an denen Gräben der Wasser, bey dem Schießrein, an der Bruck, oberhalb der Lohmühl, am Wickhäusel, und an der Ill. *perenn.*

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante T. seu Gramen parvum pulchrum, panicula compressa nigricante *IB.* 2. 471. & *Tab. hist.* 4. 533. Klein Ried-Graß, auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält, in allen wässerichten Gräben. *perenn.*

Cyperus minimus panicula sparsa subflavescente T. seu Gramen pulchrum parvum, panicula lata compressa, *IB.* 2. 470. & Scheuchz. agrost. *Tab. VIII. fig.* 13. klein Ried-Graß, mit gelben Kölblein, auf feuchten Wiesen, beym Schnackenloch, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Daucus officinarum T. five Daucus vulgaris *Clus. hist. CXCVIII. Ic. Tab. hist.* 195. vel Pastinaca sylvestris aut Staphylinus Græcorum, *IB.* 3. *part.* 262. est Staphylinus Rivin. *flosculis albis rosaceis umbellatis, in medio puncta rubra, fructu subrotundo*, Vogels-Nest, wilde Möhren, gelbe Pest-Nägel, *Carotte sauvage*, auf allen Wiesen.

Daucus ſativus radice lutea T. *Ic. Tab. hiſt pag.* 192. gelbe Möhre oder Rube, Carotte jaune, auf allen Gartners-Feldern, *perenn.*

Daucus ſativus radice alba T. weiſe Möhre oder Peſt-Nägel, *Carotte blanche ibid. ann.*

Daucus ſativus radice atro rubente T. rothe Möhre oder Rube, noſtratibus rothe Ranen, *Carotte rouge Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 192. *ibid. ann.*

Delphinium ſegetum flore cœruleo T. ſive *Conſolida regalis arvenſis, flore minore IB.* 3. 210. *cœruleo polypetalo anomalo, foliis tenuiſſime inciſis, ſemine angulatos*, Korn oder Feld-Ritter-Sporn, in denen Korn-Feldern, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 131. & *in Rivin. Pied d'alouette ann.*

Digitalis minima Gratiola dicta T. ſive *Gratiola IB.* 3. 443. *floribus monopetalis anomalis tubulatis, dilute purpuraſcentibus, fructu rotundo acuminato*, Gottes Genad, Purgier-Kraut, *Ic. Tab. hiſt.* 754. & *in Rivin. Herbe á pauvre homme*, an dem Rand der wäſſerichten Wieſe, vor der grünen Wart, und bey dem Mauerhof. *perenn.*

Eadem flore albo. T. quæ Gratia Dei Hort. Eyſtett. wilder Aurin, mit weiſen Blumen, zu Dorlisheim, auf feuchten Wieſen.

Doronicum plantaginis folio alterum T. *villoſo ex adverſo poſito, flore aureo radiato, ſemine pappoſo, ſive Doronicum Germanicum, IB.* 3. 19. vel Arnica Schrœd. & officin. eſt Damaſonium Dioſcorid primum, *Tab. hiſt. pag.* 1116. groß Lucians-Kraut, Wolferley. *Doronic à feuilles larges ou de plantain*, auf dem Hochgebürg Hochfeld

Feld auf denen bergichten Wiesen, zu Buchsweyler auf dem Paßberg. *perenn.*

Echium vulgare T. & *IB.* 3. 586. *flore cæruleo monopetalo infundibuliformi, semine viperino*, wilde Ochsen-Zung, mit blauen Blumen, *Herbe aux Vipere Ic. Rivin.* bey Oßwald, auf dem Glacis, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Echium majus & asperius flore albo *monopetalo infundibuliformi semine, viperino* T. seu Echium flore albo majus *IB.* 3. 588. wilde Ochsen-Zung, mit weisen Blumen, in dem Ostwinckel, auf dem St. Ottilien Berg, zwischen Eckbolsheim und Ittenheim an der Werb. *perenn.*

Echium majus & asperius, flore dilute rubente T. wilde Ochsen-Zung, mit rothen Blumen, hinter St. Arbogast, rarissimi est proventus. *perenn.*

Emerus Cæsalpini T. qui Coronilla major Rivin. sive Colutea scorpioides 1. *elatior.*, *Clus. hist.* 97. & *Tab. hist.* 1. 1503. Schaf-Linsen, mit Scorpions-Kraut Schoten, zu Inlenheim, an der Maur im Wirthshauß, zu Blinschweyler beym Schloß häufig, *perenn.*

Emerus minor T. sive colutea siliquosa minor, est Scorpioides *Clus. hist. pag.* 97. *Tab. hist.* 2. 1503. auf dürren Aeckern bey Lützelburg, auf dem Falckensteiner Hochgebürg. *perenn.*

Epilobium ramosum & siliquosum foliis angustis, flore purpureo cruciformi nobis. sive Lysimachia siliquosa specioſa angustifolia *IB.* 2. 907. *Est Epilobium spicatum fo-*

foliis integerrimis, linearibus fasciculatis Haller 458.

Epimedium Dod. pempt. 539. seu Epimedium quorundam *IB.* 2. 395. *floribus cruciformibus luteis, limbo purpureo cinctis, siliqua unicapsulari, radice repente, fructu siliquoso unicapsulari*, auf dem Haulen Berg, *per me transplant. ubi nunc luxuriat. vid. Tab. nostr. VI.*

Equisetum palustre brevioribus setis T. sive Equisetum palustre Lob. Ic. 795. sumpfichter Rossschwantz, mit kurtzen Bürsten, auf sumpfichten Wiesen, vor dem Fischer und Spithals-Thor, *perenn.*

Equisetum foliis nudum ramosum T. sive Junceum ramosum *Ic. Tab. hist.* 568. Schaft Heu, mit neben Zweig, *Queue de Cheval, avec la branche*, in allen Stadtgräben. *perenn.*

Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum T. seu Equisetum nudum *Tab. hist.* 568. Schaft Heu, ohne neben Zweig, *Queue de cheval. sans branche. perenn.*

Equisetum foliis nudum minus variegatum Basileum T. *radice nigra, juto brevissimo*, zu Oßwald auf feuchten Wiesen, in dem XV. Wört am Rhein. *perenn.*

Equisetum palustre longioribus setis T. sive *Hippuris Lob.* 793. & *Tab. hist. Ic.* 2. 565. vel Equisetum majus aquaticum IB. 3. 728. groß Wasser Roß-Schwantz, in der Ruprechtsau, bey dem Jäger-Hof, auf dem Schießrein, am Wasser. *perenn.*

Equi-

p. 136. *Epimedium. T.* Tab. VI

J. Striedbeck Sculpx.

Equiſetum ſylvaticum tenuiſſimis ſetis T. in feuchten Wäldern, in dem Illkircher Wald, bey dem Faſanen-Garten. *perenn.*

Erica vulgaris glabra T. ſive Erica humilis vulgaris ſemper virens, flore purpureo *IB.* 1. 354. *monopetalo, foliis ſabinæ ſimilibus, fructu ſubrotundo*, Heyde, mit rothen Blumen, *Ic. Tab. hiſt.* 1. & 2. 1517. *Bruyere*, bey allen Lüften, bey der Schlut, *perenn.*

Erica vulgaris glabra, flore albo T. ſeu Erica alba *Tab. hiſt.* 3. 1517. Heyde, mit weiſen Blumen, in dem Eckbolsheimer Wald, *ſed rarius occurrit. perenn.*

Eruca ſylveſtris major lutea, caule aſpero T. *floribus cruciformibus flaveſcentibus, fructu ſiliquoſo*, wilde Raucke, *Ic.* 3. *Tab. hiſt.* 837. *Roquette ſauvage*, in der Ruprechtsau, in den Rhein-Wörten, vor der Citadell, gegen Kehl. *perenn.*

Eruca tenuifolia perennis, floribus luteis T. & *IB.* 2. 861. kleine wilde Raucke, bey dem Ziegel-Ofen, gegen dem Rhein, neben wäſſerichten Gruben, bey Oßwald und Lingelsheim. *perenn.*

Eryngium vulgare T. & *IB.* 3. 85. *floſculis albis roſaceis umbellatis, ſemine ovato*, Manstreu, Bracken-Diſtel, *Ic. Tab. hiſt. pag.* 1072. *Chardon Roland, ou à cent têtes*, bey allen Lüften, und andern graſichten dürren Orten. *perenn.*

Eryſimum alterum, ſiliquis Erucæ T. *fructu ſiliquoſo* ſive 2. *Tab. hiſt.* 840. an dem

Weg nach der Rheinbruck, an dem Canal, *perenn.*

Eupatorium Cannabinum T. *flore flosculoso, semine papposo*, sive Eupatorium adulterinum *IB.* 2. 1065. Wasser Dosten, Kunigunden-Kraut, *Eupatoire Ic. Tab. hist.* 336. an dem Canal, bey Eckbolsheim, in dem Stadt-Graben, vor dem weisen Thurn, *perenn.*

Filago vel Impia T. sive Gnaphalium vulgare majus, *floribus flosculosis coagmentatis, semine papposo*, grose Feld-Katzen, Ruhr-Kraut, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 781. *Herbe à Cotton*, in der Ruprechtsau, auf ungebauten und sandigen Feldern, zu Oßwald. *ann.*

Filago seu Impia altera T. sive Gnaphalium majus, angusto oblongo fol, CBp. schmahl Blättrig Ruhr-Kraut, auf dem Schießrein, in steinichten Gruben. *ann.*

Filago vulgaris tenuissimo folio erecta T. sive Gnaphalium vulgare tenuifolium *IB.* 3. 159. auf dürren trockenen Ackern zu Oßwald. *ann.*

Filago incana, capitulis in summis caulibus & ramulis dispositis Dillen. append. Catal. plant. Giss. klein Ruhr Kraut, mit schwartzen Köpfen, auf der Insul wo die Breusch in die Ill fält, und andern feuchten Orten mehr. *ann.*

Filicula, quæ Adiantum nigrum officinarum T. pinnulis obtusioribus, sive Adiantum nigrum officin. seu vulgare *IB.* 3. 742. foliis lougioribus pulverulentis, pedicula nigro, gemein

Franen-

Frauen Haar, *Ic.* 5. *Tab. hiſt.* 1185. *Capillaire noir ou ordinaire*, zu Baar, und Oberbronn, zwiſchen denen Steinfugen, *perenn.*

Filicula fontana major, ſive Adiantum album Filicis folio T. *IB.* 3. 741. Brunnen Farren-Kraut, bey dem Ottilien Brunnen, an denen Felſen, neben denen Quellwäſſerlein zu Heilgenſtein, *perenn.*

Filicula fontana minor T. ſive Filicula fontana *Tab. hiſt. Ic.* 3. 1181. klein Brunnen Farren-Kraut, beym Quellwäſſerlein, auf dem Gebürg St. Ottilien, an denen Felſen. *perenn.*

Filicula ſaxatilis corniculata T. ſive Holoſtium petræum *Tab. hiſt. Ic.* 3. 1113. Schlangen-Zwang, auf dem St. Ottilien Berg, zwiſchen denen Felſen. *perenn.*

Filipendula vulgaris T. *flore albo roſaceo, radice fibroſa*, rother Steinbrech, *Filipendule. Ic.* IB. 2. 189. auf der Oßwalder Nachtweyd. *perenn.*

Filix non ramoſa dentata T. vel Filix Mas ſive non ramoſa IB. 3. 737. Filix ſive *Mas officinarum, Fougere Male*, Wald Farn, gemeine Farren ohne Zweig, aller Orten in Wälderen, im Brumbter und Hördter Wald, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1181. *perenn.*

Filix ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis T. eſt Filix major & prior Tragi, ſive ramoſa repens IB. 3. 735. vel Fœmina, *Fougere femelle Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 1181. groß Farn-Kraut, Weiblein, mit zweigen, *perenn.*

Filix ramoſa minor pinnulis dentatis T. ſive

Filix ramosa minor IB. 3. 741. vel Filix querna vel arborea *Ic.* 7. *Tab. hist.* 1182. Baum oder Eich Farren, auf allen zerfallenen Bäumen, in den Wäldern, auf dem Gebürg zu Barr. *perenn.*

Filix non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis T. sive Filicula lutea fœmina *Ic.* 7. *Tab. hist.* 1182. in dem Hochgebürg, gegen Hochfeld, est Filix dentata Munting 288.

Filix minor non ràmosa T. sive paluſtris minor, quæ Filix querna Lobel. seu Dryopteris Ic. 815. aut Petræa fœmina *Tab. hist. Ic.* 2. 1182. Sumpf-Farren, an dem Bach beym Kloster Peris, bey grosen feuchten Steinen, oberhalb Keyſersberg. *perenn.*

Filix Rhætica tenuissime dentata T. & IB. 3. 740. sive Filix dentata T. est Filix dentata, Munting. fig. 84. pag. 288. oberhalb Ottrott, gegen Lützelburg auf dem Gebürg. *perenn.*

Filix ramosa dentata, ramulis & pinnulis longius, ab invicem distantibus Mapp. hist. Ic. VIII. pag. 106. in dem Haßlacher Thal, unter denen Thannen-Bäumen. *perenn.*

Filix non ramosa latifolia dentata, profundiùs pinnulis maximis Bœrh. Ind. plant. pag. 26. unter den kleinen Thannen, hinter St. Ottilien Berg. *perenn.*

Filix mollis sive glabra vulgari mari non ramosa accedens *IB.* 3. 738. & *Vaill.* 53. *Tab.* 9. *fig.* 4. Farren-Kraut, mit weichen zarten Blättern, auf dem St. Ottilien Berg, beym Brunnen. *perenn.*

Filix

Filix ramosa major, pinnulis acutissimis non dentatis CBp. in dem Haßlacher und Wimmenauer Gebürg. *perenn.*

Filix tenuissime secta ex monte Ballon. IB. 3. 739. Farren-Kraut, mit gar zarten eingeschnittenen Blättern, auf dem Gebürg zu Niedeck, in dem Wald hinter hohen Andlau. *Ic. Vaill. Tab. IX. f. 3. perenn.*

Fœnum græcum sativum T. *flore albo papilionaceo, foliolo ex uno pediculo terno, fructu siliquoso,* Bockshorn, Fönugröck, *Ic. IB. 2. 363. & in Rivin.* auf denen Gartners-Feldern. *ann.*

Fungoides infundibuliformâ semine fœtum T. in denen Waldungen, am faulen Holtz, *Ic. Vaill. Tab. XI. fig. 67.*

Fungus betulaceus orbiculatus albus T. *Ic. Clus. hist. CCLXXVIII. noxior. genus Fung.* & IB. 3. 841. weiser Bircken-Schwamm, in allen Waldungen, an abgehauenen alten Bircken-Stämmen, in dem Ganßauer Wald.

Fungus pileolo lato orbiculari flavescente T. *esculento* sive Capreolini *Tab. hist.* 1520. est Fungus pallidus *IB.* 3. 832. gelbe Pfifferlinge, auf dürren Erdreich, vor dem Ganssauer Wald.

Gallium album vulgare T. & IB. 3. 721. *latifolium, flore albo simplici campaniformi, fructu gemello,* groß Stern Meger-Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 434. & *IB.* 3. 721. *perenn.*

Gallium album supinum multicaule Flor. Ien. 4. & Dillen. append. 3. klein niedrig stehend Meger-Kraut, in dem XV. Wört, und

andern

andern Orten, in feuchten Gräblein. *perenn.*

Gallium luteum T. seu *Verum* IB. 3. 720. unser Frauen Bett-Stroh, *Caille laict* Ic. I. *Tab. hist.* 432. auf allen Glacis, vor der Stadt, aller Orten an den Reinen der Aecker, *perenn.*

Gallium flore pallido, seu flavescente T. Wald-Stroh, mit bleich gelben Blumen. Ic. IB. 3. 721. neben dem Ganal, in Gruben, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald. *perenn.*

Gallium arvense flore cœruleo T. sive Rubia cœrulea erectior elatiorve IB. 3. 719. & Chabræi pag. 547. blau Acker Meger-Kraut, auf Berg-Ackern, gegen Haßlach und Niedeck. *ann.*

Gallium montanum latifolium ramosum T. sive Rubia sylvatica lævis IB. 3. *Caille laict de montaigne*, Bergstern-Kraut, groser Waldmeister, Ic. *Tab. hist.* 434. *perenn.*

Genista tinctoria germanica T. sive Tinctorius flos, *IB.* 1. 391. *flore luteo papilionaceo, fructu siliquoso*, kleine Acker Pfrimmen, Genster, *Petit. Genet ou Fleur à teindre* Ic. 6. *Tab. hist.* 1510. hinter der Citadel, neben den Aeckern in der Wantzenau, auf denen Matten / *perenn.*

Genista tinctoria germanica foliis angustioribus T. Genster, mit schmahlen Blättern, est Genistella Rivini. auf dürren Wiesen, zu Oßwald. *perenn.*

Genista spartium majus, brevioribus & longioribus aculeis T. sive Genistellæ spinosæ affinis, Nepa quibusdam IB. 1. 400. sive Scorpius

us 1. Clus. hist. 106. Hag oder Zaun-Ginster, grose stechende Pfrimmen, est Genista spinosa Rivin. in dem Schloß-Garten zu Brumbt. *perenn.*

Genista spartium minus germanicum T. sive *Genista aculeata, folioſa* IB. 1. 399. kleine stechende Pfrimmen, *Petit genet piquant* est Genistella spinosa Rivini, in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Genista ramosa, foliis hyperici T. sive Genistella pilosa IB. 1. 393. est Genista minima Dalech. 173. *folia ejus inferius lanuginosa, superius glabra sunt.* auf dem Gebürg hinter hohen Andlau. *perenn.*

Genistella herbacea sive Chamæspartium IB. 1. 393. sive Chamægenista 11. Clus. hist. 104. Genistella articulata & Sagittata *nobis* niedrige Erd-Pfrimmen, an der Landstrasse, nach Ensisheim, und an den Reinen der Aecker, zu Lingelsheim. *perenn.*

Gentiana alpina pumila verna major T. sive Gentianula quæ Hippion. IB. 3. 527. *flore elegantissime cæruleo monopetalo campaniformi*, sive Gentiana VI. Gentianella minor verna Clus. hist. 315. Himmels-Stengel, blaue Roß-Violen, in dem Ilkircher Wald, und bey Oßwald vor dem Wald, *perenn.*

Geranium columbinum dissectis foliis, pediculis, florum longissimis T. Storcken-Schnabel, oder Tauben-Fuß, mit gespaltenen tief eingeschnittenen Blättern, in

in denen Hecken, an der hohen Wart an Oßwald, *ann.*

Geranium ſanguineum maximo flore T. *ro-ſaceo, radice craſſa* IB. 3. 478. *Ic.* 13. *Tab. hiſt.* 126. *eſt Geranium hæmatodes VII. Clus hiſt.* CII. *Sanguinaire*, Berg Storchen-Schnabel, mit groſen rothen Blumen, an denen Reinen der Reben zu Oberbronn. *perenn.*

Geranium phæum ſeu fuſcum, petalis reflexis T. Ic. Hort. Eyſt. & IB. 3. 477. braun ſchwartzer Berg Storchen Schnabel, mit gebogenen Blumen, auf Berg-Wieſen zu Barr, auf dem Haulen Berg / *per me ſatum. perenn.*

Geranium phæum petalis rectis ſeu planis, Moris hiſt. oxon, ſive *Geranium phæum, pullo flore Clus. IB.* 3. 477. *utrumque maculatum aut non maculatum eſt.* Storchen-Schnabel, mit aufrecht ſtehenden Blumen zu Barr, auf denen Berg-Matten. *perenn.*

Geranium Batrachioides, collum gruis germanorum ſive *Gruinalis Lugd.* 278. Storchen-Schnabel, mit langen Schnäbeln, auf Hügeln bey Seltz, auf brachliegenden trockenen Aeckern, zu Cron Weißenburg *perenn.*

Geranium batrachioides, Gratia Dei German. T. & IB. 3. 475. *Ic.* 6. *Tab. hiſt.* 124. groſer blauer Storchen-Schnabel, auf dem Gebürg, gegen dem Stein thal, und Hochfelden, *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum latifolium T. ſive *Arundinaceum paniculatum Tab. hiſt.* Ic. 2.

§25.

525. est *Gramen majus aquaticum* Lob. & IB. 2. 481. groß Ried-Graß, an dem Ufer der Ill, und Breusch, in allen Stadt-Gräben auser denen Thoren. *perenn.*

Gramen aquaticum spicatum, spica cylindracea brevi T. sive *Gramen fluviatile album Tab. hist. Ic.* 2. 530. weiß Fluth oder Fluß-Graß, in denen Gräblein, neben den Gartners-Feldern, unterhalb dem Wickhäusel, in stehenden Wasser Gruben am Canal, *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum fluitans T. *panicula longissima*, sive *Gramen fluviatile Tab. hist. Ic.* 1. 530. Endten oder schwimmend Graß, in denen meisten Wasser-Gruben, vor dem Fischer und Spithal-Thor. *perenn.*

Gramen paniculatum spicis crassioribus & brevioribus T. *folio aspero, floribus pallide luteis, aut etiam subrubris* Scheuchz. Agrost. pag. 300. seu *Gramen asperum* IB. 2. 467. quod spicatum Dalechamp. 427. Strauß Graß, mit rauhen Blättern, auf denen Wällen umb die Stadt. *perenn.*

Gramen paniculatum latifolium, radice repente crassiori T. sive *Gramen canarinum longius radicatum IB.* 2. 457. groß Duecken-Graß, in dem Ochsen Wört. *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum miliaceum T. *Ic. Vaill. Tab. XVII. fig.* 7. Wasser Graß, mit einem Hirse Strauß, zu Oßwald und Gravenstaden an Gräben, *perenn.*

Gramen paniculis elegantissimis, sive Ἔρυσις majus T. sive Gramen paniculatum sati-

vum, Heragroſtis *Tab. hiſt. Ic.* 11. 518. hinter der hohen Wart, neben denen Aeckern, *perenn.*

Gramen panicula fere arundinacea, locuſtis breviſſimis T. ſive Gramen pratenſe vulgare ſpica fere arundinacea IB. 2. 461. an dem Canal, auf denen Matten bey Eckbolsheim. *perenn.*

Gramen paniculatum arundinaceum, panicula denſa ſpadicea T. ſive *Calamagroſtis quorundam* Lob. Ic. 6. Waſſer-Feder-Graß, auf feuchten Wieſen zu Oßwald, beym Mauer Hof, an dem Canal, in denen Hecken, *perenn.*

Gramen paniculatum proliferum T. ſive Gramen cum panicula molli rubente *IB.* 2. 464. hin und wieder auf verfallenen Mauren der Dörfer, auf ſteinichten dürren Wieſen, neben dem Rhein-Gieſſen. *perenn.*

Gramen avenaceum, panicula purpuro argentea ſplendente Ray hiſt. 1909. auf trockenen Wieſen, in der Metzgerau, auf dem Glacis, vor dem Juden Thor, *perenn.*

Gramen avenaceum locuſtis glabris purpuraſcentibus & ariſtatis T. ſeu Gramen murorum *Dalechamp.* 428. in denen Korn-Felderen bey Druſenheim. *perenn.*

Gramen avenaceum ſpica ſimplici, locuſtis candicantibus ſplendentibus & rarioribus T. in dem Ganſauer Wald, unter denen Hecken. *perenn.*

Gramen avenaceum locuſtis villoſis craſſioribus, T. ſive *Feſtuca graminea glumis hirſutis*, Treffl oder Twalch, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 544. auf den

Wällen

Wällen und Werckern um die Stadt, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Gramen avenaceum montanum lanuginosum T. sive *Gramen avenaceum Tab. hist.* 15. 579. *locustis parvis candidis pilosis*, Haber-Graß, mit haarichten Köpfen, auf dem Gebürg zu Oberbronn. *perenn.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis minoribus & aristatis T. sive Festuca altera Lob. Ic. 33. quod Bromos est *Tab. hist. Ic.* 1. 544. an denen Wegen und Ackern bey Oßwald, zu Eckbolsheim unter der Frucht am Weg, bey der Carthauß. *perenn.*

Gramen avenaceum locustis villosis angustis candicantibus & aristatis T. sive *Gramen murorum spicis pendulis angustioribus* Dillen Catal. plant. Giss. 71. hin und wieder auf den Mauren, auf dürren Wiesen und Aeckern zu Oßwald. *perenn.*

Gramen avenaceum utriculis lanugine Havescentibus T. sive *Avena pilosa IB.* 2. 433. wild Haber-Graß, unter dem Habern, auch unter der Gerst. *perenn.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majoribus & aristatis T. sive *Avena fatua Tab. hist. Ic.* 1. 544. Gauch Habern, unter der Frucht, und an denen Wegen. *perenn.*

Gramen avenaceum montanum locustis rubris T. seu Gramen locustis rubris *IB.* 2. 434. in der Ruprechtsau gegen dem Rhein, neben den Aeckern. *perenn.*

Gramen antoxanthum ſpicatum T. Ic. Lugd. 426. ſpica flaveſcente, Wieſen-Graß mit gelblichten Aehren, zu Oßwald, auf trocknen Wieſen. *perenn.*

Gramen capillatum paniculis rubentibus IB. ſive Gramen ſegetum panicula ſparſa latiore Lob. *Ic.* 2. pag. Acker-Graß / mit einem rothen Strauß, unter der Frucht um die Stadt. *perenn.*

Gramen capillatum, paniculis viridantibus IB. ſive Gramen agrorum *Lob. IB.* 2. 461. *Tab. hiſt.* 4. 526. *perenn.*

Gramen loliaceum radice repente ſive Gramen officinar. T. *foliis viridibus ſpica triticea compacta*, Quecken oder Hunds-Graß, *Chien dent. Ic.* 5. *Tab. hiſt.* 516. an denen Wegen, und auf denen feuchten Aeckern. *perenn.*

Gramen loliaceum majus, ſpicis longius diſtantibus T. auf denen Wieſen, und an dem Weg, bey Oßwald. *perenn.*

Gramen loliaceum, panicula multiplici ſpicata T. an dem Gräblein bey Gutleuthen, und an der Landſtraß gegen Schiltigheim an denen Wegen in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen loliaceum ſpicis brevioribus & latioribus compreſſis. Moris hiſt. Ox. auf ausgetretenen Fußpfaden gegen Oßwald. *perenn.*

Gramen loliaceum ſpica ſimplici & denſa T. ſive *Gramen anguſtifolium ſpicæ tritici muticæ ſimili* CB prodrom. 17. ubi Icon. auf den Wieſen, zwiſchen dem Canal-Schlieſen und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Gramen loliaceum corniculatum, ſpicis villoſis T. ſive *Gramen avenaceum dumetorum ſpicatum* Dillen. Append. Catal. plant. Giſſ. pag. 170. ubi Ic. an denen Hecken Eckbolsheimer Walds, wie auch zu Gravenſtaden und Oßwald *perenn.*

Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpica T. ſive Phœnix lolio ſimilis *IB.* 2. 436. Mauſe Gerſten, *Ic. Tab. biſt.* 546. *perenn.*

Gramen loliaceum repente radice ſive *Gramen ariſtis longioribus donatum* T. *Ic. Vaill. Tab. XVII. fig.* 2. neben denen Aeckern zu Illkirch. *perenn.*

Gramen loliaceum ſpica longiore ariſtas habens T. Lulch oder Schwindel-Korn, *Ic.* 1. *Tab. biſt.* 550. auf denen Weitzen und Korn-Feldern, *perenn.*

Gramen loliaceum ſpica longiore ſine ariſtis T. an der Landſtraß, und neben denen Frucht-Feldern, zu Eckbolsheim. *perenn.*

Gramen loliaceum corniculatum ſpicis glabris T. in trocknen Gräblein / bey Schiltigheim und auf dem Heilgenſteiner Gebürg. *perenn.*

Gramen loliaceum minimum, foliis junceis, panicula unam partem ſpectante T. ſive *Gramen ſpartum noſtras parvum* Lob. Ic. oberhalb hohen Andlau und Hochfeld. *perenn.*

Gramen loliaceum altiſſimum, ſpica Brizæ per longa, ariſtis brevioribus donata T. eſt *Gramen ſpica Brizæ majus CB. prodr. ubi Icon.* auf denen

nen Matten, zu Druttenhausen häufig, in dem XV Wört am Rhein.

Gramen loliaceum minus capillaceo folio, spica Brizæ longissima T. sive *Gramen tenuifolium glabrum IB.* 2. 462. radice nigra, auf denen dürren Wiesen zu Mutzig. *perenn.*

Gramen nodosum avenacea panicula CBp. sive *Gramen bulbosum nodosum* Lob. Ic. 23. & Scheuchz. Agrost. Tab. 4. fig. 27. Knoten Graß, auf feuchten Aeckern. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio T. spica fere arundinacea, Heu-Graß, *Ic. 2. Tab. hist.* 575. *perenn.*

Gramen paniculatum minus radice repente panicula duriore T. auf denen Mauren, des alten Stadtgrabens.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum T. roth Strasen-Graß, *Ic. Tab. hist.* 16. 519. an allen Wegen.

Gramen pratense paniculatum minus album T. *Ic.* 15. *Tab. hist.* 519. weiß Strasen-Graß, aller Orten an dem Wegen.

Gramen paniculatum medium T. est *Gramen pratense minus IB.* 1. *pag.* 542. auf allen mageren Wiesen.

Gramen paniculatum majus locustis magnis candicantibus tremulis T. sive *Gramen tremulum majus*, Zitter-Graß, Hasen Brodt, Amourettes tremblentes *Ic. Tab. hist.* 541. auf Wiesen zu Oßwaldt.

Gramen paniculatum minus, locustis parvis

vis tremulis, T. & IB. 2. 470. sive *Gramen tremulum minus, panicula parva, radice rufescente repente*, klein Zitter-Graß, oder Hasen-Brodt, auf dürren Wiesen zu Oßwald. lc. CB. prodr. pag. 4. *perenn.*

Gramen paniculatum majus, locustis magnis phœniceis tremulis T, sive Gramen tremulum majus, panicula spadicea CBp. groß Zitter-Graß, mit braun rothen Hülsen, ibid. und auf denen Wiesen, bey Reichshofen häufig. *perenn.*

Gramen pratense, panicula duriore, laxa, unam præcipue partem spectante, Ray synops. 257. auf Wiesen, gegen der Gansau. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum molle CBpr. pag. 5. seu Gramen lanatum Dalechamp Lugd. 425. & IB. 2. 466. auf dürren Wiesen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen minus vulgare, panicula rigida T. sive Gramen duriusculum *Tab. hist.* 18. 520. klein hart Graß, vor dem Spithal-Thor, bey der Seiler-Bahn. *perenn.*

Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis semine T. klein Ried-Graß, an dem Wasser der Ill, und der Breusch. *perenn.*

Gramen paniculatum arundinaceum, spica multiplici T. sive Gramen Calamagroltis Lobel. IB. 480. Rohr oder Ried-Graß, auf der Gansau, an dem Rhein, vor dem weisen Thurn Thor, in denen sumpfichten Orten. *perenn.*

Gramen nemorosum, panicula rufescente molli

molli T. sive Sylvaticum *Ic. Tab. hist. pag.* 537. Wald-Graß, in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa T. sive Gramen miliaceum *Lob. Ic.* 3. *& Tab. hist. Ic.* 13. 518. Wald Hirse Graß, an dem Canal, und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis T. auf dem Spithal-Wall, auf denen Aeckern bey Illkirch. *perenn.*

Gramen spicatum vulgare secalinum T. sive Holcus Plin. Anguillaræ Lob. *Ic.* 30. est Hordeum murinum *IB.* 2. 431. Gersten-Graß, Twalch, an allen Fuß-Pfaden, und Wegen. *perenn.*

Gramen spicatum secalinum minus T. Ic. Vaill. Tab. VII. fig. 4. Mauß-Gersten, taub Korn-Graß, an allen Fuß-Pfaden, an denen Mauren alter Stadt-Gräben. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea longissima T. sive Gramen cum cauda muris majoris longa, majus *IB.* 2. 472. *perenn.*

Gramen spicatum, spica cylindracea brevi, radice nodosa T. est *Gramen nodo sum tertium CB. rodrubi icon.* auf dem St. Ottilien Berg.

Gramen spicatum, spica cylindracea molli & densa T. sive Gramen alopecuroidi accedens & Phalaridi, spica longiuscula, folio

longi-

longiusculo *IB.* 2. 474. Fuchs-Schwantz, oder Kolben-Graß, auf allen Wiesen und Glacis.

Gramen secalinum spicatum altissimum T. gar groß Gersten-Graß, auf dem Wall, zwischen dem Juden und Steinstrasser-Thor, in den Ruprechtsauer-Wald, an denen Hecken. *perenn.*

Helleborine montana angustifolia flore purpurascente T. *polypetalo anomalo fructu fenestrato.* sive Damasonium purpureum dilutum aut Elleborine IV. *Clus. IB.* 3. 516. wild schmahl blättricht Nießwurtz, *Ic. Tab hist.* 3. 1100. auf dem Haulenberg, bey Mundolsheim. *perenn.*

Helleborine altera flore rubente T. sive Elleborine botryoides seu Alisma racemosum IB. Nießwurtz, mit gantz rothen Blumen, hinter Rappolsweyler, auf dem Hochgebürg, in dem Granwört neben den Aeckern, am Wasser gegen der Citadell. *perenn.*

Helleborine flore albo T. seu *floribus albis* IB. 3. 516. *Ic. Tab. hist.* 2. 1100. breite Berg-Nießwurtz, mit weisen Blumen, hinter dem Berg St. Ottilia häufig. *perenn.*

Helleborine montana latifolia T. sive *Elleborine Dodon. IB.* 3. 516. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1100. est *Helleborine Rivin.* beym Jäger-Hof und Illkircher Wald, an dunckten Orten, *perenn.*

Helleborine angustifolia palustris sive pratensis T. *flore herbaceo intus nonnihil candicante*

IB. 3.

IB. 3. 517. wilde Nießwurtz, auf feuchten Wiesen, in dem Ostwinckel, und in dem Graben, vor dem Cronenburger Thor. *perenn.*

Heliotropium majus Dioſc T. ſive Heliotropium majus *Clus. hiſt. XLVII. flore albo monopetalo ſemine angulato & gibbo infundibuliformi*, Krebs-Blumen, auf denen Aeckern, zu Ehrſtein auf dem Haulenberg. *ann.*

Hieracium alpinum, latifolium villoſum, magno flore T. *ſemiſtoſculoſo, ſemine pappoſo* ſive Hieracium Alpinum hirſuto folio, 5. Clus. CXLI. breit berg Habich-Kraut, mit haarichten Blättern, oberhalb Niedeck und gegen Dachsburg.

Hieracium aſperum majori flore T. & IB. 2. 1029. *luteo ſemiſtoſculoſo* ſive Hieracium intybaceum alperum *Tab. hiſt. Ic.* 6. 492. rauh ſchmahl blättricht Berg Habich-Kraut, mit groſſen Blumen, auf dem Glacis, vor dem Fiſcher-Thor, und an denen Reinen der Aecker. *ann.*

Hieracium dentis leonis folio bulboſum T. ſive Intybaceum *Tab. hiſt. Ic.* 6. 492. eſt Hieracium dentis leonis folio monoclonon ſub aſperum CBp. 121. & *ſic bis in pinace occurrit quod in prodr.* 62. *deſcribitur & cum Jeon. Tabern. exacte convenit.* auf dem Ganſau, gegen dem Jäger-Hof.

Hieracium pratenſe latifolium non ſinuatum majus Haller. caule aphyllo ſtriato, breit blättricht Wieſen Habich-Kraut, zwiſchen Hördt und Brumbt auf denen Wieſen. *vid. Tab. noſtr. VII.*

Hiera-

p. 154.

Tab. VII

Hieracium latifol non pratense Sinuat. Haller.

J. Striedbeck. sculp:



Hieracium dentis leonis folio obtuſo majus T. ſive Hieracium longius radicatum *Tab. hiſt. Ic.* 7. 492. Habich-Kraut, mit Pfaffen-Röhrlein Blättern, und langen Wurtzeln, auf denen Wieſen bey Oßwald, an denen Reben bey Baar. *perenn.*

Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus T. & CB. prodr. 63. auf denen Aeckern bey Ehrſtein *perenn.*

Hieracium murorum folio piloſiſſimo T. ſive *Pulmonaria gallica vel aurea Ic. Tab. hiſt.* 1. 504. eſt Pulmonaria flore luteo *IB.* 2. 1033. haaricht Habich-Kraut, auf alten Mauren und Tächern, in Waldungen. *perenn.*

Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum T. ſive Horminum ſylveſtre Clus. hiſt. XXIX. *flore monopetalo labiato cæruleo*, eſt Horminum ſpurium Rivin. an denen Landſtraſſen, und an denen Aeckern, gegen Siegelsheim. *perenn.*

Hydroceratophyllum, folio lævi, octo cornubus armato Vaill. & plus diviſo, gehörntes glattes Waſſer Garben-Kraut zu Illkirch, zwiſchen denen Wörten. *perenn.*

Hyoſcyamus vulgaris & niger T. *caule folioque piloſo, floſculis monopetalis infundibuliformibus luteis ſtriatis, radice alba, fructu campaniformi operculato*, Bilſam-Kraut, *Iüsquiame noir, Ic. Tab. hiſt.* 68. & *in Rivin.* an denen Landſtraſſen, in der Ruprechtsau an denen Gärten-Zäunen. *perenn.*

Hype-

Hypericum vulgare T. *floribus luteis rosaceis, foliis glabris conjugatis caule rotundo, fructu tricapsulari* sive Perforata *IB.* 3. 387. *Millepertuis* St. Johannis Kraut, *lc. Tab. hist.* 1. 1249. *perenn.*

Hypericum ascyrum dictum caule quadrangulo T. & IB. 3. 382. sive *Hypericum glabrum non perforatum, caule quadrato sub rubro, flosculis luteis minoribus.* hart Heu, oder St. Johannis Kraut, mit 4. eckichten Stenglen, *lc. Tab. hist.* 4. 1250. & *Hort. Eyst. Tab.* 247. in denen Wörten bey Ilkirch, in groser Menge, *perenn.*

Hypericum minus erectum T. seu pulchrum Tragi *IB.* 3. 353. klein aufrecht stehend Johannis Kraut, an dem Weg nach Blobsheim, in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Hypericum minus supinum glabrum T. & repens sive Hypericum supinum tertium minimum Clus. hist. CCCXXXI. klein niedrch kriechend St. Johann Kraut, auf Brach-Aeckern, bey Oswald und Ilkirch, *perenn.*

Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato T. & *IB.* 3. 383. hart Heu, ohne Zweig und breiten Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald, bey dem Canal, in denen Hecken, auf der Gansau. *perenn.*

Hypericum villosum erectum caule rotundo T. sive *Hypericum Androsæmum dictum IB.* 3. 382. Conrads-Kraut, auf dem Paßberg neben denen Hecken, in groser Menge, auf dem St. Ottilien Berg. *perenn.*

Hyssopus officinarum cœrulea seu spicata T.

Isop

Ysop *flore monopetalo labiato semine oblongo*, Kirch-Ysop, mit blauen Blumen, *Ic. I. Tab. hist. pag.* 651. in Gärten, und auf denen Kirch-Höfen. *perenn.*

Eadem flore rubro & albo T, ibid.

Iacea pumila supina purpurea *Vaill. pag.* 203. *foliis latis integris radice repente*, est Cyanus latifolius repens CBp. 274. fast auf allen dürren grasichten Orten und Wiesen. *perenn.*

Iacobæa vulgaris laciniata T. & *IB.* 1057. *flore luteo radiato semine papposo*, St. Jacobs-Blum, *Fleur de St. Iacque Ic. Tab. hist.* 485. hin und wieder an denen Strassen, *perenn.*

Iacobæa vulgaris foliis instar Erucæ laciniatis T. sive *Jacobæa vulgaris altissima, foliis artemesiæ æmulis*, St. Jacobs-Blum, mit Beyfuß Blättern, an dem Eckbolsheimer Canal, Schliesse, in dem Gebüsch. *perenn.*

Iacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata T. sive *Pannonica, folio non laciniato IB.* 2. 1058. quæ Iacobæa 11. Clus. hist. XXII. gegen Hochfeld, in dem Hohenwald, *perenn.*

Imperatoria major T. *flore albo rosaceo umbellato flore latiore diviso, radice alba crassa odorata, semine ovato striato*, Meister-Wurtzel, *Ic. I. Tab. hist.* 238. & *in Rivin. Imperatorie*, in vielen Gärten. *perenn.*

Iuncago palustris & vulgaris T. flore roseo sive *Gramen junceum & spicatum seu Triglochin I.* 2. 508. geährt lang gespitztes Binsen-Graß in der Ruprechtsau auf der Schiffmatt. *perenn.*

Iun-

Iuncus nemorosus folio articuloso T. sive *Gramen junceum sylvaticum Tab. hist.* 535. est Gramen rore lucidum nemorense sive Luzulæ 2. 492. Wald Binsen-Graß, in dem Eckholsheimer Wald, in denen Gruben, bey der Ziegel-Hütten, in dem Ganßauer Wald. *perenn.*

Iuncus palustris humilior repens erectus T. sive *Holosteum Matthiol. junceum IB.* 2. 510. *quod Gramen junceum Tab. hist. Ic. VI.* 536. Krotten-Graß, Crapaudine in allen sumpfichten Orten. *perenn.*

Iuncus foliatus minimus IB. 2. 523. gar klein Binsen-Graß / in sandigen Gruben, neben dem Canal, häufig. *perenn.*

Iuncus lævis panicula non sparsa T. sive Iuncus Matthioli *IB.* 2. 520. & *fragilis*, glatte Binsen, mit gedrungenem Strauß, Wiesen-Binsen, *Ic. Tab. hist.* 565. aller Orten auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Iuncus lævis panicula sparsa major T. sive Iuncus foliaceus *IB.* 2. 521. vel *Iuncus lævis Tab. hist. Ic.* 4. 566. gemeine Binsen, in allen Wasser-Gräben in Sumpfen.

Iuniperus vulgaris arbor T. *flore viridi amentaceo, radice resinosa, fructu globulari*, Wachholder Baum, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1538. *Grand Genevrier*, hin und wieder, in denen Bauren-Höfen, und Gärten. *perenn.*

Iuniperus vulgaris fruticosa T. sive Iuniperus vulgaris, baccis parvis purpureis *IB.* 1. 293. *foliis angustis acuminatis pungentibus, baccis nigricantibus*

sibus Ic. 1. *Tab. hist.* 1557. Wachholder Staude, *Genevrier*, vor dem Mauerhof, gegen Oßwald. *perenn.*

Lactuca crispa T. vel 11. *Tabern. hist.* 506. *aut tenuiter dissecta* IB. 2. 2. 999. Endivien-Lattich, *ann. ibid.*

Lactuca romana longa dulcis T. & IB. 2. 998. *folio obscurius virente, semine nigro*, brauner Sommer-Endivien, Florentiner-Salat. *Laictue Romaine ann. ibid.*

Lactuca foliis Endiviæ T. seu *Intybacea Tab. hist. Ic.* 4. 806. weiser Sommer-Endivien, *ann. ibid.*

Lactuca folio oblongo, acuto T. Lactuca longo & angusto fol. IB. 2. 999. spitziger Lattich, *ann. ibid.*

Lactuca Italica laciniata CBp. pag. 60. *Laictue Royale.* zarter Endivien-Lattich. *ibid. ann.*

Lampsana Dodon. T. *floribus luteis semiflosculosis*, sive Sonchus sylvaticus. *Tab. hist. Ic.* 8. 500. Wald Sonchen-Kraut, auf Kraut-Aeckern, ingleichen an denen Zäunen. *ann.*

Lapathum folio acuto crispo T. *semine triangulari, floribus apetalis* sive *Lapathum acutum crispum* IB. 2. 988. Grind-Wurtzel, krause Mengel Wurtzel, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 823. & *Munting hist. pag.* 690. *Patience frisée, perenn.* an denen Wasser-Gräben, vor dem Spithal Thor.

Lapathum folio acuto plano T. sive *Lapathum planum paludosum Munt. Herb. Britann. pag.* 120. & *Tab. hist.* 822. gemeine Grind-Wurtzel,

bey

bey vorherstehenden und an dem Rhein Ziegel-Ofen, *perenn.*

Lapathum folio acuto rubente T. sive *Lapathum sanguineum*, *Munting. hist.* 691. & IB. 2. 988. *alias Sanguis draconis herba.* Drachen-Ampfer, roth Mengel-Wurtzel, *Sang de dracon ou Patience rouge Ic. Tab. hist.* 824. hin und wieder auf denen Aeckern, in Feldern und Gärten. *perenn.*

Lapathum folio minus acuto Lob. Ic. 285. seu *vulgare folio obtuso.* IB. 2. 984. auf dem Schießrein und Ilkirch, an dem Wasser. *perenn.*

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum T. & IB. 2. 988. in denen Wörten bey Ilkirch, *perenn.*

Lathyrus sylvestris major T. seu dumetorum IB, 2. 302. *flore suave rubente papilionaceo, fructu siliquoso, c. 4. Tab. hist.* 885. la Gesse & H. Eyst. & in Rivin. Waldwicke, in denen Hecken bey Oßwald, *perenn.*

Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta T. sive *Lathyrus siliqua hirsuta* IB. 2. 305. est *Lathyrus sylvaticus siliqua hirsuta Rivin.* Wicke mit schmahlen Blättern, und haarichter Schote, hin und wieder in denen Frucht-Feldern, zu Gravenstaden häufig. *ann.*

Lenticula palustris quadrifolia CBp. sive *Lens palustris quadrifolia* IB. 3. 785. *radice repente*, vier blättrichter Wasser-Klee. *Lentille á quatres feuilles Ic. elegans Mapp. hist. alsat.* 166. & *Tab. hist.* 2. *pag.* 890.

890. in sumpfichten Orten, vor dem Fischer und Spithal-Thor. *perenn.*

Lenticula aquatica trisulca CBp. sive *Hederula aquatica*. Lobel. *Ic.* 2. *pag.* 36. est *Hederula palustris Tab. hist.* 1281. flore dipetalo, Wasser-Linsen, Wasser-Epheu, mit 3. spitzigen Blättern, in denen Gräblein am Huren-Graben, wie auch in Gräben, neben der Aubruck. *perenn.*

Lenticula palustris vulgaris CBp. sive *Lens palustris IB.* 3. 784. *Ic. Tab. hist.* 890. ubi ic. sed minus accurata. & Vaill. Tab. XX. fig. 2. Wasser- oder Endten-Linsen, in allen stillstehenden Wasser-Gräben. *Lentille d'eau, ou de marais, ann.*

Lenticula palustris superne virens, inferne nigricans, IB. 3. 784. seu potius *Lenticula palustris, foliis majoribus, subtus rubentibus*, Flor Altorf. Ic. Vaill. Tab. XX. fig. 2. grose Wasser-Linsen, in denen Gräben, bey der Schiffmatt, bey denen Eckbolsheimer Ziegel Ofen. *ann.*

Leucanthemum vulgare T. *caule folioso, flore radiato*; sive Bellis major IB. 3. 114. Gänse Blumen, grose weise Maßlieben. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 710. aller Orten auf den Wiesen. *perenn.*

Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea T & IB. 3. 759. *Pulmonaire de Chene, Lichen arborum Ic. Tab. hist.* 1. 1199. Lungen-Mooß, Baum Lungen-Kraut, in allen Waldungen, an alten Eich- und Buch-Bäumen. *perenn.*

Lichen pulmonarius saxatilis maximus cinereus. T. Stein oder Felsen Lungen-Kraut, auf dem Ottilien Berg, an denen Felsen. *perenn.*

Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis T. an alten Stämmen, der Weyden-Bäumen, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Lichen pyzidatus, acetabulorum oris coccineis & tumentibus T. an Stämmen, abgefaulter Bäume, in dem Ganßauer Wald, und an denen Steinen, St. Ottilien Gebürgs. *ann.*

Lichen cinereus vulgaris capillaceo folio minor T. sive Muscus arboreus cum & sine orbiculis, Baum-Mooß, blühend ästiges Baum-Mooß. *Ic.* 2. & 3. *Tab. hist.* 1195. in Waltungen, zwischen denen Aesten, erwachsener Eich-Bäume, *perenn.*

Lichen cinereus latifolius ramosus T. sive Muscus arboreus coralloides CBp. Ic. Vaill. Tab. XX. fig. 6. Baum-Mooß mit Zweigen, an denen Eich-Bäumen, in dem Wald, zu Schweighausen. *perenn.*

Lichen capillaceus longissimus, ex fago & abiete pendens T. coroll. an Muscus arborcus barbatus IB. 3. 764. groß hangend Baum-Mooß, an alten Eich und Bircken-Bäumen, zu Schweighausen. *perenn.*

Lichen fruticosus pendulus candicans, extremitatibus cauliculorum umbilicatis coccineis! Mapp. hist. alf. 170. in den XV. Wört, in einem quellenden Wasser-Loch.

Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana CBp. & IB. 3. 758. est Lichen Fuchs. ubi Ic. elegans 476. Brunnen oder Steinleber-Kraut, in denen unsaubern Brunnen-Bütten. *perenn.*

Li-

Lichen petræus ſtellatus aut Lichen. 2. Lob. Ic. 246. eſt Hepatica ſecunda *Tab. hiſt. Ic. 2. pag.* 1200. Stein Leber-Kraut, in wäſſerichten und ſchattichten Gärten.

Lichen petræus umbellatus ſive 3. Lob. Ic. 246. vel Hepatica III. Tab. hiſt pag. 1200. bey Quellen und Bächlein, in dem Urbis-Thal, auch in feuchten Gärten.

Lichen minimus foliolis laciniatis. Ray. hiſt 126. bey dem St. Ottilien Brunnen, an denen Felſen, neben der Quelle.

Lilium montanum floribus reflexis rubentibus T. *radice ſtava ſquamata, fructu oblongo*, ſive Lilium flore rubente ferrugineo majus & minus IB. 2. 692. eſt Martagon vulgare *Tab. hiſt.* 4. 1029. & Garidel hiſt. plant. Tab. 63. wilder türckiſcher Bund, oder Gold-Wurtzel, Heyden-Lilien, auf denen Gebürgen gegen Hochfeld. *perenn.*

Lilium montanum floribus reflexis albis non punctatis T. Gold-Wurtzel, mit gantz weiſſen Blumen, auf dem Hochfeld, und eine Stund hinter Hochfeld. *perenn.*

Lilium floribus reflexis montanum, flore maculis rubris inordinatis adſperſo T. ſive Lilium montanum flore purpuraſcente punctato HEyſt. Gold-Wurtzel, mit punctirten Blumen, auf dem Gebürg, bey Girrbaden, *perenn.*

Lilium floribus reflexis alterum lanuginoſum hirſutum T. ſive Lilium montanum, vel ſylveſtre 1. majus Clus. hiſt. 134. Berg-Lilien, bey

Mollkirch, auf dem Gebürg, bey den 3. Aehren. *perenn.*

Lilium purpuro croceum majus T. Feuer oder Gold-Lilien, sive Lilium rubens majus IB. 2. 688. auf dem Hochgebürg, hinter Rapolsweyer, in groser Menge. *perenn.*

Linaria pumila arvensis vulgatior T. *seu Antirrhinum minus arvense, floribus monopetalis personatis, fructu subrotundo Ic. Tab. hist.* 4. 1236. *& in Rivin.* est Antirrhiuum minimum IB, 3. 465. wild Löwen-Maul, klein Feld-Orant, hin und wieder auf denen Aeckern *ann.*

Linaria flore pallido rictu aureo T. sive Linaria Pannonica 1. Clus. hist. 322. Lein oder Flachs-Kraut, mit bleich gelben Blumen, auf aufgewortenen Gräben, und an denen Strassen. *Ic. Tab. hist.* 1. 1208. *perenn.*

Linaria vulgaris lutea, flore majore T. & IB. 3. 456. *Lin sauvage*, Lein-Kraut, mit schönen grosen gelben Blumen, *Ic. Tab. hist.* T. 1210. bey allen Lüften, bey denen Sand-Gruben, an der Landstraß gegen Moltzheim. *perenn.*

Linaria vulgaris lutea flore minore T. an dem Zaun des Schliessenmeisters Garten, am Canal, auf dürren Wiesen bey Oßwald.

Linaria vulgaris flore majore alba T. *rictu aureo* Lein-Kraut, mit weisen Blumen, auf einem kleinen Hügel, vor dem Bad zu Sultz, an denen Zäunen bey der Eckbolsheimer Ziegel-Hütte, bey der ersten Bleich, unterhalb dem Wasser Zoll. *perenn.*

Lina-

Linaria ſegetum nummulariæ folio villoſo T. *ex albido flaveſcente*, ſive Elatine folio ſubrotundo IB. 3. 372 niedrig Acker Lein-Kraut, mit bleich gelben Blumen und Epheu-Blättern, *Ic.* 1. *Tab.* 1091. & *in Rivin.* auf denen Frncht-Aeckeren nach vollendter Erndte, zu Ilkirch und Oßwald *ann.*

Linaria ſegetum nummulariæ folio auriculato villoſo, flore luteo T. ſive Elatine fæmina folio anguloſo IB. 3. 372. niedrig klein Acker Lein-Kraut, mit rauhen Blättern, *Ic. Tab. hiſt.* 2. *pag.* 1091. zu Barr, in denen Gruben am Weg, wenn man auf hohen Landsſpurger Schloß gehen will. *ann.*

Linum arvenſe T. *flore caryophyllæo cæruleo fructu globoſo*, wilder Flachs, auf den Aeckeren bey Inlenheim, unter dem Habern, auf dem Glacis, beym Rheingieſen, *ann.*

Linum ſativum T. ſeu vulgare cœruleum zahmer oder Weiber-Flachs, Spinn-Flachs. *Ic. Tab. hiſt.* 1205. auf denen Aeckeren. *ann.*

Linum ſylveſtre anguſtifolium, floribus dilute purpuraſcentibus, vel carneis T. ſive Linum ſylveſtre VI. anguſtifolium Clus. hiſt. 318. eſt *Linum III. Tab. hiſt. pag.* 1207. wilder Lein oder Flachs-Kraut, mit rothlichten Blumen, und ſchmahlen Blättern, zwiſchen Oßwald und Gravenſtaden, auf dem Steinbruch, bey dem Sultzbad häufig. *perenn.*

Linum ſylveſtre anguſtis & denſioribus foliis, flore minore T. ſive Linum ſylveſtre tenuifolium

nuifolium Lob. Ic. 413. est Linum sylvestre IV. Tab. hist. 1207. schmahl blättrichter wilder Flachs, auf der Wiesen zu Oßwald häuffig. *perenn.*

Linum pratense flosculis exiguis T. seu Linum minimum IB. 3. 455. est Linum Catharcticum Wedel. klein Wiesen Flachs, klein Vogel-Kraut, auf Wiesen zwischen dem Ostwinckel und Hohenwart, in der Ruprechtsau, wie auch in der Elsau und Kaltau. *perenn.*

Lithospermum majus erectam T. sive Lithospermum aut Milium solis IB. 3. 500. *floribus monopetalis infundibuliformibus albis* sive Lithospermum arvense *Tab. hist.* 1234. *Gremil ou Herbe aux Perles*, Meer oder Stein-Hirse, in der Ruprechtsau am Garten, bey der Aubruck im Ostwinckel. *perenn.*

Lithospermum arvense minus floribus luteis, vel luteo cœruleis T. kleine blaugelbe Mauß-öhrlein, mit harichten Blättern, vor dem Spithal Thor, auf denen Frucht-Felderen bey Niederhaußbergen. *ann.*

Lithospermum arvense minus T. sive Echium scorpioides solisequuum, flore minore IB. 3. 589. *cœruleo monopetalo infundibuliformi, folio integro aspero*, blaue Mauß-Oehrlein, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 511. *petit gremil*, auf allen ungebauten Feldern *ann.*

Lithospermum arvense medium, flore cœruleo Vaill. sive Auricula muris Lob. Ic. 461. grosse blaue Mauß-Oehrlein, mit harichten Blättern,

tern, in der Ruprechtsau in trockenen Gräblein, in dem Gansauer Wald.

Lithospermum arvense medium, flore albo Mappi hist. alsat. pag. 179. grose weise Mauß-Oehrlein, in dem Barrer Wald, nahe der Ertz-grub, gegen Hochfeld. *ann.*

Lotus seu Melilotus pentaphyllos minor glabra T. sive Trifolium siliquosum, *fructu subrotundo*, *Tab. hist, Ic. a.* 905. est Lotus corniculata glabra minor IB. 2. 356. fünff blättrichter Lotus, kleiner Schoten-Klee, auf denen Wiesen in der Gansau, in der Rupprechtsau. *perenn.*

Lotus corniculata hirsuta minor T. IB. 2. 356. kleine Vogelwicke, mit rauhen Blättern, in sandigen Orten, in steinichten Gruben, bey der Rheinbruck. *perenn.*

Lupinus sylvestris flore luteo T. *floribus papilionaceis, foliis digitatis seu stellatis, fructu siliquoso,* Wicken Bohnen, Lupinen, *Lupin. Ic. 3. Tab. hist.* 881. in Gärten, und Gartners-Feldern. *ann.*

Luteola herba salicis folio T. sive Lutea Plinii quibusdam IB. 3. 465. *integro folio, flore luteo polypetalo anomalo.* Streich-Kraut, *Garde ou herbe á jaunir Ic. Tab. hist.* 319. auf denen Wällen/ und auf allen Glacis. *perenn.*

Lychnis segetum major T. sive Pseudomelanthium *IB.* 3. 314. & *HEyst. Ic.* 5. *Tab. hist.* 674. Raden, unter der Frucht, aller Orten. *ann.*

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ T. Vaccaria dicta *IB.* 3. 357. *Ic. Tab. hist.* 3. 1253. Küh-Kraut, in denen Sommer-Feldern. *ann.*

Lychnis ſegetum rubra, foliis perfoliatæ, flore pallido T. Küh-Kraut, mit bleich rothen Blumen, auf denen Aeckern gegen Niederhauß-bergen. *ann.*

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia, caliculis turgidis ſtriatis T. *folio incano, ſive altera incana, Lobel. Ic.* 338. Wald-Rößlein, mit aufgeblaſenen und geſtriften Kelchen, *Paſſe fleur.* aller Orten auf der Glacis *perenn.*

Lychnis ſylveſtris latifolia, caliculis turgidis ſtriatis T. *foliis hirſutis*, ſive Lychnis ſylveſtris III. Clus. hiſt. *caliculis ſtriatis*, & *Lob. Ic.* 339. zu Waßlenheim. *perenn.*

Lychnis papaver ſpumeum anguſtifolia glabra, flore purpureo Moris, Prælud. 284. & T. *caule inferius intenſe rubro*, auf dem Glacis, vor dem Spithal-Thor, gegen der Ill. *perenn.*

Lychnis ſylveſtris quæ ſaponaria vulgo T. ſive Saponaria vulgaris *IB.* 3. 346. *flore ex albido purpuraſcente roſaceo, folio glabro. Savoniere*, Seiffen-Kraut, an denen Straſſen, bey Hohnheim. *perenn.*

Lychnis ſylveſtris, quæ Saponaria vulgo, *apicibus violaceo purpureis*, & *majoribus odoratis*, Seiffen-Kraut, mit Viol blauen Zünglein, bey Höhnheim häuffig. *perenn.*

Lychnis ſylveſtris, quæ Saponaria vulgo, flore albo. Vaill. Seiffen-Kraut, mit weiſen Blumen, oberhalb Blobsheim, auf der Kraft, am Waſſer, *perenn.*

Lyſima-

Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, *flore luteo.* T. *monopetalo rotato, fructu globoſo*, ſive Nummularia vel Centimorbia IB. 3. 370. Pfennig oder Egel-Kraut, *Ic. Tab. hiſt.* 1261. auf feuchten Wieſen, bey der Schlut, bey allen Lüften, *perenn.*

Malva vulgaris folio ſinuato, flore majore T. *monopetalo campaniformi, fructu orbiculari* ſive Malva ſylveſtris major, Papellen, Roßpapellen, mit geſtriften rothen Blumen, auf ungebauten fetten Orten, in denen Hecken, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Malva vulgaris flore minore, folio rotundo, T. & IB. 2. 949. ſive Malva ſylveſtris minor *Tab. hiſt.* 1150. *Petite Mauve*, gemeine Käß oder Gänſe papellen, an denen Wegen, aller Orten, an der Mauer alter Stadt-Gräben, *perenn.*

Matricaria tanacetifolio, flore minore, ſemine umbilicato T. oblongo, ſive Tanacetum inodorum II. Clus. hiſt. 338. Berg Mutter-Kraut, mit kleinen Blumen ohne Geruch, auf dem Gebürg, in dem Urbis-Thal, oberhalb Kayſersberg, *perenn.*

Matricaria tanacetifolio flore majore, ſemine umbilicato T. ſive Tanacetum inodorum 1. Clus. hiſt. 338. Berg Mutter-Kraut, mit groſen Blumen, auf dem Hochgebürg zu Rappolſtein / und oberhalb Duſenbach, in denen Gebüſchen. *perenn.*

Medica ſylveſtris floribus croceis T. ſive

Medica flavo flore Clus. hist. CCXLIII. est Lens major repens, *Tab. hist. Ic.* 123. in Rivino nominatur Falcata, nobis vero Medicago est sylvestris, *floribus croceis papilionaceis, fructu falcato*, Sichel-Klee, grose kriechende Linsen, mit gelben Blumen, auf der Contrescarpe, vor dem Cronenburger und Steinstrasser Thor ganze Plätz voll. *perenn.*

Melampyrum coma purpurascente T. *flore monopetalo personato* & in Rivin, sive Triticum vaccinum IB. 3. 439. *fructu subrotundo bifario*, Buch oder Küh-Weitzen, Wachtel-Weitzen, *Ble de Vache*, in der Frucht, zu Lingelsheim und Oßwald. *ann.*

Melampyrum coma cœrulea T. sive *Melampyrum sylvaticum Rivin Ic.* 1. *Tab. hist.* 553. Wald Küh-Weitzen, mit blauen Strauß, in dem Ostwinckel und Wald, zu Zabern. *ann.*

Melampyrum cristatum, flore purpureo albo T. & *IB.* 3. 440. *rictu luteo, foliis angustis*, in denen Frucht-Aeckern, zu Ittenheim.

Melampyrum luteum latifolium T. *rictu albo* gelber Küh-Weitzen, est Milium sylvaticum *Ic.* 1. *Tab. hist.* 555. auf dem St. Ottilien Gebürg, auf der Oßwalder Nacht-weyde. *ann.*

Melampyrum flore albo Mapp. hist. Alsat. p. 190. Buch-Weitzen, mit weisen Blumen, zwischen Inlenheim und Niederehenheim, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler. *ann.*

Melilotus officinarum Germaniæ T. *flore luteo*

teo papilionaceo odorato, *radice longa alba*, ſeu Melilotus vulgaris, flore luteo IB. 2. 370. eſt Melilotus Germanica Lobel. Icon. 43. & Tab. hiſt. 895. ut & in Rivin. *Melilot*, gemeiner Stein-Klee, in der Ruprechtsau, und zu Lingelsheim, auf den Feldern. *perenn.*

Melilotus officinar, germaniæ, flore albo T. *ſemine ſubrotundo*, weiſer Stein-Klee, an dem Canal, bey Eckbolsheim, bey denen Schantzen vor dem Fiſcher-Thor, auf der kleinen Inſul, bey der Rhein-Bruck. *perenn.*

Melilotus vulgaris altiſſima fruteſcens, flore albo T. hoch aufgeſchoſſener Stein-Klee, mit weiſen Blumen, zwiſchen beyden Rein-Brucken, auf denen aufgeworfenen Werckern.

Melilotus vulgaris altiſſima fruteſcens, flore luteo T. groſer Stein-Klee, mit gelben Blumen, bey dem Mauerhof, am Canal, zu Eckbolsheim, bey der Brucken, zwiſchen beyden Rhein-Brücken, an dem Weg. *perenn.*

Melilotus major odorata violacea T. Siebengezeit, mit blauen Blumen, *Lotier bleu Ic. Tab. hiſt.* 896. auf graſichten Boden, bey dem Engelländiſchen Hof. *perenn.*

Meliſſa hortenſis T. ſeu vulgaris, odore Citri *IB.* 3. *part.* 2. 232. *floribus monopetalis labiatis albis*, *ſemine ſubrotundo*, *Meliſſe*, Mutter-Kraut, *Ic. Rivin & Tab. hiſt.* 757. *perenn.*

Melo rotundus parvus T. ſive Sacharinus *Tab. hiſt. Ic.* 3. 856. *flore monopetalo campaniformi, fructu luteo ovato. Melon ſuccrée*, Zucker-Melonen, in Gärten, *ann.*

Melo

Melo vulgaris T. & IB. 2. 242. gemeine Melonen, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 885. *ibid. ann.*

Melo reticulatus T. & IB. 2. 244. Netz-Melonen, *ibid. ann.*

Mentha ſylveſtris rotundiore folio T. ſive Menthaſtrum, *folio rugoſo ratundiore, flore albo monopetalo labiato ſpicato, odore gravi, Ic. IB. 3. part. 2. pag.* 219. wilde Müntz, wilder Balſam, *Menthe ſauvage Ic. Tab. hiſt.* 729. vor dem Spithal-Thor, auf dem Schießrein, bey Oßwald an der Landſtraß. *perenn.*

Mentha ſylveſtris longiore folio T. ſive Menthaſtrum ſpicatum, folio longiore candicante, *IB. 3. p. 2.* 221. *hirſuto, floribus ſub purpurei coloris ſpicatis*, Roß oder Pferd-Müntze, Ic. Rivin & Fuchs hiſt. plant. Matthiol. Epitom. 489. *Mente ſauvage.* an denen Rändern der Waſſer, gegen der grünen Wart, uud andern Orten mehr. *perenn.*

Meum fol. anethi T. ſive Meum vulgare *IB. 3. p. 2.* 11. *florib. alb. roſaceis umbellat. Ic. Clus. hiſt. CXCVIII. & in Rivin.* Bärwurtz, Bären-Fenchel, auf der Wieſe, des Hochgebürgs Hochfelds, häufig. *perenn.*

Millefolium nobile T. ſive *Tanacetum minus album, odore camphoræ*, vel Achillea millefolia odorata, IB. 3. 140. weiß edel Garben-Kraut, auf Brach-Aeckern zu Oſtheim. *perenn.*

Muſcus ſquamoſus vulgaris repens clavatus T. ſive Lylopodium *Tab. hiſt. Ic.* 3. 1199. *Julis ſemine farinaceo refertis Pate. de Loup.* Bärlapp, St. Joh.

Joh. Gürtel, in dem Gebürg, hinter Waßlenheim, in dem Börser Wald, hinter dem St. Ottilien Gebürg. *perenn.*

Muſcus capillaceus major, pediculo & capitulo craſſioribus T. ſive Adiantum aureum *Tab. hiſt. pag.* 1186. Tauſend Gulden Wiederthon, *Perce mouſſe*, an feuchten ſumpfichten Orten, hinter Ottrott. *perenn.*

Naſturtium hortenſe criſpum latifolium T. *flore albo ſimplici cruciformi, fructu ſubrotundo*, krauſer groß blätterichter Garten-Kreſſe, *Creſſon friſee à feuilles larges Ic.* CB. *prodr.* 44. & *Tab. hiſt. Ic. IV.* 842. in Gärten. *ann.*

Naſturtium hortenſe latifolium T. breiter Garten-Kreſſe. Ic. Matthiol. Epitom. 156. *ann.*

Naſturtium ſylveſtre capitulis criſtatis T. ſive Naſturtium verrucoſum *IB.* 2. 919. *foliis coronopi, floſculis albis cruciformibus, Ic. Tab. hiſt.* 4. *pag.* 302. Feld-Kreſſe, an denen Wegen und ungebauten Orten, auf dem Schießrein. *ann.*

Naſturtium ſylveſtre tenuiter inciſum, fructu minori T. ſive *Thlaſpi auguſtifolium* Fuchs. *Ic. Tab.* 16. 853. Beſam-Kraut, an denen Wegen vor dem Spithal-Thor, vor dem Steinſtraſſer Thor, an der Landſtraß, nach Schiltigheim, neben denen Aeckern, *ann.*

Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum T. kleiner wilder Kreſſe Wey-Kreſſe, neben den Aeckern am Pfad-Weg, nach Eckbolsheim, bey der Carthauß häufig. *ann.*

Nymphæa alba major T. *floro roſacco multipli-*

ci radice tuberosa longa & filamentosa. IB. 3. 772. & *Tab. hist.* 1. 1117. *Nenufar blanc*, weise Wasser-Lilien, weise See-Blumen, in dem Graben auf der Wiese, bey der grünen Wart häufig, *perenn.*

Nymphæa lutea major T. *fructu globoso multicapsulari* & IB. 3. 771. *Ic. Tab. hist.* 3. 1118. & *HEyst. Nenufar jaune*, gelbe See-Blumen, in denen Stadt-Gräben, vor dem Juden-Thor, bey Gravenstaden, bey dem Zoll. *perenn.*

Nymphæa alba minor H. Eyst. Kleine weise See-Blum, in stillen Wassern, zwischen Oßwald und Gravenstaden, in dem Gräblein hinter dem Rhein Ziegel-Ofen., *perenn.*

Nymphæa alba minima, foliis asari, floribus tripetalis albis *longis pediculis, radice filamentosa longa*, nobis; quæ *Ranæ morsus Tab. hist. Ic. pag.* 1131. Frosch-Biß, in allen Gräben um die Stadt. *perenn.*

Oenanthe aquatica T. sive Filipendula aquatica IB. 3. *part.* 2. 191. *Tab. hist. Ic.* 4. 424. *flosculis albis, rosaceis umbellatis, semine oblongo striato & in Rivin.* Wasser Stein-Brech, auf allen sumpfichten Wiesen, in Gruben, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Oenanthe seu Filipendula aquatica altera IB. 3. part. 2. 192. quæ Ruta palustris *Tab. hist. Ic.* 2. 421. Wasser Filipendel-Wurtzel, zwischen Arbogast und dem Wickhäusel, in sumpfichten Gruben, *perenn.*

Ophioglossum vulgatius T. sive *Ophioglossum*

IB. 3.

IB. 3. 708. *floſculis in oculos non cadentibus foliis, craſſis, anguſtis oblongis, fructu lingulato Ic. Tab. hiſt.* 1232. Natter-Zünglein, *Langue de ſerpent*, auf denen Bergmatten / bey Baar und hohen Andlau, *perenn.*

Ornithopodium majus T. ſeu Ornithopodium, flore flaveſcente *IB.* 2. 313. *papilionaceo, ſiliqua recurva articulata, radice tuberculis nodoſa, fructu ſiliquoſo articulato falcato, ſemine ſubrotundo,* Vogel Fuß-Pfote, auf dürren Aeckern, bey Bofsheim, in dem obern Ried. *ann.*

Ornithopodium minus T. ſive Perpuſillum Ornithopodium, Lob. Ic. 82. auf brachliegenden Aeckern, bey Hagenau und Schweighauſen, *ann.*

Orchis muſcam referens major T. ſive Orchis myodes, flore grandiuſculo *IB.* 2. 767 *teſticulata absque calcari, flore grandiuſculo*, groſe Mucken präſentirende Stendel-Wurtzel, in ausgeſteckten Hölzern, und andern trockenen graſichten Orten zu Holtzheim / *Orchis ſemblent une grande Mouſche Ic. Tab. hiſt.* 3. 1050. & *Lob. Ic.* 182. *perenn.*

Orchis palmata montana, maculata, flore variegato, Mapp. ſive Palmata maculata *IB.* 2. 775.

Orchis corpus muſcæ referens minor T. teſticulata, ſine calcari, ſive Orchis Myodes galea eſt alis herbidis IB. 2. 761. Vaill. p. 147. eſt Orchis Myodes 1. Lob. Ic. 181. Kleine Stendel Wurtzel, mit grünen Mücklein, auf dem Haulenberg häufig *perenn.*

Or-

Orchis muſcam referens lutea T. ſive Orchis Myodes lutea *IB.* 2. 768. *teſticulata cum calcari & foliis tribus Ic. Tab. hiſt.* 2. 1050. gelb Stendel-Wurtzel, in dem Ilkircher Wald. *perenn.*

Orchis, parva ſeu Monorchis floſculis luteis minoribus moſchum olentibus, bulbo unico, nobis, quæ Orchis parva autumnalis lutea IB 3. 768. gelb wohlriechend Knaben-Wurtzel, mit einer Ziebel, zu Hangenbietheim und auf dem Haulenberg.

Orobanche hypopitys lutea Dillen cat. Giſſ. 99. quæ Hypopytis Rivin. *floſcul. muſcoſis clauſis, in ſpicam congeſtis fructu oblongo quinquecapſulari*, gelbe Wald-Wurtzel, oder Schuppen Wurtzel, in dunckelen uud ſchattichten Waldungen, hinter dem Ottilien Berg. *perenn.*

Oſmunda foliis lunatis T. ſive *Ruta lunaria, Tab. hiſt. Ic.* 413. *Lunaria Botrytis IB.* 3. 709. kleine Mond-Raute, *Lunaire*, auf dem Gebürg, beym Lichtenberger Schloß, und hinter Waſſenburg, in dem Dettweiler Wald häufig. *perenn.*

Oxycoccus ſive Vaccinia paluſtris T. & IB. 7. 525. *flore albo roſaceo fructu globoſo* Mooßbeeren, Keſſelbeeren, *Canneberge* zu Boſelshauſen, und in dem Hagenauer Forſt. *Ic. H. Eyſt. perenn.*

Pedicularis ſerotina, purpuraſcente flore T. ſive Euphraſia parva purpurea *IB.* 3. 433. eſt Odontites Tabern. & Rivin. rother Augen-Troſt, Wieſen Rötel, zu Oßwald, auf denen Wieſen, wie auch zu Gravenſtaden. *ann.*

Pedicularis ſerotina flore albo Vaill. Wieſen Rödel mit weiſen Blumen, auf feuchten Wieſen,

sen zwischen dem Mayer-Hof, und dem Eckbolsheimer Ziegelofen *ann.*

Pentaphylloides paluſtre rubrum T. ſive Quinquefolium ſeu potius Heptaphyllum flore rubro *IB.* 2. 398. eſt *Quinquefolium paluſtre Tab. hiſt. Ic.* 12. 354. *foliis ſuperne viridibus, inferne cinereis ſerratis, floribus purpureis roſaceis Ic. Hort. Eyſt.* auf ſumpfichten Wieſen, zu Wört, zu Wimmenau, hinter Buchsweyler. *perenn.*

Pepo oblongus T. *flore luteo monopetalo campaniformi fructu oblongo Ic. Tab. hiſt.* 8. 857. groſe gemeine Kürbſe, hin und wieder an denen Reinen der Reben, auch gantze Aecker voll, aller Orten auf dem Land. *ann.*

Pepo vulgaris T. ſive *major rotundus, flore luteo folio aſpero non maculato*, quæ Cucurbita ſive Zucha *IB. Ic.* 2. 218. groſe runde Kürbſe ibid. *ann.*

Pepo vulgaris ſive Cucurbita major, foliis aſperis albis maculis pictis, *fructu rotundo* nobis. groſe runde Kürbſe, mit rauhen weiß geſprenckten Blätteren, ibid. *ann.*

Peucedanum germanicum T. *flore roſaceo umbellato ſemine ovato* ſive *Peucedanum minus Germanicum IB.* 3. *part.* 2. 36. vel Peucedanum Fœniculum porcinum Lobel. Ic. 781. *Ic. Tab. hiſt.* 1. 163. eſt Hippomarathrum Rivin. Haar Strang, auf der Contreſcarpe, vor dem Metzger-Thor, auf denen Wieſen, zu Oßwald, *perenn.*

Phaſeolus vulgaris T. ſive Smila hortenſis

IB. 2. 255. *flore papilionaceo purpureo, foliis ternis uno pediculo ſcandente, absque capreolis, fructu longo, ſemine reniformi*, gemeine Bohnen, mit rothen Blumen, *Ic. Tab. hiſt.* 876. & *Lobel.* 59. in Gärten, und auf denen Felderen, *ann.*

De hoc genere plures dantur ſpecies & varietates quoad fructum, & colorem. vide Tournef. Inſt. pag. 412. die man bey denen Ackersleuten findet.

Phaſeolus major HLB. ſive Smilax hortenſis major, fructu ex rubro & nigro variegato, flore coccineo. groſe gemahlte Türckiſche Bohnen, in Gärten, *ann.*

Phaſeolus major ſive Smilax hortenſis major fructu ex rubro & nigro variegato, *flore candido.* groſe gemahlte welſche Bohnen, mit weiſen Blumen, ibid. *ann.*

Phellandrium T. & Rivin. vel Cicutaria aquatica quorundam *IB.* 3. *part.* 2. 183. *tenuifolia flore roſaceo umbellato albo, caule craſſo, ſemine gibbo leviter ſtriato, & Tab. hiſt. Ic.* 3. 1170. *Ci que en marais*, in Gräben, ſtillſtehender Waſſer, in dem Graben gegen der Ziegel-Hütte, wenn man an Waſſer-Zoll gehen will, *perenn.*

Polygala major T. & *IB.* 3. 357. *flore anomalo polypetalo perſonato, folio longo & anguſto, fructu compreſſo, ſemine oblongo*, blaue Creutz-Blümlein, *Tab. hiſt. Ic.* 2. 1212. an feuchten Wieſen, und andern graſichten Orten, bey Heilgenſtein. *perenn.*

Polygala major alba T. Kreutz Blümlein, mit weiſen Blumen, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1212. ibid *perenn.*

Polygala major purpurea *Tab. hiſt. Ic.* 3. 1212. rothe Creutz-Blümlein.

Poly-

Polygala vulgaris T. sive *Polygalon multis* IB. 3 386. vel. *Polygala cœrulea Tab. hist. Ic.* 5. 1213. gemeine blaue Creutz-Blümlein, *Ic. Hort. Eyst.* auf allen feuchten Wiesen, und andern grasichten Orten. *perenn.*

Polygala alba T. & *Tab. hist. Ic.* 7. 1213. Kreutz-Blümlein, mit weisen Blumen, ibid. *perenn.*

Polygala purpurea T. & *Tab. hist. Ic.* 6. 1213. rothe Creutz-Blümlein, ibid. *perenn.*

Potamogeton rotundifolium T. folio rotundiore *IB.* 3. 776. *flore cruciformi spicato purpureo, Ic. Tab. hist.* 1117. Saam-Kraut, mit runden Blättern, *Epideau*, in denen Stadtgräben, bey dem Spithal-Thor. *perenn.*

Potamogeton foliis crispis sive *Lactuca ranarum* T. seu *Fontinalis crispa IB.* 3. 778. Frosch-Lattich, mit krausen Blättern, in dem Spithal-Graben, in Wasser-Gräblein, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Potamogeton longo serrato folio T. potius *undulato alterno & lucido sine pediculo, est* Lapathum fluitans, longo serrato folio *IB.* 2. 988. Hecht-Lock, in der Ill häufig.

Potamogeton foliis latis splendentibus T. *perfoliatis*, sive Potamogeton altera Dodonæi *IB.* 3. 778. Saam-Kraut, mit breiten glänzenden Blättern, *ibid.*

Potamogeton foliis angustis & undulatis T. *floribus Muscatellæ*, schmahl blättricht Samm-Kraut, mit Wollen aestalten Blättern, auf der Kaltau, in denen Gräben, auch auf dem Wa-

cken, in denen eingefaßten Wasser-Quellen, *perenn.*

Potamogeton flosculis ad foliorum nodos T. *albis cruciformibus* sive Myriophyllum aquaticum minus Clus. hist. CCLII. Saam Kraut, mit Blumen, an denen Gleichen der Blätter / in denen fliesenden Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, und auf dem Krimmerich, bey dem Wickhäusel. *perenn.*

Potamogeton alpinum plantaginis folio T. *alterno oblongo leviter undulato*, sive Fontinalis lucens major *Ic.* 3. *IB.* 777. Saam-Kraut, mit Wasser Wegerich-Blättern, in der Ill häufig, bey Oßwald. *perenn.*

Potamogeton graminifolium fluviatile *flosculis ex alis foliorum prodeuntibus, ex viridi albicantibus nobis*, seu Fluviatilis gramineo folio polycarpos. Vaill. pag. 54 auf dem Wacken, in einem eingefaßten Quell-Wasser-Brunnen, in dem Rhein-Giessen. *perenn.*

Potamogeton minus, foliis densis mucronatis non serratis Bot. Monsp. sive *Fontalis media lucens*, *Ic. IB.* 3. 777. spitzig Saam-Kraut, in sumpfichten Wassern auf dem Wacken, in dem Eckbolsheimer Wald, in denen leimichten feuchten Gruben. *perenn.*

Potamogeton ramosum angustifolium T. & *IB.* 3. 778. *flosculis pusillis uvæ in modum congestis Moschatellinæ similibus*, Aestig Saam-Kraut, mit schmahlen Blättern, in der Ill, zwischen denen Fischer-Pfählen, und Reisen zu Oßwald.

Pota-

Potamogeton caule compresso, foliis graminis canini Ray hist 189. Saam-Kraut, mit Graß-Blättern, in stillstehenden Wasser-Gräblein, bey Gravenstaden, wie auch in der Ill bey Oßwald häufig. *perenn.*

Ptarmica vulgaris folio longo serrato T. & IB. 3. 147. *flore albo radiato*, wilder weiser Bertram, weise Rhein-Farn, *Ic. Tab. hist. pag.* 1164. auf feuchten Matten zu Oßwald, an denen Wasser Gestaden, bey der Gallen-Matt, *perenn.*

Pyrola rotundifolia major T. *fructu subrotundo, flore viridi rosaceo, folio crenato*, sive *Pyrola IB.* 3. 533. *Ic. Tab. hist.* 1139. & *in Rivin. Pyrole á feuilles, larges & rondes*, Apfel Wintergrün, Wald-Mangoldt im Hörter-Wald, auf denen Bergmatten, zu Barr häufig. *perenn.*

Pyrola folio mucronato serrato T. sive Pyrola folio serrato *IB.* 3. 536. est Pyrola 11. Clus. hist. CXVII: *Pyrole á feuilles pointues.* Wintergrün, mit spitzigen Blättern, Wald-Mangold mit Birn-Laub, in dem Hörter-Wald, zu Dorlisheim, auf den Bergen. *perenn.*

Quinquefolium folio argenteo T. sive Pentaphyllum erectum, foliis profunde sectis subtus argenteis, flore luteo *IB.* 2. 398. *rosaceo.* quod *Quinquefolium petræum majus Tab. hist. Ic.* 10. 353. aufrecht stehend 5. Finger Kraut, mit silberfärbigen Blättern, neben den Wegen, an Gärten, zu Oßwald, auch in dem Ostwinckel, und an steinichten Orten, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Ranunculoides folio circinato, tenuissime diviso Act. Reg. Scient. pag. 48. 1719. & Vaill. Bot. Paris. 143. *in ima parte cornu cervin. exprimente, flosculis rosaceis albis, pediculo nudo insidentibus longiori*, est Millefolium aquat. minus Clus. hist. CCLII. *Grenouillette*, gehörnt Wasser-Garbe, in dem Graben, vor dem Spithal-Thor, bey der ersten Brücke häufig, in dem Graben, hinter der Schiffmatt. *perenn.*

Ranunculus palustris longifolius major T. sive Ranunculus lanceatus major *Tab. hist. Ic.* 17. 111. est Lingua Plinii IB. 3. app. 365. groß lang blättricht Wasser Hahnen-Fuß, in feuchten sumpfichten Orten, bey dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *perenn.*

Ranunculus palustris minor T. *Ic.* 18. *Tab. hist. pag.* 111. sive Ranunculus longifolius, aliis Flammula IB. 3. app. 864. kleiner langblättrichter Wasser Hahnen-Fuß, ibid. und zu Oßwald auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Ranunculus palustris ferratus T. sive Ranunculus lanceatus ferratus *Tab. hist. Ic.* 19. *pag.* 112. Sumpf Hahnen-Fuß, mit eingeschnittenen Blättern, vor dem Fischer-Thor, auf der Wiese oberhalb der Schiffmatt, in denen Pfützen, vor dem Metzger-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris folio sagittato maxi-

mo T. seu Sagitta major *IB.* 3. 790. *flore rosaceo albicante*, groß Pfeil-Kraut, *Queue d'arondelle*, oberhalb der grünen Wart, wo man auf Oßwald zu gehet, und in denen Gräben um die Stadt. *perenn.*

Ranunculus paluſtris folio ſagittato minori, T. ſive *Sagitta IB.* 1. 790. *Tab. hiſt. Ic.* 2. *pag.* 1121. klein Pfeil-Kraut, in Waſſer Bächlein bey Arbonaſt und der grünen Wart *perenn.*

Ranunculus paluſtris folio ſagittato anguſtiori T. ſive Sagitta minor anguſtifolia *IB.* 3. 790. *Ic. Tab. hiſt.* 3. *pag.* 1121. in denen Stadt-Gräben und ſumpfichten Orten am Canal. *perenn.*

Rapa ſativa oblonga ſeu Fæmina T. ſeu *Rapum oblongum ſativum IB.* 2. 838. *ſtore luteo cruciformi ſiliquoſo*, lange Winter-Ruben, *Rave Ic. Tab. hiſt.* 797. auf Aeckern aller Orten. *ann.*

Rapa rotunda radice candida T. ſive Rapum ſativum rotundum *IB.* 2. 838. eſt Rapum vulgare *Tab. hiſt.* 790. Rave commune, gemeine runde Rüben, ibid. *ann.*

Rapa ſativa rotunda minor vel Rapum rotundum minus, *Ic. Tab. hiſt.* 2. 790. frühe Rube, oder Stupfel-Rube, auf denen Gartners-Feldern, *ann.*

Rapa major ſativa orbiculata ſeſſili ſeu compreſſa candida Bœrh. quod Rapum orbiculatum, *Tab. hiſt. Ic.* 3. 790. Scheib-Ruben, *ann.*

Rapa minor ſativa orbiculata ſive Rapum orbiculatum minus, *Tab. hiſt. Ic.* 4. 791. kleine Scheib oder Früh-Rube *ann.*

Rapa ſativa rotunda radice foris & intus flaveſcente T. gantz gelbe Rube, zu Brumath und Krautweyler, auf denen Aeckern. *ann.*

Rapa ſativa rotunda radice punicea T. braun rothe Ruben, auf denen Gartners Feldern *ann.*

Rapunculus ſcabioſæ capitulo cœruleo T. ſive Scabioſa globularis vel ovina *IB.* 3. 12. *Ic. Tab. hiſt.* 14 444. Schaf Ravuntzel, auf denen Aeckern, in dem Ruprechtsauer Wald, gegen dem Rhein *perenn.*

Reſeda vulgaris T. *flore roſaceo ſubluteo, fructu trigono oblongo ſpicato*, ſive Reſeda lutea *IB.* 3.467. ſpicata, Feld-Raucken, auf denen Wällen, hin und wieder um die Stadt. *perenn.*

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio T. *floribus monopetalis labiatis ſub cœruleis, ſemine ſubrotundo, Romarin*, Roßmarin, mit ſchmahlen Blättern, *Ic. Tab. hiſt. pæg.* 311. in Gärten. *perenn.*

Roſmarinus ſpontaneus latiore folio T. ſive Roſmarinus coronarius *fruticoſus ignobilior IB.* 2. 15. *Romarin ſauvage*, Roßmarin, mit gantz breiten grünen Blätteren, *cum præced. perenn.*

Roſmarinus folio variegato T. Roßmarin, mit ſchmahlen gold gefleckten Blättern, *in horto medico.*

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio argenteus H.R Par. Roßmarin mit weiß gefleckten Blättern, *in hort. medico.*

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpuraſcentibus T. *monopetalis infundibuliformibus* ſive Rubia cynanchica *IB.* 3723. klein blau

Megerkraut, auf dürren Wiesen und Aeckern, zu Oßwald und Ilkirch / neben den Aeckern, und zu Niederhaußbergen.

Rubeola vulgaris lævis quadrifolia floribus albis T. klein Megerkraut, mit weisen Blümlein, *Ic. 4. Tab. hist.* 433. auf der Contrescarpe, bey dem Fischer-Thor, auf der Glacis, vor dem Cronenburger-Thor. *perenn.*

Rubia tinctorum sativa T. *flore albo monopetalo campaniformi, foliis stellatis, radice rubra fructu gemino Ic. Tab. hist.* 1. 1178. Ferber-Röth, *Garance*, zu Krautweyler häufig.

Rubia sylvestris Monspessulana major T. & *IB.* 3. 715. *floribus luteis, foliis asperis*, wilde Ferber-Röthe, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 118. an der Landstrasse, vor dem Weisen-Thurn, in denen Hägen. *perenn.*

Ruta muraria T. & IB. 3. 753. Mauer oder Steinraute, *Rue de murailles. Ic. 3. Tab. hist.* 1184. *& in Tournef. Inst. rei herb.* in allen Fugen, alter Mauren. *perenn.*

Sabina sterilis IB. seu vulgaris Sabina Mas. *Tab. hist. p.* 1355. Scven-Baum Männlein.

Sabina baccifera IB. fol. Cupress. Seven-Baum, Weiblein. *Ic. Tab. hist. p.* 1355.

Salvia major an Sphacelus Theophrasti T. sive Salvia latifolia 3. 324. *flore monopetalo labiato purpureo, semine subtrotundo.* grose oder breite Salbey *lv.* 1. *Tab. hist.* 760. *Grande sauge*, in Gärten, *perenn.*

Salvia major foliis ex luteo & viridi variega-

tis HAP. gemahlte oder Froschen-Salbey, *in horto medico, perenn.*

Salvia altera perelegans tricolor argentea Belgarum HRP. 3. farbige oder Holländische Salbey, ibid. *perenn.*

Salvia latifolia ferrata T. seu crispa IB. 3. 395. *Sauge frisee*, breitblättricht Salbey, mit an dem Rand eingeschnittenen Blättern, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Salvia baccifera T. sive Cretica pomifera Clus. hist. 343. Beeren oder Fruchttragende Salbey, *in horto medico. perenn.*

Salvia minor aurita T. seu auriculata IB. 3. 305. Edel-Salbey, mit spitzigen geöhrten Blättern, oder Creutz-Salbey, *Ic. 2. Tab. hist. 761. Sauge Franche*, in Gärten. *perenn.*

Salvia minor non aurita T. *flosculis albis*, Edel-Salbey, mit spitzigen Blättern ohne Ohren *ibid.*

Salvia folio tenuiore T. seu Arborescens flore albo, est Salvia Hispanica. H. Eyst. schmahl blättrichte Salbey, *in horto medico. perenn.*

Samolus Valerandi T. & *IB. 3. 791. folio rotundo non crenato, floribus albis rotatis, pediculis longis insidentibus*, sive Anagallis aquatica tertia Lob. Ic. 467 vor dem Fischer-Thor, auf dem feuchten Grund, gegen dem Ziegelofen über. *perenn.*

Scabiosa capitulo globoso major T. quæ Scabiosa V. Clus hist. Ic. 11. & *Tab. hist. Ic. 21. 445. flore, cœruleo tubuloso flosculoso, semine coronato Scabieuse tete etoilée*, rund köpfige Stabiosen, oder

Apo-

Apostem-Kraut, bey Mittel und Niederhaußbergen, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Scabiosa capitulo globoso minor T. sive Scabiosa minor IV. *Tab. hist. Ic.* 12. 445. kleine rund köpfige Scabiose, auf dürren Wiesen auf der Gansau, auf der Metzgerau, in dem Jukircher Wald. *perenn.*

Scabosa folio integro hirsuto T. sive *Succisa seu Morsus Diaboli*, IB. 3. 11. *flore cæruleo purpureo flosculoso, radice præmorsa Ic. Tab. hist. pag.* 452. rauher Teufels Abbiß, *Mort du Diable*, auf allen feuchten Wiesen, bey der grünen Wart, *perenn.*

Scabiosa folio integro glabro T. *flore cæruleo* Teufels-Abbiß, mit blauen Blumen, und Blättern, ohne Haar, auf Berg-Wiesen, hinter Baar, *prioris est varietas.*

Scabiosa folio integro, flore albo T. Teufels-Abbiß, mit weisen Blumen.

Scorzonera angustifolia sub cœrulea T. *flore semifloseuloso, semine papposa* aut elatior IV. Clus. hist. sive *Scorzonera Pannonica angustifolia Tab. hist. IB.* 996. schmahlblättrichte Scorzonera, mit blaulichten Blumen, in Gärten und Gartners-Feldern. *perenn.*

Scorzonera humilis latifolia nervosa T. sive Pannonica *Tab. hist. Ic.* 2. 995. Scorzonere, breitblättrichte Scorzonera, *ibid.*

Scorzonera humilis angustifolia T. sive Pannonica 3. *Clus. hist. Ic.* 6. 996. schmahl blättrichte Scorzonera, ibid. *perenn.*

Scor-

Scorzonera laciniatis foliis T. five Tragopogon pratenſe laciniatum, flore luteo pallido *IB.* 2. 1059. Bocks Bart, mit groſen Bleichgelben Blumen, auf denen Wieſen. *Ic. Tab. hiſt.* 994. *Barbe de Boue.*

Scorzonera latifolia ſinuata T. five Scorzonera major hiſpanica Clus. hiſt. CXXXVII. radice nigra longa, gemeine Scorzonera, *Ic. Tab. hiſt.* 1. 995. *Scorzonere perenn.*

Scrophularia aquatica major T. five Scrophularia maxima radice fibroſa *IB.* 3. 421. *foliis betonicæ, flore monopetalo anomalo ſub purpureo auriculato, radice fibroſa, fructu rotundo acuminato* quæ Betonica aquatica *Tab. hiſt.* 934. & *in Rivin.* Braunwurtzel, mit Betonien-Blätter, *grande Scrophulaire*, auf feuchten Orten, und Waſſergeſtaden. *perenn.*

Scrophularia paluſtris non fœtida ſeu aquatica minor T. ſive Scrophularia aquatica fœmina Matth. Ic. 867. kleine Braunwurtzel, an der Ill bey Oßwald. *perenn.*

Scrophularia nodoſa fœtida T. ſive Scrophularia vulgaris & major *IB.* 3. 421. *Grande ſcrophulaire*, Braunwurtzel, am Waſſer, bey der Gallenmatt / *Ic. Tab. hiſt.* 930. *perenn.*

Secale hybernum vel majus T. Secale *IB.* 2. 416. *flore apetalo, folio graminis, ſemine oblongo.* Winter Roggen, oder Korn, *Ic. Tab. hiſt.* 586.

Secale vernum vel minus T. ſive Secale alterum Dalech. Lugd. 396. Sommer-Rocken.

Sedum minus teretifolium album T. ſive

Sedum

Sedum minus folio longiusculo tereti, flore candido, *IB.* 3. 690. Katzen-Träublein, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 1226. *Trique madame* aller Orten, auf unreinen Tächern und alten Mauren. *perenn.*

Sedum teretifolium album majus Mor. hist. R. Bles. grose weise Katzen-Träublein, auf den Glacis, vor dem Fischer-Thor, zwischen den Maursteinen, in dem Steinstrasser Wasser-Graben, *perenn.*

Sedum minimum luteum non acre T. sive Sempervivum minus vermiculatum insipidum *IB.* 3. 695. Mauer-Pfeffer ohne scharfen Geschmack, auf steinichten Ackern, zwischen Lingelsheim und Ensisheim. *perenn.*

Sedum minus luteum folio acuto T. sive Sedum minus flore luteo *IB.* 3. 692. kleine gelbe Katzen-Träublein, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1226. auf brachliegenden steinichten Aeckern, *perenn.*

Sedum parvum acre flore luteo T. & *IB.* 3. 695. kleine Katzen-Träublein, mit scharfen Geschmack, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 1226. *Pain d'oiseau*, auf sandigen Orten, in der Ruprechtsau, auf dürren Wiesen, bey dem Rhein Ziegelofen. *perenn.*

Sedum palustre sub hirsutum T. sive Sedum minus tertium seu palustre Clus. hist. VIII. est Sedum purpureum pratense *IB.* 3. 692. klein roth Wiesen Haußwurtz, auf feuchten Wiesen, bey Wimmenau. *perenn.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis T. sive Aizoon scorpioides Lob. Ic. 377. est Sedum

minus

minus luteum flore se circumflectente *IB.* 3. 639. Katzen-Träublein, mit gelben Blumen, und umgebognen Aestlein, auf dem Weg, gegen dem Ottilien Kloster, nicht weit von dem Bäumen. *perenn.*

Serpillum vulgare majus flore purpureo T. *monopetalo labiato Ic.* 4. *Tab. hist.* 749. *& in Rivin.* Quendel oder Feld-Kümmel, mit rothen Blumen, auf dürren Wiesen, auf denen Reinen der Aecker, beym Mauer-Hof. *Serpolet à fleur rouge. perenn.*

Serpillum vulgare majus flore albo T. groser Quendel, mit weisen Blumen, *Ic.* 4. *Tab. hist. Serpolet á fleur blanc. ibid.*

Serpillum vulgare minus T. sive Serpillum vulgare *IB.* 3. *part.* 2. 269. *flore purpur.* kleiner Feld-Kümmel, *Ic.* 7. *Tab. hist.* 748. *& in Rivin. Serpolet à feuilles etroites.*

Idem flore albo T. *Ic.* 6. *Tab. hist.* 748. kleiner Quendel, mit weisen Blumen, neben dem Canal, beym ersten Schliessen. *perenn.*

Serpillum vulgare minus capitulis lanuginosis T. Quendel mit wollichten Köpfen, auf dem Wacken, und zu Niederhaußbergheim, an grasichten Reinen, im Granwört. *perenn.*

Serpillum foliis citri odore T. sive Serpillum citratum *Tab. hist. Ic.* 2. 747. *& H. Eyst. & Rivin.* auf dem St. Ottilien Berg, in denen Hohlwegen, von Heilgenstein aus, an grasichten abhangenden Orten, Quendel mit Citronen Geruch. *perenn.*

Ser-

Serpillum vulgare minus, foliis acutioribus & anguſtioribus CBp. Quendel, mit ſchmahlen und ſpitzigen Blättlein, auf ſandigen Boden, zwiſchen dem Hagenauer Forſt bey Schweighauſen, *perenn.*

Sinapi arvenſe præcox ſemine nigro T. *flore cruciformi fructu ſiliquoſo* ſive Rapiſtrum arvorum Lobel. Rapiſtrum flore luteo *IB.* 2. 844. Hederich wilder Senf, mit gelben Blumen, und ſchwartzen Saamen, hin und wieder auf denen Aeckern.

Sinapi Erucæ folio T. ſive Sinapi Eryſimo *Tragi cognatum ſive ſimile IB.* 2. 857 *Ic. Tab. hiſt.* 838. *Moutarde ſauvage*, wilder Senf, bey der neuen Retoude, gegen der Citadell, an denen Aeckern, zu Gundershofen. *ann.*

Sium, ſive Apium paluſtre foliis oblongis T. *anguſtis per ambitum ſerratis, floribus albis roſaceis umbellatis, fructu ſubrotundo, Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 202. eſt Sium minus Rivin & Sium umbelliferum *IB.* 3. 172. Waſſer-Eppich, *Berle* in dem Graben, an dem Wickhäuſel, an dem Waſſer, gegen der grünen Wart. *perenn.*

Sonchus aſper laciniatus dentis leonis folio T. *floſculis ſemifloſculoſis luteis ſemine pappoſo* ſive *Sonchus laciniatus ſpinoſus* IB. 2. 1016. Sau-Diſtel, mit eingeſchnittenen Blättern, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 494. an der Landſtraſe, vor dem weiſen Thurn, und auf denen Kraut-Aeckern. *perenn.*

Sonchus aſper non laciniatus T. ſive Sonchus minor laciniоſus aſperior ſive ſpinoſior, foliis

foliis *in ambitu indiſſectis, caule fiſtuloſo*, rauher Gänſe oder Sau-Diſtel, mit unzerſchnittenen Blättern, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 498. beym vorherſtehenden. *perenn.*

Sonchus aſper arboreſcens T. *floſculis luteis ſemifloſculoſis* ſive Sonchus altiſſimus *Clus. hiſt.* CXLVII. *ſemine albo*, Baum Sonchen-Kraut, in dem Oſtwinckel, an dem Waſſer in feuchten Gruben, am Canal. *perenn.*

Sonchus repens multis Hieracium majus T. & *IB.* 2. 1017. & *Lobel. Ic.* 237. groß kriechend Sonchen-Kraut, groſe Gänſe-Diſtel, mit ſchmahlen Blättern, an denen Aeckern, und vor dem Spithal-Thor, und zu Oßwald. *perenn.*

Sparganium ramoſum T. & *IB.* 2. 541. *flore apetalo globoſo, fructu echinato, folio gramineo triangulari*, *Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 559. Igels-Knoſpen, Ried-Graß, in ſumpfichten Gräben, vor dem Fiſcher-Thor, und über der hohen Wart. *perenn.*

Sparganium non ramoſum T. ſeu alterum *IB.* 2. 541. *Tab. hiſt. Ic. pag.* 560. Igels-Knoſpe, ohne Aeſte, gegen dem Waſſer-Zoll über, an dem Waſſer. *perenn.*

Sparganium minimum T. & *IB. Ic.* 2. 541. kleine Igels-Knoſpen, auf denen Matten, zu Ehrſtein, in moraſtigen Gruben, in dem Eckbolsheimer Wald.

Spinacia vulgaris ſterilis T. *flore apetalo ſemine angulato*, Binetſch oder grün Kraut, *Epinars Ic. Tab. hiſt. pag.* 809. in Gärten und Gartners-Feldern. *perenn.*

Spi-

Spinachia vulgaris capsula seminis aculeata T. Binetsch mit stachelichten Saamen, est Spinacia Lobel Ic. 1. pag. 809. *ibid. perenn.*

Sphondylium vulgare foliis hirsutis T. sive Branca ursina *Germanica* IB. 3. part 2, 160. *flore albo rosaceo umbellato, semine plano nudo ovato. Berce,* Bären-Klau, *Ic. Tab. hist.* 280. & *in Rivin. perenn.*

Sphondylium vulgare hirsutum, floribus purpureis T. *Berce rouge*, Bären-Klau, mit röthlichten Blumen, in denen Hecken am Rhein. *perenn.*

Tamariscus Germanica T. *folio crassiore, flore albo rosaceo, fructu compresso siliquoso. Tamaris* Tamariscken, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1354. & IB. 1. 351. hin und wieder auf denen Sand-Bäncken am Rhein, *perenn.*

Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata T. sive Thalictrum nigrius, caule & semine striato IB. 3. 486. *floribus rosaceis umbelliferis albis semine oblongo,* Wiesen-Raute, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 120. & *in HEyst. Rue des prez, perenn.* beym Jäger-Hof.

Thalictrum pratense angustifol. T. & IB. 3. 487. est Vl. vel pratense ll. Clus hist. 234. est Ruta pratens major angustifolia *Ic. V. Tab. hist.* 121. Wiesen-Raute, mit schmahlen Blättern.

Thymus vulgaris folio tenuiore T. sive Thymum vulgare rigidius folio cinereo IB. 3. part. 2. 263. Thymian *Ic. HEyst.* fast in allen Gärten.

Tithymalus foliis pini, forte Dioscoridis *Pithyusa* T. *flore monopetalo campaniformi, fructu trigono.* sive Tithymalus Pinea *Lob. Ic.* 357. & *Tab. hist.*

990. *Ic.* 14. Wolfs-Milch, mit Fichten-Blättern, in der Ruprechtsau, auf der Promenade.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis T. sive Esula rotunda *IB.* 3. 669. & *Rivin. est Peplus Tab. hist.* 993. Wolfs-Milch, mit runden Blättern, in Kuchen Gärten, und Gartners Feldern. *ann.*

Tithymalus Myrsinites angustifolius T. sive 2. *Tab. hist. Ic.* 8. 989. Wolfs-Milch, mit schmahlen Myrten-Blättern, auf dürren Weiden, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Tithymalus Helioscopius T. & *IB.* 3. 669. *foliis majoribus, subrotundis* est Esula soliisequa Rivin. *Ic. Tab. hist.* 990. nach der Sonne sich richtende Wolfs Milch, *Reveille matin, suivant le soleil,* fast aller Orten, in der Ruprechtsau, auf den Aeckeren. *perenn.*

Tithymalus Myrsinites, fructu verrucæ simili T. *non ramosus, sive Tithymalus verrucosus IB.* 3. 673. Warzeln Wolfs-Milch / in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Tithymalus palustris fruticosus T. sive Tithymalus magnus multicaulis sive Esula major IB. 3. 671. *qui maximus. Tabern. hist. Ic.* 1. 987. & *in Rivin.* grose Wolfs-Milch, in sumpfichten Orten, beym Mauer Hof. *perenn.*

Tithymalus montanus non acris T. sive Esula minor altera floribus rubris *Lob. Ic.* 358. & *IB.* 3. 673. süsse Wolfs-Milch, in dem Gebürg hinter Hohen Andlau und Hochfelden. *perenn.*

Tithymalus non acris summe fœtidus, foliis latioribus, *flosculis exviridi luteis, nobis, non est*

prioris

prioris varietas ut Dominus Mappus existimat, sed quotannis in uno eodemque loco fœtens exsurgit. Stinckende Wolfs-Milch, mit grün gelben Blumen, beym Jesuiter Hof, an denen Garten-Zäune und in dem Gansauer Wald. *perenn.*

Tithymalus amygdaloides angustifolius T. & Tabern. hist. Ic. 6. 988. est Alypum Matthiol. Ic. Tithymalis affine IB. 3. 676. Wolfs-Milch, mit schmahlen Mandel-Blättern, in der Ruprechtsau, neben den Aeckern, und auf der Promenade. *perenn.*

Tormentilla sylvestris T. sive Tormentilla IB. 2. 598. *flore rosaceo luteo, folio dissecto, fructu globoso Ic. Tab. hist.* 360. Est Tormentilla heptaphyllon HEyst. Ic. etiam in Garidel. hist. Tab. 103. Ruhr oder Blutwurtz, Tormentill, *Tormentille*, auf der Gansau, in dem Brumbter Wald, wie auch in dem Wald zu Illkirch. *perenn.*

Tormentilla alpina major vulgaris T. grose Blutwurtz, bey Andlau auf denen Wiesen, bey Rappolsweyer in dem Gebürg. *perenn.*

Tribuloides vulgare aquis innascens T. *flore rosaceo fructu subrotundo aculeato*, sive Tribulus aquaticus *IB.* 3. 775. Wasser oder Stachel-Nüsse, Wasser-Castanien, Jesuiter-Mützen, *Chataigne d'eau*, in tiefen Weyhern zu Wimmenau.

Trichomanes, sive *Polytrichum officinarum* T. & *IB.* 3. 754. Wiederthon, Frauen-Haar, rother Steinbruch, in officinis substituitur adiantho nigro, zu Barr, zwischen denen Steinen, an

an denen Weinbergen, auf dem Ottilien Gebürg, zwischen denen Steinritzen, *perenn.*

Trichomanes minus & tenerius T. sive Trichomanes minus album IB. 3. 755. est Trichomanes minor mas Ic. 4. *Tab. hist.* 1188. klein Wiedertodt, Männlein, auf dem Ottilien Gebürg in feuchten schattichten Steinritzen, *perenn.*

Trifolium montanum lupulinum T. *flore papilionaceo fructu globoso, capitulis spadiceis*, Berg Hopf-Klee, hinter hohen Andlau, auf denen Berg-Wiesen. *perenn.*

Trifolium montanum spica longissima rubente T. sive Trifolium majus, folio & spica longiore IB. 3. 375. est Lagopus major H. Eyst. Berg-Klee, mit rothen langen Blumen, und langen Blättern, in dem Eschauer und Gausauer Wald. *perenn.*

Trifolium pratense purpureum majus, foliis longioribus & angustioribus floribus saturatioribus Ray. synops 194. groser Wiesen-Klee, mit längern satt rothen Blumen, in dem Ostwinckel. *perenn.*

Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus T. est Lagopus trifolius quorundam IB. 2. 377. *flore papilionaceo albescente* Ic. 1. *Tab. hist.* 908. & *in Rivin.* kleiner Katzen-Klee oder Hasen-Pfötlein, *Pied de Lievre*, aller Orten auf denen brachliegenden Feldern, *ann.*

Trifolium spica oblonga rubra T. sive Trifolium majus Ill. Clus. hist. CCXIV. & IB. 2. 375. groser rother Geisen-Klee, mit abl ngen

zugespitzten Blumen, in dem Ostwinckel, *perenn.*

Trifolium capitulo spumoso aspero minus CB. prodr. 140. kleiner Wiesen-Klee, mit wollichten rauhen Köpfen, auf feuchten Wiesen, bey der Rheinbruck, vor dem Fischer-Thor, oberhalb der Schiffmatt, *perenn.*

Triticum hybernum spicis carens T. *floribus aperalis stamineis semine oblongo*, Winter oder gemeiner Weitzen, *Blé d'hyver Ic.* 1. *Tab. hist.* 597. à tempore sationis dicitur etiam Triticum æstivum, Sommer-Weitzen, auf denen Felderen.

Triticum typhinum simplici folliculo T. Welscher Weitzen, mit einfach geährten Körnern, *Ic, IB.* 2. 708 zu Drusenheim.

Turritis leucojifolio T. *flore cruciformi, fructu siliquoso*, sive Myagrum siliquosum vel secundum *Tab. hist. Ic.* 2. 1252. est Myagro affinis planta siliquis longis IB. 2. 894. groser wilder Kresse, an dem Ufer gegen dem Wasser Zoll über, in Gärten, und neben den Aeckern, *ann.*

Turritis alpina foliis ineisis T. Thurn Alpen-Kraut, mit eingeschnittenen Blättern, auf den Bergen gegen Hochfeld, in dem Barrer Wald, an feuchten schattichten Orten. *ann.*

Veratrum flore atro rubente rosaceo, semine oblongo T. sive Helleborum album flore nigro IB. 3. 634 *Ellebore blanc, à fleur rouge brun*, weise Nießwurtzel, auf dem Gebürg, hinter Blinschweyler an Creutz-Pfad. *perenn.*

Veronica aquatica major, folio subrotundo T. sive Anagallis aquatica major. *IB.* 3. 791.

& *Tab. hist. Ic.* 4. 1094. & *in Rivin*, est Beccabunga Officinarum, *flore monopetalo cœruleo rotato*, Bachbung grofer Gauchheil, *Berle* in feuchten Orten, beym Wickhäusel, an der Bruck, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Veronica aquatica minor folio subrotundo T. sive Anagallis aquatica folio rotundiore minor IB. 3. 790. Kleine Bachbung *Ic. Tab. hist.* 1. 1094. an Wassergräblein, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Veronica aquatica major, folio oblongo T. sive Anagallis aquatica major, flore cœruleo, folio oblongo *Ib.* 3. 791. est Berula, *Tab. hist. Ic.* 3. 1094. Bachbung, mit langlichten Blättern, in denen meisten stillstehenden Wasser Gruben, in der Ruprechtsau, an dem Wasser zu Oßwald. *ann.*

Veronica aquatica minor folio oblongo T. flore *purpurascente* sive Anagallis aquatica minor 2. *Tab. hist. Ic.* 2. 1094. & *in Rivin.* Kleine Bachbung, mit schmahlen Blättern, vor dem Metzger-Thor in denen wässerichten Orten zu Oßwald am Bach, *perenn.*

Vicia sepium folio rotundiore acuto, *flore papilionaceo, fructu siliquoso, semine nigro subrotundo*, T. Sommer Saat-Wicken, mit schwartzen Körnern, *Ic.* 1 *Clus hist.* CCXXXV. Zaun-Wicke, auf denen Feldern, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wörth. *ann.*

Viola montana cœrulea grandiflora HRP. *flore polypetalo anomalo, fructu trigono* sive Melani-

blaue

um montanum Dalechamp. Lugdun. 1204. blaue Berg Violen, mit grosen Blumen, oberhalb Hochfeld, auf dem Weidgang. *Grande Violette de Montaigne, perenn.*

Viola montana alba grandiflora, weise grose Berg-Violen, *ibid.*

Viola montana lutea grandiflora, sive lacea tricoloris genus, flore luteo magno repens non annuum IB. 3. 548. est Violæ montanæ tertiæ genus aliud Clus hist. 310. gelbe Berg-Violen. *ibid.*

Viola montana tricolor, flore odoratissimo T. sive laceæ tricoloris, sive floris tricoloris genus, flore purpureo magno repens non annuum IB. 3. 548. est Viola montana III. sive Tricolor Clus hist. 310. grose Berg-Violen, auf dem Roßberg zu Maßmünster.

Viola tricolor hortensis repens T. Dreyfaltigkeit Blumen, Freysam-Blum, *Pensées. Ic. 2. Tab. hist. 690. ann.*

Virga aurea vulgaris latifolia T. & IB. 2. 1068. *foliis minus serratis, floribus luteis radiatis, semine papposo*, quæ Virga aurea HEyst. gemein Heydnisch Wund-Kraut, *Verge dorée* in denen Hecken zu Oßwald und Illkirch. *perenn.*

Virga aurea latifolia serrata T. sive *Virga aurea vel Solidago Saracenica latifolia serrata* IB. 2. 1068. breit blättricht gekerbt Heydnisch Wund-Kraut, an der Ill, gegen Oßwald, auch in dem Ostwinckel, *Ic. Tab. hist.* 1260. *perenn.*

Vitis sylvestris Labrusca T. *flore rosaceo racemoso*

moso albescente, fructu globulari, sive Labrusca Dalech. Lugd. 1406. *Vigne sauvage*, wilde Rebe, auf dem Weg gegen Oßwald, in den Hecken, in dem Ostwinckel, gegen Illkirch, *perenn.*

Vulneraria rustica T. sive Anthyllis leguminosa Rivin, *flore luteo papilionaceo, foliis subrotundis, siliquoso brevi semine subrotundo*, gelber Hasen-Klee, *Ic. 3. Tab. hist. 909. & in Rivin. Vulneraire*, auf allen trockenen Wiesen, auf der Glacis, vor dem weisen Thurn Thor, in dem Ostwinckel. *perenn.*

Ulmaria officinarum T. Clus. hist. CXLVIII. sive Barba capræ floribus compactis CBp. albis *rosaceis, foliis serratis, radice capillata amara nigra, fructu membranaceo*, Barbe de Chevre ou Reine de prez *Ic. Tab. hist.* 1162. Geißbart, an dem Wasser der Gallen-Matt, auf feuchten Wiesen an dem Canal. *perenn.*

MENSIS
JULIUS ET AUGUSTUS.

Abrotanum linifolio acriore odorato T. *flore flosculoso, semine papposo Ic. Tab hist.* 855. Stabwurtz, mit Flachs-Kraut Blättern, *Estragon* in Gärten, und auf denen Gartners-Felderen, häufig. *perenn.*

Absinthium ponticum T. *folio latiori, floribus luteis flosculosis, semine papposo*, sive Absinthium vulgare majus, *Ic. IB.* 3. 168. *Absinte ordinaire*, gemeiner Wermuth, *Ic. Tab. hist. pag.* 1. aller Orten, in Gärten und Weinbergen, *perenn.*

Absin-

Absinthium ponticum montanum T. sive Absinthium vulgare montanum *IB.* 3. 173. *Absinte de Montaigne*, Berg Wermuth, auf dem Wasserburg beym Schloß. *perenn.*

Acetosa arvensis minima non lanceolata T. sive Oxalis minima *Tab. hist. Ic.* 6. 827. gar kleiner Saurampfer, auf dürren sandigen Aeckern/ zu Lingelsheim, *perenn.*

Agaricus pedis Equini facie, sive Fungus igniarius ex albo cinereus & glaber, Feuer oder Zunder-Schwamm, in allen Waldungen / unten an den Stämmen, alter Eich und Buchbäume, *perenn.*

Agaricus auriculæ forma T sive Fungus sambucinus est I genus fungor. perniciosor. Clus: hist. CCLXXVI. Hollunder Schwämme, Judas-Oehrlein, an denen alten Hollunder-Stämmen.

Agaricus flavus betulinus. gelber Birckens Schwamm, in dem Gansauer Wald, an alten Birckens-Stämmeu.

Agaricus lamellatus, pectunculiforma, Alno adnascens Scherard. Suppl. & Vaill. Tab. X. fig. 1. Muschelförmiger Schwamm, an alten Erlen Stämmen, an den Wassern.

Agaricus officinali similis Dillen. sive Agaricus albus caudicibus arborum adhærens. weisser Baum- oder falscher Lerchen-Schwamm, in Waldungen, an unterschiedenen Bäumen.

Agaricus porosus rubens carnosus hepatis facie Dillen & Dodon. Leberförmiger Baum-

Schwamm, an alten Eichbäumen, in dem Hagenauer Forst.

Alcea hirsuta T. sive villosa IB. 2. 1067. haarichter Fellriß, auf der Contrescarp, zwischen dem Cronenburger und Steinstrasser-Thor, an denen Fußpfaden, nach Mittelhaußbergen, neben den Aeckern, *perenn.*

Allium montanum bicorne angustifolium flore purpurascente T. *liliaceo, fructu subrotundo,* sive Ampeloprasum proliferum Lobel. 156. est Allium sylvestre bicorne purpureum proliferum *IB.* 2. 561. Heiden Knoblauch, schmahl blättrichter Berg Knoblauch, auf der Elsau gegen Arbogast auf denen Aeckern, in denen Weinbergen, zwischen Barr und Heilgenstein. *perenn.*

Alsine palustris seu paludosa rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus binis ex adverso nascentibus, flosculis virescentibus rosaceis Ic Tournef. alsat. pag. 115. Tab. II. lit. b. an Alsine quoddam genus Pelagicum & litterale Clus. hist. CLXXX. 1111. Wasser-Burtzel, in sumpfichten Orten, vor dem weisen Thurn, bey der ersten Bleich, *perenn.*

Alsine spergula dicta major, T. sive Spergula IB. 3722. Alsine geniculata, foliis strictissimis circa caulem stellatim positis tennibus, flosculis albis integris rosaceis, radice singulari fibrosa nobis, an denen Furchen, feuchter und sandigen Aecker, häufig auf denen Sand Bäncken, der Breusch, gegen Eckbolsheim. *ann.*

Alsine pusilla graminea flore tetrapetalo T. *herbi-*

p. 205. Tab. VIII

Alsine pusilla graminea flore tetrapetalo T.

J. Striedbeck. sculp:

herbido é muſcoſo fugaci, radicula repente, ſive Saxifraga graminea puſilla flore parvo tetrapetalo Ray hiſt. 1026. in grasichten Orten, in dem Oſtwinckel, an dem Canal bey der Wolfheimer Bruck, auf der Inſul, wo die Breuſch in die Ill fält. vid Tab. noſtr. VIII. *perenn.*

Alſine paluſtris minor folio oblongo repens, floſculis parvis racemi modo junctis albis roſaceis *Ic. Tournef. alſat.* 115. *Tab.* 11. *lit. c.* ſive *Polygoni Linifolia perterram ſparſa, flore ſcorpioidis IB.* 3. 379. Sumpf Gauchheil, mit langen Blättlein, und gedrungenen weiſen Blümlein, an ſumpfichten Orten, auf der Inſul, wo die Breuſch in die Ill fält, *ann.*

Alſine paluſtris tenuifolia muſcoſa T. ſive *Alſine muſcoſa quibusdam IB.* 3. 365. & *Dalech. Lugd.* 1235. Alſinaſtrum ſerpillifolium flore albo tetrapetalo Vaill. *Ic. Tab.* 11. *fig.* 2. *foliis oblongis conjugatis, cauliculo nodoſo*, auf der Inſul, wo die Breuſch in die Ill fält, in dem Hagenauer Forſt, in ſumpfichten Orten. *ann,*

Althæa Dioſcoridis T. ſive Biſmalva *IB.* 2. 954. *folio molli incano, flore albo monopetalo campaniformi, ſemine reniformi, Ic. Tab. hiſt.* 1152. Eibiſch, *Guimauve*, auf aufgeworfenen Waſſer-Gräben, zu Fegersheim, und zu Marlenheim. bey Fegersheim. *perenn.*

Alyſſum montanum perenne incanum T. ſeu Thlaſpi montanum luteum *IB.* 2. 928. vel ſupinum luteum Lobel. Ic. 220. *flore truciformi luteo*

luteo fructu gibbo, unter denen zerfallenen Felsenstücke in dem Hochgebürg Niedeck. *perenn.*

Ammi perenne umbellatum T. *flore rosaceo semine gibbo striato* sive Eryngium arvense, *foliis serræ similibus C.Bp.* quod Crithmum quartum umbelliferum Matthioli *IB.* 3. *part.* 2. 195. Bacillen oder Sichel-Kraut, in dem Wall beym steinstraser Thor, auf denen Aeckern bey Oberehenheim am Weg, nach Eckbolsheim, *perenn.*

Ammi majus foliolis plurimum incisis & nonnihil crispis T. neben den Aeckern, in dem Ostwinckel, und bey dem Illkircher Wald. *perenn.*

Anacampseros vulgo Faba crassa T. *flore albo rosaceo foliis succulentis* est Fabaria officinarum Orpin, *Ic. IB.* 3. 681. & *Tab. hist. Ic.* 1227. zu Gravenstaden und Illkirch, auf denen Aeckern, in dem Eckbolsheimer Wald an dem Canal. *perenn.*

Anacampseros purpurea T. sive Telephium floribus purpureis *rosaceis Lob. Ic.* 398. Orpin à fleur, purpurine, fette Henne, mit rothen Blumen, in dem Reichstätter Wald. *perenn.*

Angelica pratensis apii folio sive Sium quibusdam flore luteolo IB. 3. part. 2. 170. est Seseli pratense Rivin. *tenuifolium flore rosaceo umbellato, semine oblongo striato* Roß-Fenchel, auf denen Matten zu Oßwald am Canal, est Hippomarathrum 1. *Tab. hist.* 160. *perenn.*

Apium anisum dictum semine suaveolente majore T. *floseulis albis rosaceis, foliis imis subrotun-*

dis

dis in ambitu ſerratis, ſuperioribus profunde diſſectis fru-ctu globulari, Aniß, *Anis Ic. Tab. hiſt.* 171. & *in Rivin.* auf denen Gartners-Feldern. *ann.*

Apium ſeu Petroſelinum criſpum T. Krauß-Peterlein, *Ic.* 2. *Tab. hiſt. pag.* 264. & *in Rivin. ibid. perenn.*

Apium hortenſe ſeu Petroſelinum vulgare *floſculis albis roſaceis umbellatis foliis latis diſſectis Perſil*, gemein oder Garten-Peterlein, *Ic. Tab. hiſt.* 264. & *in Rivin. perenn.*

Apium paluſtre & officinar. T. floſculis albis roſaceis umbellatis ſeu Apium vulgare ingratius *IB.* 3. *part.* 2. 100. eſt Paludapium, *Tab. hiſt. Ic.* 1. 273. & *Apium Rivin.* Eppich, Waſſer-Peterlein, an Waſſer-Gräben, in der Ruprechts-an- *perenn.*

Aphaca T. *flore papilionaceo fructu ſiliquoſo. Lob. icon* 70. ſive Lathyrus annuus foliis convolvuli minoris Mor. HOx. ſeu Elatine 11. *Tab. hiſt. Ic.* 3. 1092. gelbe Steinwicke, in der Ruprechtsau, auf denen Aeckern, *ann.*

Ariſtolochia clematitis recta T. ſive vulgaris *IB.* 3. 560. *longa, ſtoribus luteis monopetalis tubulatis, fructu cylindraceo Tab. hiſt. Ic.* 2. 1142. & *in Rivin. Ariſtoloche*, Oſter-Lucey, zu Dorlisheim, Bläßheim und Barr, an denen Reinen der Reben. *perenn.*

After atticus cœruleus vulgaris T. *flore purpureo radiato, ſemine pappoſo IB.* 2. 1044. eſt Atticus after flore cœruleo HEyſt. blau Stern-Kraut, *Ic. Tab. hiſt.* 1. 716. zwiſchen Lingelsheim und Oßwald,

wald, in dem Jülkircher Wald. *petit Mugue, perenn.*

After paluſtris luteus, folio lanuginoſo longiori T. *fructu pappoſo*, ſive Britannica conyzoides *IB.* 2. 1047. *ſeu vera Dalech. Lugd.* 1082. Waſſer Stern-Kraut, mit haarichten Blättern, am Rhein, beym Auenheimer Wald. *perenn.*

Atriplex anguſto oblongo folio T. *floribus pallide virentibus ſtamineis*, eſt Atriplex helxines folio *ſemine oblongo*, Lob. Ic. 257. vel Atriplex vulgaris anguſtifolia cum folliculis *IB.* 2. 973. wilde ſchmahl blättrichte Melte, hin und wieder bey Miſtſtätten, und aufgeworfenen Gräben / *Arroche ann.*

Atriplex folio haſtato ſeu deltoide T. ſive Atriplex procumbens rubra, folio triquetro HRPar. Melte, mit 3 eckichten Blättern, ibid. und am Ballhauß. *perenn.*

Atriplex hortenſis alba ſive pallide virens T. *flore ſtamineo ſubluteo*, *foliis latis pinguibus mucronatis*, ſive Atriplex ſativa alba *Lob. Ic.* 253. weiſe Garten-Melte, *Bonnes dames*, in denen Kraut-Aeckern, *ann.*

Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio HLB. Melte mit ſehr ſchmahlen und langen Blättern, hin und wieder auf denen Kraut-Aeckern. *perenn.*

Atriplex hortenſis rubra T. ſive Atriplex ſativa altera folio & flore purpureo livens Lob. Ic. 253. & Ic. 1. Tab. hiſt. pag. 810. rothe Garten Melte, *Arroche rouge*, hin und wieder in denen

nen Gärten, und auf denen Gartners-Aeckeren. *ann.*

Betonica arvenſis annua, flore ex albo flaveſcnte T. *monopetalo labiato verticillato ſemine oblongo*, ſive Sideritis glabra arvenſis latifolia IB. 3. 427. eſt Sideritis flore albo, barba luteola Rivin. *Alyſſum majus*, Tab. *hiſt. Ic.* 3. *pag.* 929. groſe Feld-Allyſſen Glied-Kraut, an der Schäfelsheimer Klamm, *ann.*

Bidens foliis tripartito diviſis T. *flore floſculoſo ſemine aculeato*, ſive Cannabina aquatica folio tripartito diviſo ſeu minus pulchro *Ic. IB.* 2. 1073. Waſſer-Doſten, an denen Waſſeren bey Oßwald, und an der Ill, *Eupatoire batard. perenn.*

Bidens foliis tripartito diviſis, caule purpuraſcente Vaill. Waſſer Doſten, mit röthlichten Stenglen, bey der Rheinbruck, in der Stadt bey dem Frantzöſiſchen Spithal, an dem Weg. *perenn.*

Bidens folio non diſſecto T. *flore luteo diſcoide odorato* ſive Verbeſina pulcherrino flore IB. 2. 1074. eſt Eupatorium cannabinum chryſanthemum *Tab. hiſt. Ic.* 2. 336. in Sumpfen.

Biſtorta major radice minus intorta T. *foliis rugoſioribus, ſemine triangulari* Natter-Wurtz, mit krauſen Blättern, Garidel Hiſt. plant. Tab. 14. *Biſtorte*, in dem Ganßauer Wald zu Jllkirch, uud zu Moltzheim auf denen Wieſen. *perenn.*

Biſtorta major radice magis intorta T. ſeu Biſtorta media, folio minus rugoſo *IB.* 538.

folio

folio integro, flore apetalo incarnato ſpicato, Natterwurtz, Schlangenwurtz, mit glatten Blätteren, *Biſtorte* auf feuchten Wieſen, in der Ruprechtsau. *Ic. 1. Tab. hiſt. 82. perenn.*

Biſtorta alpina maxima Ic. & IB. 3. 539. groſe Alpen Natterwurtz, bey der Melckerey gegen Hochfeld, bey dem rothen Kreutz, *perenn.*

Biſtorta alpina minor T. ſive Biſtorta minor Clus. hiſt. XIX. & IB. 3. 539. klein Alpen Natterwurtz ibid. *perenn.*

Blattaria lutea, folio oblongo laciniato T. ſive Blattaria lutea IB. 3. app. 874. *flore monopetalo rotato ſtaminulis purpureis, fructu rotundo*, Schaben-Kraut; *Herbe au Mites ou Blattaire Ic. 5. Tab. hiſt. 959.* auf dem Schießrein, bey allen Lüften, bey den Sandgruben, *perenn.*

Blitum rubrum majus T. *flore ſtamineo ſpicato rubente ſemine oblongo*, rother Meyer, *Blete rouge Ic. 1. Tab. hiſt. 817.* hin und wieder in Gärten, *ann.*

Blitum album majus T. weiſer Meyer, *Blete blanc. Ic. 2. Tab. hiſt. 817.* in denen Gartners-Aeckern. *ann.*

Blitum rubrum minus IB. 2. 967. ſeu Blitum rubrum ſupinum Lob. Ic. 250. rother Meyer, rothe Miſtmelte, *Blete ſauvage*, an denen Straſſen und Miſtſtätten. *ann.*

Blitum ſylveſtre ſpicatum T. ſive Blitum album minus IB. 2. 967. *foliis variegatis, floribus apetalis, ſemine tentiformi nigro* weiſer Meyer, an denen Zäunen, vor dem Metzger Thor.

Blitum

Blitum ſylveſtre ſpicatum, T. foliis ex albo & viridi variegatis, ſive Blitum album minus IB. 2. 967. geflecktер kleiner Meyer, an denen Mauren alter Stadtgräben. *perenn.*

Brunella cœrulea flore magno T. *folio non laciniato, ſemine ſubrotundo Clus. hiſt. XLIII. & Tab. hiſt. Ic. I. 944. & in Rivin.* blaue groſe Brunelle, in dem Illkircher Wald, nahe an denen Aeckeren, auf der Oßwalder Nachtweyd. *Brunelle, perenn.*

Brunella folio laciniato T. flore magno purpureo quæ II. *Clus. hiſt. flore purpur. XLIII. & in Rivin.* Brunelle mit eingeſchnittenen Blättern, auf allen Matten, *perenn.*

Brunella major, folio non diſſecto, flore purpuraſcente HRPar. rothe Brunellen, in dem Ganßauer Wald, und auf der Kaltau. *perenn.*

Buphthalmum Tanaceti minoris folio T. *floſculis luteis radiatis, ſemine anguloſo*, eſt Buphthalmum II. *Tab. hiſt.* 90. & *Matth. Epit.* 651. Rinds-Aug, Streich-Blum, *Olil de boeuf.* auf dürren brachliegenden Ackern, in dem Ried zu Marcklesheim. *perenn.*

Bupleurum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum T. quod anguſtifolium *Tab. hiſt. Ic.* 2. 1258. & *in Rivin.* Haſen-Oehrlein, an denen Zäunen zu Oſthofen, und an denen Reben zu Bläßheim *perenn.*

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum T. *ſemine nigro pellucido* ſive Perfoliata arvenſis annua vulgaris, IB. 3. part. 2. 198. *floſcu-*

lis subluteis umbellatis rosaceis, Durchwachs oder Bruchwurtz, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1140. & *in Rivin.* unter der Frucht, zu Niederhaußbergheim und Oßwald *aun.*

Bupleurum montannm latifolium T. sive Perfoliata montana Camer. Hort. Ic XXXVIII. breit blättricht Bruchwurtz, zu Sultzbach, bey Collmar, auf dem Gebürg, beym Bad zu Sultz, zwischen denen Steinen, *perenn.*

Calamintha vulgaris arvensis verticillata vel Officinarum Germaniæ T. *semine oblongo*, sive Calamintha flore magno vulgaris IB. 3. part. 2. 228. Ic. 1. Tab. hist. 733. & in HEyst. atque Rivin. *Calamente de Montaigne*, gemeine Berg-Müntze. *perenn.*

Calamintha pulegii odore sive Nepeta T. Calamintha flore minore, odore pulegii *IB.* 3. *part.* 2. 229. est *Calamintha arvensis*, 11. *Tab. hist.* 736. Acker Müntze, Poley-Müntz, auf brachliegenden Aeckern, zu Jlkirch und Oßwald. *ann.*

Campanula vulgatior foliis urticæ seu major & asperior T. & *IB.* 2. 800. *flore monopetalo cæruleo campaniformi, radice alba nodosa*, Zapfen oder Halß-Kraut, mit blauen Blumen, grose Zaun-Glocken, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 797. *Campanule ou Gand de nostre Dame*, in allen Wäldern. *perenn.*

Eadem flore candido T. Halß-Kraut, mit weisen Blumen, in dem Forst bey Hagenau, in denen Hecken, *perenn.*

Campanula pratensis flore conglomerato T. sive Trachelium minus multis, *IB.* 2. 800.

Wie-

Wiesen-Glöcklein, mit gedrungenen blauen Blumen, *Ic.* 3. *Tab. hist.* 790. auf denen Wiesen zu Oßwald. *perenn.*

Eadem flore albo T. Wiesen-Glöcklein, mit zusammen gedrungenen weisen Blumen, auf denen Matten, an dem Eckbolsheimer Canal. *perenn.*

Campanula pyramidata altissima T. *folio latiore, flore albo monopetalo* sive Campanula lactaria, *Tab. hist. Ic.* 1. 699. & *Clus. hist. CLXXII.* Pyramiden oder Milch-Glocken, auf dem Haulen Berg, per me luxuriat. *perenn.*

Campanula alpina latifolia cœrulea CBp. Berg-Glöcklein, mit blauen Blumen, auf den Felsen und Steinklüfften, Niedecker Gebürgs. *perenn.*

Campanula alpina linifolia, flore cœruleo T. & IB. 2. blaue Berg-Glöcklein / mit Lein-Kraut Blättern, auf dem wilden Höchgebürg, bey der schwarzen See, oberhalb Peris, unter Klippen, und an denen Felsen, *perenn.*

Campanula alpina rotundifolia minor T. seu altera IB. 2. 797. sive Campanula minor alpina rotundioribus imis foliis Clus. hist CLXXIII. rund blättrichte Glöcklein, auf dem Hochfelder Hochgebürg, an denen Felsen. *perenn.*

Campanula pratensis floribus singularibus per caulem sparsis T. Wiesen-Glöcklein, mit vielen an dem Stengel hin und wieder stehenden Blumen, zu Lingelsheim und Oßwald. *perenn.*

Cannabis sativa T. sive Mas IB. 3. 487. potius fœcunda, flore apetalo stamineo, Fruchtbringender Hanf, auf denen Aeckern. *ann.*

Cannabis erratica T. ſive Fœmina IB. Spinn Hanf ohne Körner. *Iul. ann.*

Carduus lanceolatus latifolius *Ic.* & *IB.* 3. 58. *flore purpureo floſculoſo apetalo majore ſemine pappoſo.* Speer-Diſtel, an allen Landſtraſſen, an dem Weg gegen Ittenheim. *ann.*

Carduus Marianus albis maculis notatus T. & *IB.* 3. 56. Marien-Diſtel, hin und wieder auf dem ausgeworfenen Unrath der Gärten, vor dem Metzger-Thor, neben den Aeckern zu Illkirch. *Ic. Tab. hiſt.* 1078. *ann.*

Carduus nutans T. *capitulo magno ſingulari pendente, flore purpureo ſuaveolente, tota ſtirpe ſpinoſus*, Weg Diſtel, mit rothen hangenden wohlriechenden Köpfen, *Ic. IB.* 3. 56. an allen Landſtraſſen. *perenn.*

Carduus nutans flore albo T. Weg-Diſtel, mit weiſen hangenden wohlriechenden Köpfen, an der Landſtraſſe gegen Ittenheim, an den Reben, bey Lingelsheim. *perenn.*

Carduus acanthoides T. & *IB.* 3. 56. *caule alato incano, floſculis purpuraſcentibus*, ſive Polyacantha *Tab. Ic.* 1. *pag.* 1080. kleine Weg-Diſtel, bey Niederhaußbergen, an denen Wegen der Aecker/ *perenn.*

Caduus caule criſpo T. & *IB.* 3. 59. ſeu *ſpinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris, capitulis minoribus purpureis*, Weg-Diſtel, mit kleinen rothen Blumen und krauſen, überall beſetzten Dornichten Stengel, aller Orten an denen Wegen, und aufgeworfenen Gräben.

Carduus ſtellatus T. ſive Calcitrapa *IB.* 389. *foliis papaveris erratici, flore purpureo ſemine non pappoſo* ſeu Spinatella *Tab. hiſt. Ic.* 2. *pag.* 1080. Stern-Diſtel, *Chardon étoilé ou Chauſſetrape*, vor dem weiſen Thurn-Thor, und auf dem Schießrein. *perenn.*

Carduus ſtellatus flore albo HRP. Stern-Diſtel, mit weiſen Blumen, *Ic.* 3. *Tab. hiſt.* 1081. bey allen Lüften, *perenn.*

Carduus tomentoſus acanthifolio T. ſive Acanthium vulgare flore purpureo *Tab. hiſt. Ic.* 2. 1063. eſt Spina alba ſylveſtr. Fuchs. *IB.* 354. *ann.*

Carduus tomentoſus acanthifolio vulgaris flore albo. T. ſive Acanthium vulgare, flore albo *Tab. Ic. pag.* 1063. *perenn.*

Carduus capite rotundo tomentoſo T. ſive Carduus capite tomentoſo *IB.* 3. 57. Berg-Diſtel, mit runden wollichten Köpfen, nahe am Dorf, bey Niederhaußbergen, *perenn.*

Carlina acaulos magno flore T. albo, *ſemine pappoſo* ſeu *Carlina acaulos IB.* 3. 64. weiſe niedrige Ekerswurtzel, eſt Chamaleon albus officinar. *Tab. hiſt. pag.* 1068. auf dem Aaßweyler Gebürg, Carline. *perenn.*

Carlina cauleſcens, magno flore purpurea T. *Ic.* 2. *Tab. hiſt. pag.* 1068. Carline noir. hohe ſchwartze Eberswurtz, auf denen höchſten Fürſten, hinter Kayſersberg. *perenn.*

Carlina ſylveſtris vulgaris T. ſive *Attractylis IB.* 3 81. caule ſpinoſiore, flore luteo radiato, eſt Heracantha *Tabern.* Drey-Diſtel, *Ic. hiſt. pag.*

1076. & *Clus. hist. CLVII.* bey allen Lüften, auf der Schlut, und anderen dürren Orten. *ann.*

Carthamus seu Cnicus sativus officinar. T. *flore luteo flosculoso semine albo anguloso*, *IB.* 3. 79. est Cnicus vulgaris *Clus. hist.* CLII. auf denen Feldern zu Ensis- und Blobsheim, *ann.*

Carvi T. *flore albo rosaceo semine gibbo & striato* sive Cuminum pratense seu officinarum quod Caros IB. 3. part. 2. 69. Feld oder Mattkümmich, nostr. Mackkümmig, auf denen Wiesen bey Oßwald, bey dem Rhein-Zoll häufig- *ann.*

Carvifolia Vaill. Tab. fig. 2. & & *IB.* 3. 171. *floribus albis rosaceis umbellatis*, sive Cyminum sylvestre equinum Tragi, Roß-Kümmel, auf der Lingelsheimer Roßweid. *perenn.*

Cassida palustris vulgatior flore cœruleo T. *monopetalo labiato, foliis viridibus amaris, semine oblongo*, sive Lysimachia cœrulea, Tertianaria dicta *IB.* 3. 435. blauer Weidrich, bitter Fieber-Kraut, *Ic. Tab. hist. pag.* 766. & *in Rivin.*

Cassida palustris minima flore purpurascente T. Weidrich, mit rothen Blumen, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, hauc plantulam anno 1739. in prædicto loco reperi, quam in hortum medicum transtuli, ubi nunc luxuriose viget. *vid. Tab. nostr. IX. perenn.*

Caucalis arvensis echinata magno flore, T. sive Lappula canaria flore pulchro magno albo *IB.* 3. *part.* 2. 79. *rosaceo umbellato*, *foliis profunde incisis*, sive Echinophora magno flore Rivin. *Ic.* 1. *Tab. hist. pag.* 290. Kletten-Körfel, mit grosen

p. 216.

Tab. IX

Cassida palustris minima T.

J. Striedbeck. Sculp.

grosen weisen Blumen, auf denen Aeckern bey Jlkirch, Oßwald und Ittenheim. *ann.*

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu T. quæ Lappula canarina *IB.* 3. *part.* 2. 804. est Echinophora Rivin. Kletten-Körfel, mit kleinen Blumen, vor dem Fischer Thor, gegen der Citadell, auf denen Aeckern gegen Oßwald. *ann.*

Centaureum minus T. *flore purpureo* IB. 3. 353. *monopetalo infundibuliformi diviso, fructu cylindraceo*, tausend Gulden-Kraut, mit rothen Blümlein, *ic. Tab. hist.* 1. *pag.* 1166. in dem Gansauer und Eckbolsheimer Wald, *petite centaurée ann.*

Idem flore albo T. tausend Gulden-Kraut, mit weisen Blumen, zu Heilgenstein copiose.

Centaurium minus purpureum ramosissimum palustre Vaill. Tab. VI. fig. 1. Klein Sumpf tausend Gulden-Kraut, mit rothen Blümlein und vielen Stenglein, auf feuchten Wiesen, bey Oßwald vor dem Fischer-Thor, auf der Schiffmatt. *ann.*

Chamædrys laciniatis foliis T. *flore monopetalo labiato, semine subrotundo*, sive Botrys vericillata *IB.* 3. 298. *Lob. ic.* 385. aut Iva moschata, folio multifilo Rivin *Germandrée Femelle*, Iven-Kraut, mit gespaltenen Blättern, auf denen Brach-Aeckern, nach der Erndte *ann.*

Chamædrys fruticosa sylvestris melissæ folio T. sive Salvia sylvestris vel Scordium folio salviæ, *IB.* 3. 293. *floribus subluteis monopetalis labiatis*

hiatis, *Ic. Tab. hist.* 761. Wald-Salbey, *Ic. in Rivin.* in dem Hördter Wald, auf dem Gebürg zu Oberbrunn. *perenn.*

Chamænerion vulgare latifolium T. *flore luteo rosaceo, fructu siliquoso*, sive Lysimachia speciosa, quibusdam Onagra. dicta siliquosa IB. 2. part 2. 906. est Chamænerion HEyst. gelber Weidrich, breitblättriger Schoten-Weidrich, an der Ill, gegen Oßwald, in der Ruprechtsau, an dem Rhein. *perenn.*

Chamænerion glabrum majus T. *latifolium* five Lysimachia siliquosa major CBp. *flore purpureo rosaceo. Herbe St. Antoine*, schöner rother Weidrich, mit breiten Blättern, *Ic.* 6. *Tab. hist.* 1238. an denen Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, an der Ill gegen Oßwald. *perenn.*

Chamænerion glabrum minus T. sive Lysimachia minor, *Tab. hist.* 3. *pag.* 1237. kleiner rother Weidrich, zu Oßwald an feuchten Orten. *perenn.*

Chamænerion villosum magno flore purpureo T. sive Lysimachia siliquosa hirsuta, majore flore purpureo IB. 905. *Lysimache rouge*, haarichter Weidrich, mit grosen röthlichen Blumen, *Ic.* 4. *Tab. hist.* 1237. in dem XV. Wört am Rhein.

Chamænerion villosum minus parvo flore T. sive Lysimachia siliquosa hirsuta minor. CBp. parvo flore purpurascente, klein haarichter Weidrich, *Ic.* 5. *Tab. hist.* 1237. am Weg nach der grünen Wart und hinter Barr. *perenn.*

Cha-

Chamænerion villoſum, parvo flore T. ſive Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta flore minore, *IB.* 2. 906. eſt Lyſimachia, *H. Tab. hiſt. pag.* 1237. in dem XV. Wört am Rhein, an denen Werckern gegen der Citadell, unter denen Weiden, am Waſſer, bey allen Lüften.

Chenopodium fœtidum T. *flore apetalo, ſemine plano orbiculato*, ſive Altriplex fœtida *IB.* 2. 974. quæ *Vulvaria Tab. hiſt.* 8121. ſtinckende Melte, Schaam-Kraut, an denen Mauren alter Stadtgräben. *ann.*

Chenopodium anguſtifolium laciniatum minus T. ſive Atriplex anguſtifolia laciniata minor, *IB.* 2. 972. ſchmahl blättrige Miſtmelte, an allen Wegen, und an denen Miſtſtätten. *ann.*

Chenopodium folio laciniato, coma virescente T. *Ic. Tab. hiſt.* 2. 812. wilde Melte, *Arroche ſauvage*, an Gräblein, in Niederhaußbergen, und zu Schiltigheim in dem Ried. *ann.*

Chenopodium folio laciniato, coma purpuraſcente T. *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 810. wilde Melde, mit rothen Gipfel, an feuchten Waſſer-Gräben, *ann.*

Chenopodium Pes anſerinus 1. *Tab. hiſt.* 812. T. ſive Atriplex dicta Pes anſerinus *IB.* 2. 975. *Pale Oye*, breite wilde Melde, mit Gänſe-Fuß Blättern, Schweintodt, faſt aller Orten, in Gräben und Zäunen, wie auch an denen Mauren, *ann.*

Chenopodium Pes anſerinus 11. *Tab. hiſt.* 812. & T. ſive Atriplex dicta Pes anſerinus

alter sive ramosus 1B. breite Wald-Melte, mit spitzigen Gänse-Fuß Blättern. ibid. *ann.*

Chenopodium folio sinuato candicante T. sive Atriplex sylvestris *Tab. hist.* 810. & *1B.* 2972. wilde Melte, mit weiß glänzenden Blättern, bey denen Miststätten, und auf denen Gartners-Feldern. *ann.*

Chenopodium Betæ folio T. sive Blitum erectius vel III. Tragi *1B.* 2. 967. est *Blitum polyspermum*, Fisch-Melte, *Ic. Tab. hist. pag.* 1219. auf denen Aeckern, gegen der Contrescarpe, vor dem weisen Thurn, und Cronenburger-Thor. *ann.*

Chenopodium folio oblongo integro Dillen. seu Spuria Atriplex folio oblongo angusto VolcKamer. Flor. Norimb. pag. 53. Melte mit schmahlen langen gantzen Blättern, zu Schiltigheim, an denen Aeckern, und in denen Kraut-Gärten. *ann.*

Chenopodium Opuli folio Vaill. Tab. VII. fig. 1. wilde Melde, mit Schwelgen Blätteren, an denen Mauren der Stück Magazin, gegen der Citadell. *ann.*

Chenopodium stramonii folio, *Vaill. Tab. VII. spicatum & racemosum, coma purpurascente*, wilde Melde, mit Stechäpfel Blättern, und langen zugeschnütztem Strauß, zu Jükirch in dem engen Weg, gegen dem Wasser, und in denen Zäunen, unterhalb dem Wickhäusel. *ann.*

Chondrilla sonchifolio, flore luteo pallescente sive *Sonchus sylvaticus* 4. *Tob. hist. Ic.* 11.

501. est *Lactuca sylvestris murorum flore luteo* IB. 2. 1004. Wald Sonchen-Kraut, mit bleich gelben Blumen, in dem Ilkircher Wald, und zu Niederbrunn, an dem Bach, aus denen Mauren, zu Barr in denen Reben. *ann.*

Chondrilla sonchifolio flore flore purpurascente T. *semiflosculoso*, *semine papposo*, sive Sonchus purpureus Col. Part. 1. 244. est. *Lactuca sylvatica purpurea* IB. 2. 1005. Wald-Lattich, mit Sonchen-Kraut, mit purpur rothen Blumen, in bergichten Wälderen hinter Barr, *Condrille rouge per me in hort. transposit. læte provenit, perenn.*

Chrysanthemum folio minus secto glauco T. sive *Chrysanthemum segetum Lob. Ic.* 552. est *Chrysanthemum arvense*, *Tab. hist.* 2. 366. Acker Gold-Blum, auf denen Felderen bey Ilkirch, wie auch zu Oßwald unter der Frucht. *ann.*

Circæa lutetianorum T. sive *Ocimastrum vulgarium* IB. 2. 977. *foliis solani, flore bipetalo, radice repente alba, fructu pyriformi oblongo*, *Lobel. Ic. pag.* 266. & 412. *Circée* Wald-Kletten, in feuchten schattichten Büschen und Hecken, gegen Oßwald. *perenn.*

Circæa minima T. sive Circæa solanifolia alpina CBp. kleine Wald-Klette, auf dem Gebürg gegen Hochfeld, und Neuweiler, in dem Wald. *perenn.*

Cirsium arvense sonchifolio radice repente, flore purpurascente T. *composito*, *flosculoso odorato semine papposo*, *Chardon aux anes*, Haber oder Acker-Distel, *Ic. Tab. hist.* 1079. in Haber-Felderen,

deren, an denen Gräben und Landstrasen, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Idem flore albo T. suaveolente, Haber-Distel, mit weisen wohlriechenden Blumen, an der Landstrase gegen dem Wickhäusel, *perenn.*

Cirsium arvense sonchifolio, radice repente caule tuberoso T. *flosculis albis odoratis*, sive Carduus hæmorrhoidalis Paris. HRP. Haber-Distel mit knollichten Stengeln, in dem XV. Wört, in dem Gansauer-Wald, auf einer Insul, hinter des Försters Hof, *colligitur apud nos à Rhizotomis studiose lucri causa, ad compescendos hæmorrhoidum dolores. perenn.*

Cirsium pratense asphodeli radice latifol. foliis tenuiter incisis T. sive *lactea aculeata* seu *tuberosa Tab. hist. Ic.* 4. 436. Stachel oder Flocken-Kraut, in der Ruprechtsau, neben denen Hecken in dem Ried, zwischen der Ill und dem Rhein, bey Schönau. *perenn.*

Cirsium pratense polycephalon vulgare T. sive Carduus palustris capitulo viscoso, foliis sinuosis per marginem rarioribus spinis cinctis, Wiesen Krampf, Ader-Kraut, mit vielen Blumen, auf feuchten Matten, bey dem Mauer-Hof, beym Rhein Ziegel-Ofen. *perenn.*

Cirsium asphodeli radice latifolium T. sive Carduus bulbosus Monspel. Lob. Ic. 10. breit blättrig Flocken-Kraut, auf feuchten Wiesen, hinter dem Ochsen-Wört. *perenn.*

Cirsium acaulon flore purpureo T. sive Chamæleon exiguus Tragi IB. 3. 62. est Carlina minor

minor purpureo flore *Clus. hist.* CLVI. kleine Eberswurtzel, mit rothen Blumen, aller Orten, auf dürren grasichten Orten. *perenn.*

Clematitis sylvestris latifolia T. seu *dentata IB.* 2. 125. *flore albo rosaceo, semine plumoso anguloso subnigro, Liene ou herbe aux Gueux*, Lienen oder Wald-Reben, mit zerkerften Blättern, Gänse-Mordt, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 1273. in denen Zäunen, in der Ruprechtsau, und auf dem Weg, gegen Illkirch. *perenn.*

Eadem foliis non incisis T. sive Clematitis latifolia integra *IB.* 2. 175. Wald-Reben, mit gantzen Blätteren, ibid. *perenn.*

Clinopodium arvense ocymifacie T. Acinos multis IB. flore purpureo monopetalo verticillato labiato, *semine oblongo Ic.* 4. *Tab. hist.* 739. & *in Rivin. Basilic sauvage*, Stein-Boley, auf denen Aeckeren zu Illkirch, und Ruprechtsau. *ann.*

Clinopodium origano simile elatius majore folio T. seu Origani facie *IB.* 3. *part.* 2. 250. groser Wirbel-Dost, *Ic. in Rivin.* & *Tab. hist. pag.* 736. an denen Hecken, bey der Carthaus. *perenn.*

Clymenum Parisiense cœruleoflore T. *papilionaceo cœrulescente albo fructu siliquoso, semine orbiculari*, sive Cicercula sylvestris *Tab. hist. Ic.* 4. 885. est Lathyrus sylvaticus Rivin. Kichern mit Wicken-Blättern, auf der Kraft, auf feuchten grasichten Orten, oberhalb Blobsheim.

Cnicus pratensis acanthifolio, flore flavescente T. *flosculoso semine papposo*, sive Carduus pratensis Tragi, *Lob. Icon* 11, *IB.* 3. 42. Wiesen-

fen-Distel, mit gelblicht weisen Blumen, an der Breusch, vor dem weisen Thurn, zu Oßwald auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cnicus pratensis acanthi folio flore purpureo; T. humilior Wiesen-Distel, mit rother Blume, auf feuchten Matten, in der Ruprechtsau, und in dem Ostwinckel, *perenn.*

Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus T. *flore luteo flosculoso*, Cardebenedicten *Chardon benit*, *Ic. Tab. hist.* 1066. zu Schiltigheim, auf den Aeckern *ann.*

Conyza major vulgaris T. *floribus subluteis flosculosis hirsutis, semine papposo*; sive *Conyza major Matthiol. Baccharis quibusdam IB.* 2. 1051. *Ic. Tab. hist.* 243. *Herbe à punaises ou chasse puce*, grose Dürrwürtzel, auf denen Gräben alter Stadt-Mauren, an der Mauer beym Spital-Thor. *perenn.*

Conferva cynosbatos seu Spongiola Rosæ sylvestris. Dodon. Schlaf-Kuntzen, Hagenbutten-Schwämme, an denen wilden Rosen-Hecken.

Corallo Fungus flavus. Vaill. Tab. 8. fig. 4. sive Coralloides flava IB. 123. in apice dentata ramosa, gelber Corallenästiger Schwam.

Cucubalus Plin. T. seu *Alsine Baccifera* IB. 2. 175. *flore albo caryophyllæo, fructu molli ovato nigro* est Alsine repens majus *Clus. hist.* CLXXXIII. Hecken oder Busch Hüner-Darm, neben denen Aeckeren, gegen Lingelsheim, in denen Hecken, in dem Steinthal häufig. *perenn.*

Cuscuta major T. *flore monopetalo campaniformi ex rubro pallescente, fructu subrotundo angulato*

sive

sive *Cuscuta vel Cassuta IB. 3. 166. Cassitha Tabern. hist.* 1102. Seiden oder groß Filtz-Kraut, *Cuscute*, an grasichten Orten, an denen Stauden-Gewächsen, in der Ruprechtsau zu Oßwald. *ann.*

Cuscuta minor T. sive Epithymum *Tab. hist.* 743. *Epithim*, kleine Flachs-Seide, auf dem Glacis, vor dem Steinstrasser und Weisenthurn Thor, auf denen Aeckeren, an dem Flachs. *ann.*

Daucus annuus minor floribus rubentibus, rosaceis umbellatis, T. Anthriscus quorundam semine aspero hispido *IB. 3. part. 2. 83.* Acker-Kletten, mit rothen Blumen, auf brachliegenden Aeckern zu Illkirch und Oßwald, an den Zäunen, gegen dem Wickhäusel. *ann.*

Daucus annuus minor floribus albis T. sive Anthriscus quorundam semine aspero hispido umbellis albicantibus *IB. 3. part. 2. 83.* Acker Kletten, mit weisen Blumen, auf dem Glacis, der Citadell, auf denen Ackern, gegen Haußbergen. *ann.*

Dens leonis foliis hirsutis & asperis caule aphyllo T. sive Hieracium caule aphyllo hirsutum, *IB. 2. 5037.* Löwen-Zahn, mit haarichten Blättern, auf brachliegenden Aeckern, an verschiedenen Orten hinter dem Rhein Zoll *perenn.*

Dens leonis foliis canescentibus villosis T. sive Hieracium montanum angustifolium foliis cichoraceis incanis lanuginosis quod Hieracium Hedypnoidis folio, *Clus. hist. CLXII* an Sonnenreichen bergichten Orten, zu Oberbronn *perenn.*

Digitalis lutea magno flore T. *flore monopeta-*

lo

lo anomalo, fructu acuminato, seu Digitalis lutea flore majore folio latiore, *IB.* 3. 813. est Digitalis lutea *Tab. hist.* 244. grose gelbe Finger-Hütlein, auf dem obersten Gebürg, Halgenstein, bey Blinschweyler, *Digitale jaune perenn.*

Digitalis purpurea, T. & *Ioh. B.* 2. 812. *folio aspero*, grose Fingerhütlein, *Ic. Rivin. Digitale rouge*, auf dem Gebürg, St. Ottiliæ per me auf dem Haulenberg. *perenn.*

Digitalis florę magno candido. T. & *IB.* 2. 803. hinter Blinschweyler, 3. Viertel Stund häufig, *per me* auf dem Haulenberg. *perenn.*

Digitalis major lutea vel pallida, parvo flore T. seu Digitalis flore subluteo angustiore folio *IB.* 2. 814. gelbe kleine Fingerhüttlein, auf dem Hochgebürg zu Rappolsweyler, oberhalb Dusenbach, *perenn.*

Dipsacus sativus T. *flore flosculoso semine striato* T. & *IB.* 3. 75. sive Carduus fullonum Lob. Ic. 17. zahme Karten oder Weber-Distel, bey Wörth.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major T. Dipsacus sylvestris seu Labrum Veneris, *IB.* 3. 74. *flosculis flosculosis rubris*, wilde Karten-Distel, mit rothlichten Blumen, *Chardon á foulon á fleure rouge Ic. Tab. hist.* 2. *pag.* 1070. an denen Landstrassen aller Orten, *perenn.*

Dipsacus folio laciniato T. & *IB.* 3. 75. *vel secundus Tab. hist. Ic.* 3. *pag.* 1071. *flosculis albis flosculosis*, Karten-Distel, mit weisen Blumen, und eingeschnittenen Blättern, am Weg, vor der ersten

sten Rhein-Bruck, hinter Schiltigheim am Wasser. *perenn.*

Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel Virga pastoris minor CBp. est Scabiosa angustifolia flore subcœruleo HEyst. Kleine wilde Karten-Distel, *petite verge á berger*, Ic. 3. *Tab. hist.* 1071. an dem Weg, lincker Hand am Garten, bey der Aubruck häufig, wie auch zu Höhnheim *perenn.*

Elichrysum seu Stœchas citrina latifolia T. *flore flosculoso semine papposo*, sive Stœchas citrina latiore folio *IB.* 3. 153. seu Amaranthus luteus *Tab. hist.* 3. 778. Rhein-Blumen, Immelschön, mit Schwefel gelben Blumen, und breiten Blättern, bey Schweighausen, gleich vor dem Dorf häufig, wie auch zu Bischweyler, auf der Hagenauer Hardt, bey Mergenthal. *perenn.*

Elichrysum seu Stœchas citrina angustifolia T. sive Stœchas citrina tenuifolia Narbonensis *IB.* 3. 154. Rhein oder Motten-Blumen, von schwefelgelber Farbe, und schmahlen Blättern ibid *perenn.*

Elichrysum germanicum calice ex aureo rutilante T. Motten-Blumen, mit goldgelben Blumen, zu Mertzweyler häufig. *perenn.*

Elichrysum spicatum T. sive Gnaphalium rectum *IB.* 3. 160. *folio angusto oblongo, floribus flosculosis in caule positis*, groß schmahl blättrig Ruhr-Kraut, auf sandigen Orten, an der Breusch, gegen Eckbolsheim, in Ganßauer Wald *perenn.*

Equisetum fœtidum majus sub aqua repens

CBp. & *IB.* 3. 731. *valde fragile, ſubcinerei coloris,* ſtinckender Pferde-Schwantz, in der Ruprechtsau, in ſchleimichten Waſſer-Gruben *perenn.*

Equiſetum fœtidum tenuioribus ramulis per extremitatem ſtellatis Dillen. Catal. plantar, Giſſ. zart ſtinckend Pferd-Schwantz, in der Ruprechtsau. *ibid.*

Eryſimum vulgare T. ſive Eryſimum Tragi *IB.* 2. 863. *floſculis luteis cruciformibus, ſiliqua tenui longa*, quod Eryſimum *Irio* 5. *Tab. hiſt.* 840. *Velar ou Tortelle*, Weg-Senf, aller Orten, an denen Wegen, neben den Mauren, auf dem Graben alter Stadt Mauer. *ann.*

Euphraſia officinarum T. ſive Euphraſia *IB.* 3. 432. Augen-Troſt / *flore monopetalo anomalo bilabiato, Ic. in Rivin. & Tab. hiſt.* 1246. aller Orten auf denen Wieſen. *ann.*

Euphraſia minus ramoſa, flore ex cœruleo purpuraſcente HEyſt. auf denen Wieſen bey Oßwald / bey dem Rhein Ziegel-Ofen häufig, eſt Euphraſia Rivin. kleiner Augen-Troſt, mit blaulichten Blumen. *ann.*

Euphraſia ramoſa pratenſis flore albo, *monopetalo perſonato amplo flore albo, fructu oblongo*, HEyſt. Augen-Troſt, mit groſen weiſen Blumen, auf der Lingelsheimer Nachtweid häufig, auf der Wieſe, zwiſchen allen Lüften, und dem Mauerhof. *ann.*

Faba flore candido lituris nigris conſpicuo. T. *fructu ſiliquoſo*, ſive Faba major recentiorum *Lob. Ic.* 57. eſt Faba, *Tab. hiſt.* 879. Welſche oder

Sau-

San-Bohnen, auf denen Feldern aller Orten, *Grande Feve. ann.*

Fagopyrum vulgare erectum T. *folio hederaceo, floribus purpurascentibus apetalis, semine triangulari*, Heyde-Korn, in denen Feldern zu Drusenheim, *Ic. Tab. hist.* 646. *Blé ann.*

Fagopyrum vulgare scandens T. sive Helxine semine triangulo lB. 2. 157. quod *Volubilis Tab. hist.* 1264. *Blénoir nigra* Buch- oder schwartze Winde, mit einen zeckigten schwartzen Saamen, auf denen Aeckern, und neben dem Weg Oßwald zu. *ann.*

Fagopyrum scandens altissimum dumetorum, *flore apetalo semine triangulari*, *Rupp. Flor. Jen.* steigendes Heide-Korn, auf der Elsau, in denen Gärtners-Zäunen, auch bey den Steinstraser Thor, auf der Contrescarpe *ann.*

Fœniculum vulgare germanicum T. *foliis capillaceis, floribus rosaceis luteis, semine gibbo & striato*, Fenchel *Fœnouil Ic.* 2. *Tab. hist.* 147. auf denen Gartners-Felderen, und an den Reinen, der Rieben zu Ergersheim, und Wolcksheim. *perenn.*

Fœniculum sylvestre humilius Peucedani foliis T. sive Caucalis Anglica, *Tab. hist. Ic.* 97. *flosculis albis rosaceis radice alba* Stein-Fenchel, bey Oßwald auf der Nachtweyd *perenn.*

Fucus fluviatilis aculeatus undulatus T. est *Fluvialis Pisana IB.* 3. 779. foliis denticulatis, in der Ill gegen Oßwald, nahe am Ufer, *perenn.*

Fucus tubulosus intestinorum forma T. ausgehölter Meer-Kohl. in stillstehenden faulen Was-

ser-Gräben, auf dem Weg in der Ruprechtsau.

Fungus crassus in metam surrectus T. *superne cinerei, in ferne ex flavo pallescentis coloris* est XX. gen. nox. fung. Clus. hist. CCLXXXIV. in dem Brumbter Wald.

Fungus truncis humi jacentibus innatus, pluribus ex pediculo prodeuntibus CBp. seu Amanita fasciculosa, ex luteo aut fusco rufa, radicibus arborum innascens Dillen. in dem Hagenauer Forst, an alten faulen abgehauenen Stöcken der Bäume.

Fungus albus acris CBp. & Vaill. est Fungus Piperatus albus lacteo succo turgens IB. 3. 825. *vesca pileolo candido*, weise Pfifferling, hin und wieder in Wäldern, an alten Buchen.

Fungus angulosus & veluti in lacinias sectus CBp. est *Fungus luteus pallidus, Chanterelle dictus* se contorquens esculentus IB. 3. 832. est Fungus nemorum Lob. Ic. 273. Rötling oder Augst-Schwämme, *Ic. Vaill. Tab. XI. fig.* 14. & 15. in dem Brumbter Wald, an alten abgehauenen Stämmen der Bäume.

Galeopsis procerior caliculis aculeatis, flore purpurascente T. *monopetalo labiato, semine oblongo*, sive Cannabis sylvestris quorundam Lob. Ic. pag. 527. est Cannabis spuria Rivin. stachelichte Acker-Nessel, mit rothen Blumen, an der Landstrasse, in denen Gräben und Hecken, gegen Eckbolsheim, in feuchten Gräben am Weg nach Schiltigheim, *Tab. hist. Ic.* 2. *pag.* 936. *ann.*

Galeopsis procerior caliculis aculeatis flore

flave-

flaveſcente T. ſive Cannabis ſylveſtris ſpuria tertia Lob. Ic. 528. ſtachelichte Acker-Neſſel, mit bleich gelben Blumen, bey der Carthauß, an denen Zäunen, auf denen Aeckeren, gegen Schiltigheim. *ann.*

Galeopſis procerior, caliculis aculeatis floribus candidis T. Acker-Neſſel, mit gantz weiſen Blumen, oberhalb der grünen Wart, neben der Landſtraß. *ann.*

Galeopſis procerior fœtida ſpicata T. ſive Galeopſis vel Urtica iners magna fœtidiſſima IB. app. 853. eſt Lamium maximum ſylvaticum fœtidum, flore monopetalo labiato purpuraſcente punctato, ſtinckende Wald-Neſſel, in denen Hecken und Höltzern aller Orten, eſt Urtica V. Tab. hiſt. 921. & in Rivin. ſub nomine Stachys ſylvatica. *perenn.*

Galeopſis patula ſegetum, flore purpuraſcente, T. ſive Ladanum ſegetum, flore rubro quorundam, IB. 855. eſt Alyſſum Galeni flore purpureo *Tab. hiſt. Ic. 2. pag.* 928. purpurrothe Alyſſen, oder Kornwuth, auf denen Aeckeren, hin und wieder, Ic. Rivin. ſub nomine Ladanum ſegetum folio latiore *ann.*

Eadem flore albo T. weiſe Korn Wuth, auf dem Gebürg, gegen Urbisthal, *anno præterito ſub oculos cecidit*, zu Briſchwickersheim, auf brachlie genden Aeckern.

Galeopſis paluſtris betonicæ folio, flore variegato T. ſive Galeopſis anguſtifolia fœtida IB. 3. app. 854. eſt Clymenum minus Dalech.

Lugd. 1357. in HEyst est *Lysimachia Galericulata.*

Gentiana major lutea T. seu vulgaris major Ellebori albi folio *IB.* 3. 520. *flore monopetalo campaniformi*, groß Entzian, Bitterwurtzel, wächst häufig auf dem Bölchen, in dem Obern-Elsaß, auf welchem sich ein unergründlicher Teich befindet, so mit Felsen umgeben, und Ao. 1740. bey der allgemeinen Wasserfluth, oberhalb an zweyen Orten gesprungen, und viele Dörfer verwüstet hat, und so er unterhalb Luft bekommen, geglaubet wurde, daß dadurch gantz Elsas hätte zu grund gehen müssen. *perenn.*

Gentiana cruciata T. sive Gentiana minor, seu Vulgi cruciata IB. 3. 522. est Gentiana 111. Clus. hist. 313. *floribus purpureis monopetalis campaniformibus erectis & cruciatim dispositis, radice longa alba, fructu ovato semine plano marginato,* Gentiane croisée Modelgeer, Creutzwurtz, zu Oßwald Lingelsheim und Ganßauer Wald häufig, *ic. Tab. hist. pag.* 1104 *perenn.*

Gentiana major purpurea T. seu magno flore purpureo IB. 3. 521. est Gentiana major purpureo flore Clus. hist. 312. auf dem Gebürg bey Oberbronn und in dem Urbisthal. *perenn.*

Gentiana angustifolia autumnalis major T. sive Pneumonanthe, *Tab. hist.* 1176. Wasser Lungen-Blum, Lungen-Entzian, bey dem Krümmeri, und auf denen Ganßauer Matten häufig. *perenn.*

Gentiana autumnalis ramosa T. sive Gentiana

tiana annua *Clus.* 1. *flore ex cœruleo purpureo IB.* 3. 526. auf der Gansau vor dem Wald zu Illkirch, in dem Wald häufig. *ann.*

Gramen ſpicatum ſpica cylindracea tenuiſſima longiore T. ſive Gramen cum cauda muris purpuraſcente IB. 2. 473. eſt Gramen Alopecuroides minus alterum Lob. Ic. 9. Fuchs-Schwantz Graß, auf der Contreſcarpe, vor dem Weiſen-Thurn, neben denen Aeckern, faſt aller Orten, vor dem Steinſtraſſer Thor. *perenn.*

Gramen ſpicatum ſpica cylindracea craſſiori T. ſive Gramen Typhinum 11. *Tab. hiſt. pag.* 531. Lieſch-Graß, hinter Barr auf denen Matten *perenn.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula ampliore ex viridi nigricante T. ſive Gramen Harundinaceum montanum Tab. hiſt. pag. 541. vel enode *IB.* 2. 481. Berg Ried-Graß, auf Berg-Waldungen, hinter Waſſenburg, hinter Heilgenſtein, in dem Hagenauer Forſt. *perenn.*

Gramen montanum panicula ſpadicea delicatiore, *IB.* 2. 476. auf dem Niedecker Gebürg *perenn.*

Gramen montanum panicula miliacea ſparſa *CB. prodr*, 17. & *IB.* 2. 462. Berg Graß, mit einem Hirſe-Strauß, auf dem Gebürg gegen Niedeck.

Hieracium chondrillæ folio glabro radice ſuccisæ majus T. *flore ſemifloſculoſo ſemine pappoſo*

sive Hieracium minus, præmorsa radice Fuchs. *IB.* 2. 1031. & *Lob. Ic.* 237. *Ic. Tab. hist.* 4. 491. Habicht-Kraut, mit Chondrillen Blättern, und Abbiß Wurtzel, an denen Gräben, der Landstraß nach Höhnheim, bey der ersten Bleich am Wasser-Zoll, auch auf denen Wiesen, *perenn.*

Hieracium chondrillæ folio glabrum T. sive Aphacoides *Tab. hist. Ic.* 5. 492. Habich-Kraut, mit Pfaffenröhrleins-Kraut, ähnlichen Blättern auf der Contrescarpe, zwischen dem weisen und Cronenburger-Thor, auf denen Wiesen hin und wieder. *perenn.*

Hieracium chondrillæfolio hirsutum T. sive Hieracium folio & facie Chondrillæ Lobel. *Ic.* 239. & *Tab. hist.* 11. 494. an denen Wegen, und an denen Hecken, zu Eschau und Illkirch. *perenn.*

Hieracium foliis coronopi T. *atro virentibus seu nigrum Tab. hist. Ic.* 3. 491. Schwartz Habich-Kraut, zu Oßwald, Illkirch, und Eckbolsheimer Wald, auf den Glacis, um die Stadt. *perenn.*

Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum T. sive Hieracium majus latifolium Pannonicum 2. *Clus. hist.* CXL. *IB.* 2. 1027. Habich Kraut, mit breiten glatten Blättern, bey Keysersberg, in denen Hecken. *perenn.*

Hieracium fruticosum hirsutum angustifolium majus T. sive *Hieracium rectum rigidum quibusdam Subaudum IB.* 2. 1030. Berg Habich-Kraut,

Kraut, mit schmahlen harten Blättern, auf dem Berglein, bey Mittelhaußbergen, *perenn.*

Hieracium pilosellæ folio erectum majus T. sive *Pilosella minori flore hirsutior & elatior non repens IB.* 2. 1040. est Pilosella major altera *Ic. Tab. hist.* 3. 507. grose Mauß-Oehrlein, oder groß aufrecht stehendes Habich-Kraut, mit haarichten Mauß-Oehrlein Blättern, auf den Wiesen bey Gravenstaden, auf dem Glacis, vor dem Fischer-Thor, an denen Mauren. *perenn.*

Hieracium pilosellæ folio erectum minus T. sive Pilosella major. *Tab. hist. Ic.* 2. 507. Habich-Kraut, mit langen spitzigen Blätteren, und bleich gelben kleinen Blumen, in denen Waldungen, hinter Heilgenstein. *perenn.*

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro T. sive Hyoseris angustifolia *Tab. hist. Ic.* 2. 490. klein Fercklein-Kraut, auf der Metzgerau, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Hieracium minus dentis leonis folio sub aspero T. sive Hypocheris porcellia *Tab. hist.* 489. Ferckel-Kraut, *Salade de porco*, in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus T. sive *Hieracium macrocaulon junceum primum Dodon. IB.* 2. 1031. est Hieracium longius radicatum *Tab. hist. Ic.* 7. *pag.* 492. *caule fistuloso*, Habich-Kraut, mit Pfaffen Röhrlein Blättern, und grosen Wurtzeln, auf den Wiesen bey Oßwald, und dem Canal, an den Reben bey Barr. *perenn.*

Hieracium murorum folio minus piloso non

maculato T. HAP. *folio angustiore indissecto seu Pulmonaria gallica tenuifolia Tab. hist.* 505. Buch-Kohl, mit schmahlen Blättern, ohne Flecken, in dem Wald zu Ingweyler. *perenn.*

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum T. sive Pulmonaria Gallica fœmina *Tab. hist. Ic.* 2. *pag.* 504. Buch-Kohl, mit gefleckten Blättern, und auf denen alten Mauren. *ibid.*

Hieracium luteum hirsutum T. & IB. 2. 1024. an der Landstrase, vor dem Spithal-Thor, in der Ruprechtsau *perenn.*

Hordeum distichum, quod spica binos ordines habeat T. *flore apetalo, semine oblongo acuto* seu Hordeum distichum æstivum trimeste minus *Ic.* 2. *Tab. pag.* 621. Sommer-Gerste, Futter-Gerst, auf allen Feldern. *ann.*

Hordeum distichum spica nitida Zea seu Briza nuncupatum T. sive Briza monococcos Dod. *Lob. Ic.* 31. *Ic. Tab. hist.* 2. *pag.* 608. Einkorn zu Drusenheim und Weissenburg. *ann.*

Hordeum distichum Zea dicoccos dictum *Tab. hist. Ic.* 1. *pag.* 608. Spelz, ibid. *ann.*

Hordeum polystichum vernum T. sive Hordeum polystichum æstivum *Tab. hist. Ic.* 3. 621. Sommer-Gerste, mit vielen Reihen, *ann. ibid.*

Hordeum polystichum hybernum T. sive majus, *Tab. hist.* 1. *pag.* 621. Wintergerst.

Hottonia Bœrh. Ind. plant. alter 207. sive Millefolium aquaticum Viola aquatica dictum. IB. 1782. *floribus sub purpurascentibus rosaceis, foliis pennatis, caule erecto nudo,* Wasser-Violen, mit auf-

aufrechtstehendem Stengel, und purpurrothen Blumen, beym XV. Wört, in der Ruprechtau, in einem Graben. *perenn.*

Iacea pratensis nigra latifolia T. sive Iacea nigra vulgaris capitata & squamosa *IB.* 3. 27. *piloso folio non laciniato, flore flosculoso purpureo, semine papposo*, Flocken-Baum / *Iacée Ic. Tab. hist.* 1. 436.

Iacea nigra laciniata T. sive Iacea austriaca *VI. Clus. hist.* Flocken Blum, mit gekerften Blättern, auf denen Wiesen, auf der Contrescarpe, vor dem weisen Thurn. *perenn.*

Iacea cum squamis cilii instar pilosis T. & *IB.* 3. 28. sive Cyanus foliis imis ad basin pinnatis, superioribus integris ovato lanceolatis Haller. 691. ubi Icon egregia, auf denen Wiesen zu Eckbolsheim, zu Oßwald und Illkirch. *perenn.*

Iacea nemorensis quæ Serratula vulgo T. sive Serratula *IB.* 323. *foliis serratis ad radicem integris reliquis profunde incisis flore purpureo flosculoso*, Scharten-Kraut, auf denen Wiesen, beym Mauerhof, und in dem Illkircher Wald. *perenn.*

Eadem flore albo T. Scharten-Kraut, mit weisen Blumen, *rarius occurrit. perenn.*

Iacea nigra angustifolia vel Lithospermi arvensis foliis caule aspero T. Schwartze Flocken-Blum, mit schmahlen Blättern, und rauhen Stengel, auf dem Glacis, vor dem weisen Thurn und Cronenburger Thor, auf denen Wiesen, gegen Eckbolsheim. *perenn.*

Iacea

Iacea vulgaris laciniata flore purpureo T. sive Scabiosa major squamatis capitulis CBp. *Ic. Tab. hist.* 3. *pag.* 435. est Centaurium collinum Gesneri, flore purpureo *IB.* 3. 32. gemeine grose Flocken Blum, mit zackichten Blättern, auf denen Aeckern, bey Oßwald und Niederhaußbergheim, und andern heckichten Orten, *perenn.*

Iacea integrifolia humilis CBpr. 127. niedrig stehende Flocken-Blum, mit gantzen Blättern, bey den Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, *perenn.*

Iacobæa paluſtris altissima foliis serratis T. *floribus radiatis semine pappoſo*, sive Virga aurea anguſtifolia serrata, sive Consolida paluſtris, *Tab. hiſt* 946. vel Lingua avis Dalechamp. IB. 2. 1053 Wasser gulden Wund-Kraut, an dem Ufer der Ill, gegen Oßwald. *perenn.*

Iacobæa latifolia IB. 2. 1057. St. Jacobs-Blum, mit breiten Blättern, an denen Rändern Gebüsche und Wälder, zu Aaßweiler.

Iuncus acutus panicula sparsa T. sive Iuncus *foliaceus IB.* 2. 521. *Ionc* Kleine Weyher-Binse, mit flattrichten Strauß. *Ic. Tab. hiſt.* 3. *pag.* 566. an feuchten sumpfichten Orten, auf denen Wiesen zu Oßwald. *perenn.*

Iuncus acumine reflexo minor & trifidus T. seu Iuncus trifidus *IB.* 2. 521. Moß-Bintze, in der Ruprechtsau, in sumpfichten Orten, in dem Eckbolsheimer Wald, in wässerichten Gruben. *perenn.*

Iuncus paluſtris humilior erectus T. seu Holo-

Holoſtium Matthioli junceum *IB.* 2. 510 & *Lob. Ic.* 18. Krotten-Graß, auf wäſſerichten Wieſen, aller Orten, in der Ruprechtsau.

Iuncus foliis articulatis floribus umbellatis T. eſt Gramen aquaticum *Tab. hiſt. Ic.* 1. *pag.* 529. Waſſer Bintzen-Graß, auf wäſſerichten Matten, zu Oſtwald und Gravenſtaden. *perenn.*

Iuncus parvus cum pericarpiis rotundis IB. ſeu Gramen junceum III. *Tab. hiſt. Ic.* 3. 535. gar klein Bintzen-Graß, iu ſumpfichten Orten, unten an dem Glacis, vor den Metzger und Spithal-Thor. *perenn.*

Lactuca ſylveſtris odore viroſo T. *flore luteo ſemifloſculoſo, caule lacteſcente ſemine pappoſo Ic. Tab. hiſt. pag.* 807. Laitue ſauvage. wilder Lattich, auf der Contreſcarpe, vor dem Steinſtraſſer-Thor häufig, auf denen Gräben, alter Stadt-Mauren, *perenn.*

Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa T. ſive Endivia multis dicta, folio laciniato dorſo ſpinoſo *IB.* 2. 1003. & *in Matthiol. Epit.* 300. Leber-Diſtel, Gänſe-Zung, vor dem Fiſcher-Thor häufig, und auf denen Wällen, *ann.*

Lactuca montana latifolia laciniata, flore cœruleo T. ſive Sonchus cœruleus latifolius *IB.* 2. 1005. eſt Sonchus lævis IV. *Tab. hiſt. Ic.* 6. 500. Wald-Lattich, blauer Haſen-Kohl, *perenn.*

Lactuca perennis humilior flore cœruleo, T. ſive *Chondrilla carulea IB.* 2. 1019. & *Tab. hiſt. Ic.* 1. *pag.* 486. blau Chondrillen-Kraut, auf dem

Paß-

Paßberg, zu Buchsweyler, und auf denen Frucht-Aeckern daselbst, *perenn.*

Lapathum minimum T. *flore apetalo semine triangulari & Tab. hist. Ic.* 4. 824. seu Lapathum acutum minimum *IB.* 2. 985. kleine Grind-Wurtzel, mit zugespitzten Blättern, in denen Gräben, gegen dem Wickhäusel, auf feuchten Aeckern bey Illkirch. *plus petit patience perenn.*

Lapathum aquaticum folio cubitali T. sive Lapathum maximum aquaticum sive Hydrolapathum, *IB.* 2. 986. est Lapathum paluſtre *Tab. hist. Ic.* 5. *pag.* 824. Wasser-Ampfer, Butterwecken-Kraut, aut Herba vera & genuina Britannica veterum Munting. Icon 1. pag. 695. *plus grande Patience aquatique*, in dem Stadt-Gräben, vor dem Metzger-Thor. *perenn.*

Lapathum aquaticum minus T. sive Hydrolapathum minus *Tab. hist. Ic.* 6. 824. est Lapathum vulgare minus Munt. hlst. pag. 690. klein Wasser Grind-Wurtzel, aller Orten, in feuchten Gräblein, und andern wässerichten Orten. *Petite Patience aquatique perenn.*

Lappa major Arctium Dioscoridis T. sive *Persona*ta, *Lappa maſor aut Bardana IB.* 3. 570. & *Lob. Ic.* 588. *Ic.* 1. *Tab. hist. p.* 1157. *flore compoſito floſculoſo purpureo, folio latiore integro, capitulis tomentoſis ſemine pappoſo; est Bardana officinar. Bardane ou Grand Glouteron*, grose Kletten, mit wollichten Köpfen, und rothen Blumen. *perenn.*

Lappa capitulis glabris Halleri *pag.* 675. sive *Perſonata ſeu Lappa major Matthiol. Epit. pag.* 887.

& IB.

& *IB.* 3. 570. groſe Kletten, mit glatten zackichten Köpfen, bey Höhnheim. *perenn.*

Lappa majore montana capitulis minoribus rotundioribus & magis tomentoſis T. ſive Perſonata altera cum capitulis villoſis *IB.* 3. 571. Berg-Kletten, mit röthlichten Köpfen, auf den Waſſenburger Gebürg *perenn.*

Laſerpitium foliis latioribus lobatis Moris umbell. 29. & T. *floſculis albis roſaceis, ſemine ſtriato*, groſe weiſe Hirſch-Wurtzel, auf dem Gebürg hinter Hochfelden, ingleichen zu Hochfeld, bey der Meickerey, *Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 312. *perenn.*

Lavendula anguſtifolia T. *flore monopetalo labiato cæruleo*, Lavendul, mit blauen Blumen, aller Orten in Gärten, *Ic. Tab. hiſt* 3. 755. *perenn.*

Eadem flore albo *IB.* 3181. Lavendel mit weiſen Blumen.

Lavandula latifolia T. ſive Pſeudonardus quæ vulgo Spica *IB.* 3. *part.* 2. 281. Spick *Aſpic ou Nard commune perenn.* ibid.

Lepidium latifolium T. ſive Lepidium Pauli *IB.* 2. 940. *floſculis albis cruciformibus, foliis oblongis, guſtus acerrimi, radice alba repente. ſemine oblongo*, Pfeffer / oder Fleiſch-Kraut, *Ic. Tab. hiſt.* 847. in Gärten. *perenn.*

Lens major T. & IB. 2. 317. *flore papilionaceo fructu brevi ſiliquoſo, ſemine orbiculari convexo*, groſe Linſen, Pfenning Linſen, auf denen Gartners und Bauren-Aeckern, Lentille *Ic. Tab. hiſt.* 858. & *in Rivin. ann.*

Lens vulgaris ſemine ſubrufo T. ſive Lens

IB. 2. 317. kleine gemeine braune Koch-Linsen. ibid. *ann.*

Lens vulgaris semine ex luteo pallido T. gemeine weise Koch-Linsen. *ibid.*

Lentibularia vulgaris HRP. & Rivin sive Millefolium aquaticum flore galericulato luteo, *Lobel*, 791. & *IB.* 3. 783. *monopetalo ano. malo*. Wasser-Fenchel, mit gelben Blumen, vor dem Fischer-Thor, in denen Wasser-Gruben, rechter Hand, ingleichen zwischen dem Canal, und dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Ligustrum T. & *IB.* 1. 528. *flore albo monopetalo infundibuliformi odorato fructu globoso nigro semine gibbo*, Hartriegel Bein-Holtz, *Fræne Ic. Tab. hist.* 1454. *perenn.*

Ligustrum foliis é luteo variegatis HAP. sive *Ligustrum variegatum Munting. hist.* 258. *Fræne panachée*, Hart-Riegel, mit gelb gefleckten Blättern / in dem Ruprechtsauer und Illkircher Wald. *perenn.*

Lingua cervina officinarum T. Phyllitis seu Lingua cervina vulgi, *IB.* 3. 756. Phyllitis vulgaris *Clus. hist. floribus in aversa parte provenientibus muscosis luteis Langue de cerf.* Hirsch-Zung, *Ic. Tab. hist.* 1192. hinter Barr, in denen schattichten Bergen. *perenn.*

Lotus pentaphyllos minor glabra, foliis longioribus & angustioribus H. Edinb. & Vaill. est Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis CBp. kleiner Schoten Klee, vor dem Fischer-Thor, nahe an dem Ziegelofen rarioris est proventus.

Lychnis

Lentibularia Rivin.

J. Striedbeck. sculp

Lychnis ſylveſtris quæ Behen album vulgo foliis anguſtioribus T. *flore caryopyllæo* auf den Wieſen beym Mauerhof, an den Glacis, der Citadell gegen dem Rhein-Zoll häufig. *perenn.*

Lychnis annua minima, flore carneo, lineis, purpureis diſtincto T. ſive Betonicæ vel Tunicæ minimæ ſimilis planta *IB.* 338. in dem Oſtwinckel, auf denen Aeckern, gegen der hohen Warth. *ann.*

Lycopus paluſtris glaber T. *flore monopetalo labiato, ſemine ſubrotundo,* ſive Marrubium aquaticum quorundam *IB.* 3. 318. *foliis hirſutis laciniatis, floribus monopetalis campaniformibus albis.* weiſer Waſſer Andorn, an denen Waſſer Gräben, gegen der grünen Warth. *Ic. in Rivin. ſub nomin. Pſeudo marrubii perenn.*

Lycopus paluſtris foliis in profundas, lacinias inciſis T. zu Oßwald, in einem Graben bey der letzten Brucke *perenn.*

Lycopus paluſtris villoſus T. ſive *Marrubium paluſtre hirſutum* CBp. in der Ruprechtsau, bey der erſten Bleich, bey der Walckmühl, nahe an der Brück *perenn.*

Lyſimachia lutea major quæ Dioſcoridis T. ſive Lyſimachia lutea *IB.* 2. 901. *flore monopetalo rotato, fructu globoſo,* gelber groſer Weydrich, *Perce boſſe. ou Lyſimachie,* zu Oßwald in denen Hecken. *perenn.*

Eadem foliis ternis T. quæ Lyſimachia lutea HE. in der Ruprechtsau, an den Waſſer, an Gräben *perenn.*

Eadem foliis 4ternis & quinis, *non sunt diversæ species, sed solummodo variationes, quod bene annotavit Bœrhave.*

Marrubiastrum vulgare T. sive Stœchas arvensis minima Rivin. *caule quadrangulo subhirsuto, foliis serratis, floribus subcœruleis verticillatis monopetalis labiatis, semine subrotundo*, auf denen Aeckern unter der Gerste, *ann.*

Marrubium album vulgare T. & *IB.* 3. 316. *floribus monopetalis verticillatis labiatis, folio incano rugoso, semine oblongo.* weiser Andorn, *Marrube blanc Tab. hist.* 925. & *in Rivin.* auf dem Schießrein, bey denen Gärten, an dem Weg gegen dem Rhein zu. *perenn.*

Marrubium Cardiaca dictum T. *flore purpureo labiato*, Hertzgespan, *Agripaume* & *in Rivin Ic.* 1. *Tab. hist.* 535. an denen Zäunen, in der Ruprechtsau, und andern Orten mehr. *perenn.*

Mays granis aureis T. sive Triticum Indicum, *IB.* 2. 453. *floribus apetalis, semine subrotundo. plures ejus sunt species uti videre est in Instit RH. Tournef. pag.* 531. Türckisch oder Welschkorn, *Blé de Tourquie*, auf denen Felderen *ann.*

Melilotus capsulis reni similibus, incapitulum congestis T. *flore papilion.* seu Trifolium pratense luteum Mas, flore minore, semine multo *IB.* 3. 280. est Trifolium arvense, *Tab. hist. Ic.* 3. 908. vel Melilotus minima Rivin. gelber Wiesen oder Feld-Klee, auf dürren Wiesen und Aeckern gegen Oßwald. *ann.*

Mentha aquatica T. *flore monopetalo labiato,*

sive

p. 245.

Tab. X

Pulegium serpens

J. Striedbeck. sculp.

. *pag.* 531. Türckisch oder Welschkorn/
de Tourquie, auf denen Felderen *ann.*

Melilotus capsulis reni similibus, in capitulum congestis T. *flore papilion.* seu Trifolium pratense luteum Mas, flore minore, semine multo *IB.* 3. 280. est Trifolium arvense, *Tab. hist. Ic.* 3. 908. vel Melilotus minima Rivin. gelber Wiesen oder Feld-Klee, auf dürren Wiesen und Aeckern gegen Oßwald. *ann.*

Mentha aquatica T. *flore monopetalo labiato,*

five

ve Pulegium *IB.* 3. *part.* 2. 256. Poley *Pulior.*
c. 3. *Tab. hiſt.* 730. & *in Rivin.* in ſumpfichten
nd feuchten Orten, in der Ruprechtsau und
or der grünen Wart. *perenn.*

Eadem flore albo T. Poley, mit weiſen Blu-
men, an der Landſtraſſe, gegen allen Lüften.
perenn.

Mentha aquatica ſive Pulegium vulgare hu-
milifuſum non repens, cauliculis longiſſime ſe
extendentibus ruberrimis, floribus in globum
congeſtis, foliis minoribus. nobis, auf denen
Sandbäncken, wo die Breuſch in die Ill fält.
perenn. vid. Tab. noſtr. X.

Mentha arvenſis verticillata hirſuta T. *IB.* 3.
part. 2. 217. *floribus monopetalis labiatis, hirſutis ſul-*
cis Ic. Tab. hiſt. 1. 737. & *in Rivin. Calament ſau-*
vage, Acker-Müntze, auf Aeckeren, bey Hauß-
bergen, auf der Lingelsheimer Nachtweyd, *perenn.*

Mentha rotundifolia paluſtris ſeu Aquatica
major T. Mentha aquatica ſive Siſymbrium *IB.*
3. *part.* 2. 233. eſt Mentha rubra officinarum,
flore monopetalo labiato, pallide rubeſcente,
rothe Bach oder Fiſch-Müntze, in allen Stadt-
Gräben, *Ic. Tab.* 3. *hiſt.* 736 & *in Rivin. perenn.*

Mentha ſylveſtris, longioribus, nigrioribus
& minus incanis foliis T. ſive Mentha ſpicata
folio longiore acuto glabro nigriori, *IB.* 3.
part. 2. 220. Schwartze Roß-Müntzen / in dem
Weg gegen Gutleuthen, nach dem Schiltigheimer
Feld, wo man gemeiniglich die Wecken verkauft. *perenn.*

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo breviquefolio CBp. ſive Millefolium & Fœniculum aquaticum *Tab. hiſt. Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 186. in ſumpfichten und ſtillſtehenden Teichen.

Nicotiana major latifolia T. *flore monopetalo infundibuliformi purpuraſcente, folio molli acuminato integro, fructu oblongo* Tabac, *Herbe de la Reine Ic. Tab. hiſt.* 971. auf denen Felderen. *ann.*

Nigella arvenſis cornuta T. ſive Melanthium ſylveſtre vel arvenſe IB. 3. 209. *flore ſub cæruleo roſaceo, foliis fœniculaceis, fructu oblongo*, St. Catharinen Blumen, wild Narden-Kraut, *Ic.* 4. *Tab. hiſt.* 192. auf Saam-Feldern, nach vollendter Erndte, zu Oßwald. *ann.*

Onagra latifolia T. ſive Lyſimachia lutea corniculata *flore monopetalo roſaceo, fructu cylindraceo*, gelber gehörneter Weydrich, an dem Weg gegen dem Rhein-Zoll, oberhalb der Rheinbruck, in der Ruprechtsau/ gegen Auenheim am Rhein. *perenn.*

Onobrychis foliis viciæ fructu echinato major T. *flore eleganter rubente papilionaceo, fructu ſiliquoſo*, Hahnen-Kamm, mit röthlichten Blumen, *Sain foin ou Espavette*, eſt Polygala Geſneri, *IB.* 2. 335. *Ic. in Rivin.* in denen Klammen, bey Niederhaußbergen, und Briſchwickersheim häufig, *perenn.*

Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, cauleſcens & ramoſa Schol. Bot. auf denen Berglein, zu Mundelsheim. *perenn.*

Oreoſelinum apii folio majus T. *flore roſaceo*

ſem.

umbellato, semine ovato striato, [sive Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra *IB.* 3. *part.* 2. 165. Schwartze Hirtzwursel, Berg-Peterlein, *Ic.* 3. *Tab. hist. pag.* 313. est *Cervaria Rivin. & Garidel hist. plant. Tab.* 116. auf dürren Wiesen, oberhalb Bennfeld häufig. *perenn.*

Oreoselinum apii folio minus T. sive Apium montanum Dalechampii *IB.* 3. *part.* 2. 103. *Ic.* 1. *Tab. hist.* 276. *Persil de Montaigne*, Berg-Peterlein, Berg-Eppich, auf Bergmatten, auf dem Halgensteiner Hochgebürg.

Oreoselinum pratense Cicutæ folio T. sive Umbellifera alsatica magna, umbella parva sublutea, *IB.* 3 *part.* 2. 106. gelber Vogels-Nest, auf feuchten Matten, bey Ehrstein und Weisenburg *perenn.*

Origanum sylvestre T. sive Origanum vulgare spontaneum *IB.* 3. 236. *flore purpureo monopetalo labiato, semine subrotundo* Wohlgemuth, Dosten, *Origan Ic. Rivin. Tab. hist.* 4. *pag.* 726. in denen Hecken zu Oßwald, und an denen Reinen, der Strassen *perenn.*

Origanum sylvestre album sive Origanum album, *Tab. hist. Ic.* 1. 725. Dosten mit weisen Blumen, an den Zäunen und Gräblein, nach der Earthauß, bey Mittelhaußbergen, in den Reben *perenn.*

Orobanche ramosa floribus cœruleis T. *monopetalis anomalis personatis, fructu oblongo unicapsulari*, Hanfwürger mit blaulichten Blumen, aller

Orten, in Tabac-Stücken zu Schiltigheim. *perenn.*

Orobanche ramosa floribus purpurascentibus T. seu Orobanche minor, purpureis floribus sive ramosa *IB.* 2. 781. Hanfwürger mit röthlichen Blumen. *ibid.*

Orobanche ramosa floribus sub albidis T. Hanfwürger, mit weisen Blumen, auf Tabac-Stücken zu Oßwald.

Parnassia vulgaris & palustris T. *flore rosaceo fructu ovato*, Gramen Parnassi Dodon. quibusdam Hepaticus flos, *IB.* 3. 537. weise Hertz-Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hist.* 527. in dem Illkircher und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Pedicularis serotina lutea T. *flore monopetalo anomalo*, sive Coris Monspessulana lutea IB. 3. 433. est Odontites flore luteo Rivin. gelber Augentrost, beym Eckbolsheimer Ziegelofen, an Lingelsheimer Wäldlein,

Persicaria mitis maculosa T. *floribus apetalis purpureis spicatis*, sive Persicaria mitis IB. 3. 777. est Persicaria 11. *Tab. hist. pag.* 1240. gelind fleckigt Flöh-Kraut, mit rothen Blumen, *Persicaire tacheté*, aller Orten, in sumpfichten Gründen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Persicaria mitis non maculosa T. *floribus purpureis*, Flöh-Kraut, mit röthlichen Blumen und Blättern, ohne Flecken, ibid. *perenn.*

Persicaria mitis non maculosa *floribus candidis* gelind Flöh-Kraut, ohne Flecken, mit weisen Blumen, vor dem Juden-Thor, hinter der Citadell. *perenn.*

Per-

Persicaria mitis cum maculis ferrum equinum referentibus T. sive Persicaria mitis maculosa Lobel. Ic. 315. gelind Flöh-Kraut, mit Roßeisen gleichenden, gefleckten Blättern, um den Mauerhof, auf Kraut-Aeckeren häufig. *perenn.*

Persicaria minor T. sive Persicaria pusilla, repens *Lob. ic.* 316. & *Tab. hist. Ic.* 3. 1240, klein Flöh-Krant, mit rothen Blumen, auf feuchten Aeckeren und andern sumpfichten Orten, bey Oßwald unter denen Weiden-Bäumen. *perenn.*

Persicaria angustifolia T. *caule rubente lævi ac geniculato, spicis oblongis, floribus ex geniculis pallide purpurascentibus apetalis*, est Persicaria pumila *Tab.* 1240. *semine ovato*, Flöh-Kraut, mit schmahlen Blättern, und röthlichten Stengel, wie auch bleichrothen Blumen, in sumpfichten Orten, beym Lazareth, in der Ruprechtsau an dem Rhein. *perenn.*

Persicaria salicis folio, Potamogeton angustifolium dicta Ray Hist. Saam-Kraut, mit Weiden Blättern, in Teichen und Wasser Gräben um die Stadt, vor dem weisen Thurn. *perenn.*

Persicaria urens seu Hydropiper T. IB. 3. 780. Est Persicaria acris, *floribus rubentibus in spicam non compacte congestis, sed magis á se invicem distantibus. folio longo, Courage Ic.* 1. *Tab. hist.* 1240. Wasser-Pfeffer, brennend Flöh-Kraut, mit langen Blättern, und rothen Blumen, auf dem Schießrein am Wasser, bey der Brucke gegen Schiltigheim, *dicitur acris non ab urendo sed ob foliorum & seminis saporem quadantenus acrem.*

Persicaria paluſtris fluitans, foliis brevioribus & latioribus, florum ſpica ſpinoſa purpurea compactiore Rupp. Flor. Jen. Waſſer-Pfeffer, mit rundlichten Blättern, und dicht gedrungenen Blumen, bey Oßwald mitten in der Ill, gegen des Herren Prætoris Schloß über häufig, am Ufer gegen Oßwald der Ill. *perenn.*

Polium Lavendulæ folio T. *flore monopetalo labiato albo, quod Ajuga folio integro eſt Rivin.* ſive Polium recentiorum fœmina Lavendulæ folio *Lob. Ic.* 488. & *Tab. hiſt. Ic.* 5. 750. wilder Lavendel, Berg-Poley, über dem Mauerhof, rechter Hand gegen Oßwald, an einer ſteinichten Grube, auf der Metzgeran, an deren Hügeln, hin und wieder *perenn.*

Polium lavendulæ folio anguſtiori T. ſive Polium campeſtre *Tab. hiſt. Ic.* 6. 750. wilder Lavendel, mit ſchmahlen Blätteru, auf dürren Wieſen, gegen der Ganſau, bey der hohen Wart, auf erhabenen ſandigen Heyden. *perenn.*

Polygonifolia, floribus & ſeminibus extremis ramulis acervatim congeſtis Dillen. Catalog. Plant. *floſculis albis roſaceis*, eſt Polygoni-vel Linifolia per terram ſparſa flore, ſcorpioides *IB.* 3. 379. *Ic. vid. Tournefort Alſat. ſub nomine Alſine paluſtris minor Tab.* 11. *hiſt. c.* bey Wolfsheim am Canal.

Polygonum latifolium T. ſive *Polygonum aut Centinodia IB.* 3. 374. *flore apetalo ſtamineo rubro ſemine triangulari*, breit blätterich Weg-Graß, mit rothen Blümlein, *Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1214. Re-

nonce ou Centinode, hin und wieder an denen Wegen, *perenn.*

Idem flore candido T. Blut-Graß, mit weissen Blumen, *ibid.*

Polygonum brevi anguſtoque folio T. ſive Polygonum, *Tab. hiſt.* 1214. Wegtritt, mit kurzen ſchmahlen Blättern, gegen Oßwald, neben den Aeckeren, wie auch in der Ruprechtsau, *perenn.*

Polygonum oblongo anguſtofolio T. ſive Polygonum anguſtifolium *IB.* 3. 376. eſt Polygonum III. *Tab. hiſt.* 515. Wegtritt, mit langen ſchmahlen Blätteren, auf den Feldern zu Oßwald, vor dem Fiſcher-Thor gegen der Citadelle *perenn.*

Polypodium vulgare T. ſive Polypodium, *IB.* 3. 746. *floſculis ſubluteis muſcoſis, dorſo foliorum exeuntibus, foliis diſſectis, radice repente*, Engel-Sueß, Farrn-Kraut, auf dem Waſſenburgiſchen Gebürg, an denen Felſen, und auf denen alten Eichbäumen, *Ic. Tab. hiſt.* 1188.

Polypodium minus T. kleine Wald Süeſe-Farn, zu Oberbronn, auf dem Römiſchen Berg-Schloß Waſſenburg, auf denen alten Mauren hinter Barr. *perenn.*

Polypodium anguſtifolium fol. vario T. ſive Lonchitis altera folio polypodii, *IB.* 3. 344. wilde Hirſch-Zung, in dem Bärenthal, etliche Stund, von Buchsweyler, in dem Thal, gegen dem Ottilien-Brunnen, von Heilgenſtein, *Ic.* 2. *Tab. hiſt. pag.* 1190. *perenn.*

Porrum ſylveſtre 11. *Tab. hiſt.* Ic. 872. *flore liliaceo fructu ſubrotundo, ſemine ſubrotundo, Porreau ſauvage*, wilder Brißlauch, auf ſumpfichten Wieſen, bevm Maurhof häufig. *perenn.*

Porrum ſectivum juncifolium T. ſive Porrum ſectile Matth. 873. *flore liliaceo purpureo*, Schnittlauch, in Gärten und Gartners-Feldern, *perenn.*

Portulaca latifolia ſativa ſeu domeſtica T. *floſculis ſublutеis roſaceis fructu ovato*, & IB. 3. 678. *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 830 zahmer Burtzel, *Pourpier domeſtique*, in Gärten und Gartners-Feldern. *ann.*

Portulaca anguſtifolia ſeu ſylveſtris vel ſpontanea T. *Pourpier ſauvage Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 356. wilder oder Acker-Burtzel, auf ſandigen Aeckern bey Oßwald, und in der Ruprechtsau. *ann.*

Potamogeton puſillum, gramineo folio, caule rotundo Rap. Hiſt. *flore cruciformi viridеſcente* ſive Potamogeton puſillum gramineo folio breviori Vaill. *Ic.* 4. *Tab.* XXXll. gar kleiner Waſſerlock, mit runden Stengeln, in dem XV. Wört, in einem Gräblein häufig. *perenn.*

Potamogeton ingens gramineo folio longiori fructu quadrigemino *Vaill. Tab.* XXXll. *fig.* 5. Mittelmäſſig Waſſerlock, mit langen Graß-Blättern, in der Ill bey Oßwald, gegen der Uberfahrt, eſt *Peucedanum aquaticum Tab. hiſt.* 187. *noſtratibus* Flußlock, *perenn.*

Ranunculus paluſtris folio anguſtiore plantaginis T. *flore ſimplici roſaceo albo fructu globoſo*, ſive Plantago aquatica minor *Tab. hiſt. pag.*

1114. Schmahl blättrichter Wasser-Wegerich, *Plantain d'eau à feuilles etroites*, in Gräben, neben denen Wiesen, in der Ruprechtsau, unten an dem Glacis, vor dem Metzer-Thor. *perenn.*

Ranunculus paluſtris plantaginis folio humilis & ſupinus T. ſive Plantago aquatica humilis anguſtifolia & longifolia *Lob. Ic.* 300. kleiner niedriger Wasser-Wegerich, in Gräblein zwiſchen Oßwald, und Gravenſtaden, unten an dem Glacis, in ſumpfichten Orten, vor dem Metzger-Thor. *perenn.*

Ranunculus paluſtris plantaginis folio ampliore T. ſive Plantago aquatica *IB.* 3. 787. eſt Plantago paluſtris ſive aquatica *Tab. hiſt. Ic.* 1111. groſer Wasser-Wegerich, mit breiten Blättern, *Plantain deau, à feuilles larges. perenn.*

Ros ſolis folio ſubrotundo T. *flore roſaceo fructu ovato*, ſive Ros ſolis foliis circinnatæ rotunditatis, *IB.* 3. 761. eſt Ros ſolis major *Lob. Ic.* 811. *flore monopetalo raſaceo albe, radice piloſa ſeu Rorella Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 1202. Sonnen-Thau, mit rundlichten Blättern, *Roſée du Soleil.* auf dem Mooß/ auf dem Hochfeld. *perenn.*

Ros ſolis foliis oblongis T. & *IB.* 3. 761. *Ic. Tab. hiſt.* 1202. Sonnen-Thau, mit länglichten Bieren-Laub ähnlichen Blättern, in dem Hagenauer Forſt, und Hördter Wald *perenn.*

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis T. *flore roſaceo, fructu ovato*, ſive Lyſimachia purpurea ſpicata, *IB.* 2. 902. brauner Weidrich, auf feuchten Wieſen, und an denen Waſſer-Geſtaden, *Salicaire Ic. Tab. hiſt.* 1236. *perenn.* Sa-

Salicaria hyſſopifolio latiore T. ſive Hyſſopifolia aquatica, *IB.* 3. 792. *floribus roſaceis cœruleſcentibus*, auf feuchten Wieſen bey Ehrſtein.

Salicaria hyſſopifolio anguſtiore T. *minus ramoſa* in dem Ried, zwiſchen der Ill, und dem Rhein bey Marckelsheim, wie auch in feuchten Orten, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Sedum majus vulgare T. & *IB.* 3. 687. ſeu Barba Jovis, *flore roſaceo ſtellato umbellato, fructu multicapſulari*, *la Grande Joubarbe*, groſe Haußwurtz, *Ic. Tab. hiſt. pag.* 1224. & *HEyſt.* auf denen Stroh-Dächern der Bauren *perenn.*

Sium latifolium T. ſive Sium maximum latifolium *IB.* 2. 175. eſt Paſtinaca paluſtris *Tab. hiſt.* 2. 202. ſeu Sium Rivin. groſe Waſſer-Paſtinacke, *Berle* in denen Stadtgräben, auſſerhalb der Stadt. *perenn.*

Sium aquaticum virulentum, foliis multifidis longis & ſerratis, floribus ſubluteis roſaceis, caule excavato ſtriato & geniculato, ſuccum luteum fundente, fructu ſubrotundo radice craſſa fibroſa acri, quod Cicuta eſt Wepferi vel Sium aquaticum majus anguſtifolium *Tab. hiſt. Ic.* 4. 203. vel Cicutaria Rivin. giftiger Waſſer-Schirling, *perenn.*

Sium umbellatum repens Ger. emacul. vel Sium aquaticum ad alas floridum Moris umb. 6. *radice repente* klein kriechender Waſſer-Eppich, bey dem Waſſer, auf dem Schießrein, bey der Bruck, gegen der Tabac-Mühl, auf einer feuchten Wieſe, vor dem weiſen Thurn, gegen dem Fort. *perenn.*

Siſym-

Sisymbrium annum absinthii minoris folio T. sive Sophia Chirurgorum I ob. Icon. 198. est Seriphium Germanicum *IB.* 2. 886. Well Saamen, Besen-Kraut, hin und wieder an denen Wegen, und alten Mauren. *ann.*

Solanum tuberosum esculentum T. *flore albo monopetalo rotato simplici fructu globoso seu Papa, american. IB.* 3. 614. *quæ Arachidna Theophraſt. Clus. hiſt. LXXIX.* Tartuflen oder Grund-Bieren, mit weisen Blumen, *Ic. Tab. hiſt. pag.* 869. auf denen Aeckern und Feldern. *perenn.*

Idem flore purpureo, Grund oder End-Bieren, mit rothen Blumen, ibid.

Utrumque quandoque fert flores plenos.

Solanum officinarum acinis nigricantibus T. sive Solanum hortense seu vulgare acinis nigris, *IB.* 3. 608. Nacht-Schatten, mit schwartzen Beeren, an feuchten Orten und Winckeln, an schattichten Mauren, in der Stadt. *Morelle à fruit noir, Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 1993. *ann.*

Solanum officinarum acinis luteis T. sive Solanum hortense seu vulgare acinis luteis *IB.* 608. *folio minori virenti*, Nacht-Schatten, mit gelben Beeren, *Morelle á fruit jaune*, an dem Brumbter und Hördter Wald häufig. *ann.*

Sonchus lævis laciniatus latifolius T. *flore semiflosculoso, semine papposo*, sive Sonchus, minus lacinosus, mitior sive minus spinosus *IB.* 2. 1014. glatter Hasen-Kohl, Gänse-Distel, mit breiten eingeschnittenen Blättern, *Tab. hiſt. Ic.* 4. 499. auf den Brach-Aeckern, und Kraut-Aeckern um die Stadt. *perenn.*

Son-

Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, T. kleiner Hasen-Kohl, mit glatten Blättern, *Ic. Tab. hist.* 3. 499. ibid. *perenn.*

Sonchus lævis angustifolius T. glatter Hasen-Kohl, mit schmahlen Blättern, *Ic. Tab. hist.* 495. & *Lob. Ic.* 236. in denen Gräblein vor dem Spithal-Thor, gleich an der Brück. *perenn.*

Stachys major germanica T. sive Fuchsii *IB.* 3. 319. *flore albo monopetalo labiato, foliis tomentosis, semine subrotundo*. riechender Andorn, *Ic. Tab. hist.* 1. 767. hin und wieder vor denen Thoren, vor dem Wald zu Illkirch. *perenn.*

Thalictrum majus non striatum T. Wiesen-Raute, mit glatten Stengeln, auf feuchten Wiesen, bey Ehrstein, *perenn.*

Thalictrum minus T. sive Rutæ pratensis genus minus semine striato *IB.* 3. 487 zu Oberbronn, auf Berg-Wiesen, gegen Wasserburg, beym Quell-Bächlein. *perenn.*

Thalictrum pratense angustissimo folio T. Wiesen-Raute, mit sehr schmahlen Blättern, *Ic. Tab. hist.* 121. in dem Illkircher Wald häufig, auf der Lingelsheimer Nachtweyde. *perenn.*

Thymelæa linariæ folio vulgaris T. *flore monopetalo infundibuliformi* sive Passerina Tragi, *IB.* 3. 456. Spatzen-Zung, *Ic. Tab. hist.* 2. 1212. auf denen Aeckeren zu Illkirch und Oßwald, *ann.*

Thysselinum Plin. & *IB.* 3. *part.* 2. 188 *officinis* Olsnitium sive Apium sylvestre Dodon. lacteo, *succo turgens, floseulis albis rosaceis, radice nigra, semine fructu striato*, wilder Eppich, in sum-

pfichten

pfichten Gruben, bey der Eisenschmidt, hinter Oberehenheim, zu Maßmünster. *perenn.*

Thysselinum paluſtre T. *lacteſcens acre, foliis ferulaceis flore, albo, ſemine lato IB.* 3. 188. Scharfer Wasser-Eppich, *perenn.*

Tithymalus amygdaloides anguſtifolius *Tab. hiſt.* 6. 988. Wolfs-Milch, mit schmahlen Mandel-Blättern, in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Tithymalus arvenſis latifolius germanicus T. ſive Tithymalus Platyphyllos Fuchs IB. 3. 670. breit Blättrichte Wolfs-Milch, auf denen Aeckeren und in Gärten, *ann.*

Tithymalus ſive Eſula exigua T. ſive Eſula exigua. Trag. Lob. Ic. 378. ſive Tithymalus miniмus anguſtifolius annuus IB. 3. 664. kleine Acker Wolfs-Milch, aller Orten. *ann.*

Verbaſcum Lychnitis, flore albo parvo T. *monopetalo rotato fructu ovato*, ſive Verbaſcum flore albo parvo *IB.* 3. *app.* 873. eſt Verbaſcum *Lychnitis Matth. Lob. Ic.* 562. kleine weiſe Königs-Kertzen, oder Woll-Blumen, *Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 957. *Bouillon blanc*, in der Ruprechtsau, in denen Hägen, auf trockenen Wieſen gegen Oßwald.

Verbaſcum latifolium luteum Mas T. ſive Verbaſcum vulgare flore luteo magno, *rotato folio maximo IB.* 3. *app.* 871. Woll Kraut, Männlein, groſe Königs-Kertzen, mit groſen gelben Blumen, *Ic. Tab. hiſt.* 256. & *HEyſt.* in der Ruprechtsau, auf der Heyde zu Brumbt häufig. *perenn.*

Verba-

Verbaſcum Fœmina flore luteo magno T. ſive Verbaſcum maximum album fœmina flore ſub pallido, *Lob. Ic.* 161. Woll-Kraut, Weiblein mit groſen gelben Blumen, *Ic.* 6. *Tab. hiſt.* 917. in dem Jlkircher Wald, am Waſſer häufig *perenn.*

Verbaſcum pulverulentum, *flore luteo parvo* IB. 3. *app.* 872. kleine gelbe Woll-Blumen, eſt Verbaſcum luteum *Tab. hiſt.* 6. *pag.* 957. bey der Spithal-Mühl am Weg / auf dem Metzger-Wall, auswendig gegen denen Gräben zu, häufig. *perenn.*

Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente T. Verbaſcum nigrum flore parvo apicibus purpureis IB. 3. *app* 872. eſt Verbaſcum nigr. HEyſt. ſchwartz Woll-Kraut, mit gelben Blumen, und rothen Zäſerlein, *Bouillon noir.* an dem Weg auf Sultz, auf Molßheim, in der Gegend wo der Hellebor. fœitid. wächſt oberhalb der Capell. *perenn.*

Verbena communis cœruleo flore T. *monopetalo labiato ſemine oblongo*, ſeu Verbena vulgaris IB. 3. 443. Eiſen-Kraut, *Verveine Ic.* 1. *Tab. hiſt. pag.* 380. & *in Rivin.* in der Ruprechtsau, und ſonſten hin und wieder an denen Wegen. *perenn.*

Veronica ſpicata anguſtifolia T. *flore monopetalo rotato* ſive Veronica major, anguſtifolia caulibus viridibus IB. 3. 284. eſt Veronica erecta ſylveſtris Rivin. aufrecht ſtehender Ehrenpreiß, *Ic. Tab. hiſt.* 4. & 5. 773. in dem Ganßauer Wald, in feuchten graßichten Orten. *perenn.*

Vero-

Veronica ſpicata longifolia T. ſive Veronica ſpicata recta, profunde ſerrata IB. 3.284. eſt Veronica ſpicata Rivin. *Ic. Tab. hiſt.* 773. Aebren Weydrich, mit blauen Blumen, und langen Blättern, in dem Illkircher Wald, hinter dem Mauerhof, bey Oßwald, auf feuchten Matten. *perenn.*

Virga aurea virginiana Zanon. ſive Aſter annuus Canadenſis flore albo pappoſo HRP. Canadenſiſche Dürrwurtz, faſt aller Orten. *ann.*

Urtica urens maxima T. ſive Urtica vulgaris major *IB.* 3. 445. *flore albo apetalo, folio ſerrato, fructu bivalvi*, groſe brennende Neſſel, *Ic. Tab. hiſt.* 2. & 4. 921. *perenn.*

Urtica urens minor T. ſive Urtica minor annua IB. 3. 446. kleine brennende oder Eiter-Neſſel, *Petite Ortie Ic.* 3. *Tab. hiſt.* 921. an denen Wegen und Wänden, *ann.*

Urtica urens maxima caule rubente T. ſive Urtica rubra *Tab. hiſt.* 4. 921. groſe brennende Neſſel, mit rothen Stengeln, in ſchattichten Orten, bey Oßwald und auf denen Glacis, der Stadt. *perenn.*

Xanthium T. ſive Lappa minor IB. 3. 572. floribus floſculoſis albis, foliis ſinuatis, *fructu ſemine oblongo*, kleine Kletten, Bettlers-Läuſe, *Petit Gletteron, Ic. Matthiol. epitom.* 926. *perenn.*

MENSIS
AUGUSTUS ET SEPTEMBER.

Abrotanum campeſtre cauliculis rubentibus, T. ſive Abrotanum ſylveſtre IB. 3. 194. *floſculis luteis*

*luteis flosculosis inodoris, foliis capillaceis, semine pappo*so, wilde Stab oder Schoßwurtz, *Auronne sauvage Ic. Tab. hist.* 3. 51. gegen Oßwald, neben denen Aeckern. *perenn.*

Abrotanum campestre cauliculis albicantibus T. wilde Stabwurtz, mit grünlichten Stengeln, vor dem weisen Thurn-Thor, auf der Gansau, *perenn.*

Abrotanum Mas angustifolium majus T. zahme Stock oder Schoßwurtz, Gänsewurtz, Kuttel Kraut, *Ic.* 1. *Tab. hist.* 50. in Gärten, und Gartners-Feldern *perenn.*

Absinthium ponticum tenuifolium incanum T. Römischer Wermuth, in Gärten. *perenn.*

Aconitum cœruleum sive Napellus T. & IB. 3. 655. *flore polypetalo anomalo galeato, folio dissecto atrovirente, radice nigra fibrosa, semine angulari. Cappe de Moine, Tuè Loup.* Wolfswurtz, blaue Kappen-Blumen, *Ic. Tab. hist.* 980. in Gärten, *perenn.*

Aconitum lycoctonum luteum T. sive Aconitum folio Platani flore luteo pallescente IB. 3. 652. Narren-Kappen, gelbe Eisen-Hütlein, *Aconit à fleur jaune Ic.* 4. *Tab. hist.* 982. *ibid. perenn.*

Agaricus digitatus niger apicibus albidis T. est Fungus æthiopico piperi similis Mor. hist. Ox. Part. 3. an abgefaulten Eichen-Holtz, so lang in dem Schatten gelegen, unten an eichenen Dielen, in denen schattichten Gärten, und an deren Ritzen und Spalten.

Artemisia vulgaris major, caule & floribus purpurascentibus T. *flosculis flosculosis* sive *Artemisia vulgaris* IB. 3. 184. est *Artemesia rubra Tab. hist.*

hiſt. 1. 27. Beyfuß oder rother Buck, *Armoiſe*, an denen Zäunen, bey denen Schwein-Ställen, vor dem Fiſcher-Thor, auf dem Glacis. *perenn.*

Artemiſia vulgaris major caule ex viridi albicante T. weiſer Beyfuß, eſt Artemiſia alba *Tab. hiſt. Ic.* 2. 27. bey der Carthauß, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Arundo vulgaris T. ſeu paluſtris IB. 2. 485. ſive Canna ſepiaria, *Tab. hiſt. Ic.* 2. 572. *folio oblongo, flore apetalo, radice fibroſa & oblique geniculata* Canne ou Roſeau, in denen Stadtgräben, vor den Thoren. *perenn.*

After montanus luteus, foliis oblongis T. *Floreradiato, ſemine pappoſo*, gelb Bergſtern Kraut, in dem Illkircher Wald, im Dachſteiner Wäldlein, auf Berg-Wieſen, bey hohen Andlau, *perenn.*

After paluſtris parvo flore globoſo T. ſive Conyzæ mediæ minor ſpecie, vixradiato IB. Kleine Dürrwurtz, Sumpf Dürrwurtz, *Coniſe de Marais Ic.* 2. *Tab. hiſt.* 1243. an denen Gräben, neben der Landſtraß, vor dem Spithal-Thor, bey der grünen Wart. *perenn.*

After pratenſis autumnalis Conyzæ folio T. ſive Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis, locis proveniens IB. 2. 1050. eſt Conyza media HEyſt. gelbe Waſſer Stern-Blumen, an denen Gräben und feuchten tieffen Orten aller wegen.

Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto albo T. ſive Caryophyllus plumarius albus, *Tab. hiſt.*

Ic. 2. pag. 286. weiſe wilde Feder-Negelein, auf der Wieſe, in dem Granwört, und bey dem Mauerhof. *perenn.*

Coralloides albida T. ſive Fungus ramoſus albidus *IB.* 3. 837. eſt *Fung. eſcul. XIX. gen. Clus. hiſt.* Geyſen Bart, Händlein-Schwamm, in ſchattichten Waldungen.

Filago minor T. ſive Gnaphalium minimum *IB.* 3. 159. eſt *repens & erectum folio brevi anguſtoque*, an feuchten Orten, zu Oßwald, und Lingelsheim. *perenn.*

Fungus pileolo lato & rotundo T. ſive Fungus campeſtris albus ſuperne inferne rubens IB. 3. 824. eſt Fungorum eſculentor. IX. gen. Clus. hiſt. CCLXVIII. Champignons. Pfifferling, in Wälderen und auf denen Vieh-Weyden, in dem Ruprechtsauer Wald.

Fungus juniperinus lævis & albicans atque exilis nobis, Wachholder Schwamm, in dem Ganſauer Wald, nnd anderen Wachholder Stöcken.

Fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem ſuccum Fundens. CBp. ſive Fungi punicei, lacte dulci manantes, pratenſibus ſimiles edules IB. 3. 829. Brückling in dem Ganſauer nnd Niedecker Wald.

Fungus pileolo lato, longiſſimo pediculo variegato T. ſeu Fungi longiſſimo pediculo candicantes, ſed maculati & eſculenti IB. 3. 826. Weißling, in dem Hagenauer Forſt an trockenen Orten.

Fun-

Fungus planus orbicularis aureus CBp. sive Fungi lutei magni, dicti Iaseran, speciosi IB. 3. 831. est XVII. gen. esculent. Fungor. Clus. hist. CCLXXII. Kayserling, Herren Pültz, oberhalb Peris, gegen der schwartzen See.

Fungus umbilicum referens variegatus CBp. est XIII. genus escul. Fungor. *Clus. hist.* CCLXIX. rothe Teuberling, hinter Barr, in denen Waldungen.

Fungus in metam fastgiatus albus, fusco tinctus CBp sive *Fungi in metam fastigiati esculenti, coloris albicantis, fusco tincti IB.* 3. 828. *est III. Genus escul. Fungor. Clus. hist. CCLXV.* in Waldungen, hinter Ottrott.

Fungus pernicioſus, ex eodem pediculo multiplex T. sive Fungi multi ex uno pede pernicioſi IB. 3. 835. est XII. gen. pernicios. Fungor. 5. species Clus. hist. CCLXXXV. Stock-Schwämme, in dem Ruprechtsauer Wald und Hagenauer Forst.

Fungus auricularis miniatus Hofm. flore Altorf, Holtz Schwamm, an abgehauenen faulenden Bäumen, in der Ruprechtsau.

Gentiana pratensis flore lanuginoso T. *monopetalo campaniformi, fructu ovato* sive Gentiana Fugax. 11. Clus, hist. 315. hoher blauer Himmel-Stengel, mit tausend gulden Blättern, auf der Lingelsheimer Nachtweyd / und beym Polygon *perenn.*

Gentiana cœrulea oris pilosis T. sive Gentianella lanuginosa IB. 3. 525. blauer Himmel-

Stengel, mit blauen an dem Rand besetzten haarichten Blumen, auf der Gansau, vor dem Wald, auf dürren Wiesen, in dem Ostwinckel. *perenn.*

Glaux palustris flore albo striato clauso foliis portulacæ T. Ic. 1. Vaill. Tab. XV. fig. 5. vor dem weisen Thurn, auf dem Sandbänckel, wo die Breusch in die Ill fält. *perenn.*

Gramen dactylon angustifolium spicis villosis T. sive Gramen digitatum hirsutum IB. 2. 445. sive Ischæmum 11. Tab. hist. pag. 543. Blut-Graß / auf einer dürren Wiese, am Rhein-Ziegel-Ofen, auf der Landstraß nach Blobsheim. *perenn.*

Gramen dactylon, radice repente sive Officinar T. sive Gramen repens, cum panicula Graminis Mannæ, Kriechend Acker-Graß, aller Orten in Gärten, auf denen Aeckern, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen dactylon folio latiore T. sive Galli Crus IB. 2. 444. Gramen Ischæmum vel Sanguinarium *Tab. hist. pag.* 534. Blut oder Schwaden-Graß, ohnweit der Sau-Bruck / am Becken Wäldlein, neben den Gärten, bey Schiltigheim, neben denen Aeckern. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea tenuiori, longa T. sive *Gramen cum cauda muris minus IB.* 2. 471. est Gramen typhinum 1. *Tab. hist. pag.* 531. Liesch-Graß, auf trockenen Wiesen, auf der Gansau, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen

Gramen ſpicatum ſpica cylindracea glabra foliis hirſutis T. ſive Gramen cum cauda muris foliis hirſutis *IB.* 2. 471. eſt Gramen Alopecuroides minus *Lob. ic.* 9. in denen Reben bey Mittelbergheim. *perenn.*

Gramen ſpicatum ſpica cylindracea brevi nodoſa T. ſive Gramen nodoſum ſpica parva tertium CBp. prodr. 2. 3. bey der Inſulförmigen Matt, an dem Canal, gegen des Schlieſenmeiſters Hauß, auf der Heyde, bey der Eckbolsheimer Ziegel-Hütte, *perenn.*

Gramen ſpicatum, ſpica cylindracea tenuiſſima breviore T. rufeſcente ſive *Grameu alopecurinum* 11. *Tab. hiſt.* 20. *pag.* 520. auf denen Aeckern, vor dem Steinſtraſſer Thor, auf dem Schießrein, unterhalb der Lohmühl, faſt an der Brücke, *perenn.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula anguſtiore ex viridi nigricante T. Wald-Rohr, neben dem Canal, in feuchten Gruben. *perenn.*

Gramen vulgare minus, panicula rigida T. ſive *Gramen minus duriuſculum Tab. hiſt.* 18. *pag.* 520. klein hart Graß, auf dem Wall, zwiſchen dem Juden und Steinſtraſſer Thor, vor dem Spithal-Thor, wo die Seiler arbeiten. *perenn.*

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus T. *flore ſemifloſculoſo, ſemine pappoſo* ſive Hieracium fruticoſum rectum & rigidum *IB.* 2. 1030. Berg Habicht-Kraut, zu Mittelhaußbergheim,

in dem Ostwinckel, auf der Heyde, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. *perenn.*

Hieracium fruticosum minus T. *caule rubro.* Klein Berg Habich-Kraut, zwischen dem Steinstraser und weisen Thurn-Thor häufig. *perenn.*

Hieracium montanum glabrum latifolium majus T. sive Hieracium montanum, majus latifolium *IB.* 3. 1032. *Ic. Tab. hist.* 13. 494. groß Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, auf dem Ottilien Berg. *perenn.*

Hieracium montanum, latifolium glabrum minus T. sive Hieracium latifol. glabrum ex Valle Griesbachianum *IB.* 2. 1033. est Hieracium montanum latifolium minus *Tab. hist. Ic.* 14. 495. klein Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, auf dem Gebürg hinter Barr, an feuchten grasichten Orten, hinter Rappolsweyler. *perenn.*

Hydrocotyle vulgaris T. sive Cotyledon aquatica *IB.* 3. 718. & *septentrional. Lob. Ic.* 387. *foliis umbilicatis flore rosaceo albo radice repente, Nombril de Venus*, Sumpf Nabel-Kraut, auf der Wiese, rechter Hand beym Mauerhof, am Wassergraben, *copiose vid. Tab. nostr. XII. perenn.*

Iuncus palustris humilior T. sive Gramen junceum bufoninum *Tab. hist. Ic.* 6. 536. *repens caliculis paleaceis*, Krotten-Graß, auf allen feuchten und sumpfichten Orten. *Crapandine perenn.*

Limosella annua, flore albo monopetalo infundi-

p. 266. Hydrocotyle. T. Tab. XII.



J. Striedbeck Sculp.

silicatis flore rosaceo albo radice repente, Nom-
Veneris, Sumpf Nabel-Kraut, auf der Wie-
, rechter Hand beym Mauerhof, am Wasser-
graben, *copiose vid. Tab. nostr. XII. perenn.*

Iuncus palustris humilior T. sive Gramen junceum bufoninum *Tab. hist. Ic. 6, 536. repens caliculis paleaceis*, Krotten-Graß, auf allen feuchten und sumpfichten Orten. *Crapandine perenn.*

Limosella annua, flore albo monopetalo infundi-

undibuliformi ſtellato, fructu ovato unicapſu-
ari, ſemine fœto exiguo oblongo, foliis ob-
ongis planis, longis pediculis inſidenti-
bus, radicula fibroſa albicante repente. nob.
ſive Alſine paluſtris repens, foliis lanceolatis,
floſculis albis perexiguis Pluck. weiſe Sumpf
Stern = Blümlein, in der Ruprechtsau, in
feuchten Pfützen häufig. vid. Tournef. Alſ. Tab.
v. 156.

Lupulus Mas T. & *IB.* 2. 151. *floribus apeta-
lis herbaceis fructu ſquamoſo*, Hopfen *Hublon mâle
Ic. Tab. hiſt.* 1293. in Gärten und Feldern,
perenn.

Lupulus fœmina T. & *IB.* 2. 151. ſive Sterilis
wilder Hopfen, *Houblon femelle*, wilder Hopfen,
aller Orten, in denen Hecken und Zäunen.
perenn.

Lycoperdon vulgare T. ſive Fungus pulve-
rulentus, Crepitus Lupi dictus *IB.* 3. 848. *Veſſe
de Loupe*, Boviſt, auf feuchten Wieſen zu Oß-
wald, und in den Ganſauer Wald.

Lycoperdon minus multiplex ſpurium T.
unten an denen Wurtzeln, alter Bäumen/ auf der
Lingelsheimer Nachtweyd.

Lycoperdon veſicarium ſtellatum T. Blaſen
förmiger Stern-Schwamm, am Weg nach dem
Hochfelder Gebürg, hinter Barr.

Majorana vulgaris T. *folio majore, flore albo mo-
nopetalo labiato*, Majoran *Mariolaine Ic.* 1. *Tab. hiſt.*
718. *ann.*

Majorana tenuifolia T. ſive Majorana tenuior & lignoſior *IB.* 3. *part.* 2. 241. *noſtrat.* *Majorana nobilis*, Edler Winter-Majoran. *perenn.*

Milium ſemine luteo T. *folio gramineo flore, apetalo, ſemine ſubrotundo, ſeu Milium IB.* 2. 446. Hirſe rother oder gelber Hirſe, *Millet jaune Ic.* 1. *Tab. hiſt.* 656. auf denen Aeckern, *ann.*

Milium ſemine albo T. weiſer Hirſe, ibid.

Milium ſemine nigro T. Schwartzer Hirſe, *IB.* 2. 446. eſt *Milium nigrum Tab. hiſt. pag.* 656. *Ic.* 2. *ann.*

Orchis palmata anguſtifolia minor odoratiſſima CBp.

Panicum vulgare ſpica ſimplici & aſpera T. *flore apetalo, fructu ſpicato*, ſive Gramen ſylveſtre dictum & Dens canis IB. 2. 443. eſt Gramen geniculatum, *Tab. hiſt. Ic.* 3. 516. Knoten-Graß, neben denen Aeckern, in der Ruprechtsan. *perenn.*

Panicum vulgare ſpica ſimplici & molliori T. wilder Fench oder Hirſe, mit einfacher weicher Aehre, auf denen Aeckeren zu Oßwald, uud Lingelsheim, bey dem Spithal Garten. *perenn.*

Panicum vulgare ſpica multiplici longis areſtis circumvallata T. ſive *Gramen Panicum* II. *Tab. hiſt.* 538. in Gräben, hin und wieder. *perenn.*

Panicum vulgare ſpica multiplici aſperiuſcula T. ſive *Panicum ſylveſtre Tab. hiſt. Ic.* 3. 660. Pfennich-Graß, mit rauhen Aehren, auf denen Kraut-

Fel-

Feldern, an denen Zäunen, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Pimpinella sanguisorba major T. *floribus monopetalis rotatis atro rubeutibus, foliis pinnatis & serratis, fructu quadrangulari*, sive Sanguisorba major flore spadiceo *IB.* 3. *part.* 2. 120. grose Wiesen Pimpernell groß Sperber-Kraut, *Grande Pimpernelle, Ic.* 1. *Tab. hist.* 316. *perenn.*

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta T. sive Sanguisorba minor, *IB.* 3. *part.* 2. 113. kleine haarichte Pimpernell, *Ic. Tab. hist.* 316. auf denen meisten Wiesen. *perenn.*

Pimpinella sanguisorba lævis minor T. glatte kleine Garten-Pimpernell, auch auf feuchten Wiesen bey Oßwald. *perenn.*

Polium montanum repens T. *flore purpureo monopetalo labiato* sive *Polemonium montanum supinum minimum Lob. Ic.* 488. & *Tab. hist.* 4. *pag.* 750. klein Berg-Poley, *Polium de Montaigne*, zu Barr auf denen Matten, und zu Heilgenstein *perenn.*

Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis anomalis unilabiatis, ex albo purpurascentibus longis pediculis insidenbus, facile deciduis, foliis anagallidi similibus, capsula oblonga, seminibus minutissimis referta. *Ic. vid. Tournef. alsat. pag.* 156. Est Montia aquatica minor Michel. nov. plant. gen. pag. 18. Tab. 13. Fig. 2. & *Mappi. Sed errat dum Montia calice gaudet bifido. in nostra autem planta in* 5. *segmenta divisa est; nominarem itaque*

que potius instituto exactiori examine, Alsinoides palu-dosa, foliis anagallidi similibus, flosculis monopetalis rubescentibus, capsula oblonga, Sumpf Gauchheil auf der Insul, wo die Breusch in die Ill fält. *ann.*

Tanacetum vulgare luteum T. & *IB.* 3. 131. *floribus flosculosis semine papposo*, gelbe Rhein-Farn, Wurm-Kraut, *Ic. Tab. hist.* 6. *pag.* 28. hin und wieder an denen Landstrassen. *perenn.*

Thalictrum majus non striatum T. sive Ruta pratensis major 111. *Tab. hist.* 120. *Rue de prez*, Wiesen-Raute, mit schmahlen Blättern, in dem Ilkircher Wald, und andern dürren grasichten Orten, bey Ehrstein. *perenn.*

MENSIS SEPTEMBER ET OCTOBER.

Colchicum commune T. sive Colchicum *IB.* 2. 649. seu *Antumnale, flore purpurascente monopetalo liliaceo, radice nigra tuberosa fructo oblongo trigono* Herbst-Blumen, Küh-Dutten, nostr. faule Futen, nackende Huren, *Colchique ou Mort de chien, Ic. Tab. hist.* 8. & 9. 1011. auf allen feuchten Wiesen. *perenn.*

Colchicum album cum purpurascentibus lineis *IB.* 2. 651. gantz weise Herbst-Blumen mit rothen Striffen, auf der Lingelsheimer Nachtweyd, auf der Wiese bey Niederhaußbergen. *perenn.*

Colchicum montanum angustifolium T. sive Colchicum montanum flore purpureo *IB.* 2. 656.

656. Berg Herbst-Blumen, mit schmahlen Blättern, auf den Berg-Wiesen hinter Barr.

Coralloides corniculis candidissimis T. sive Muscus corallinus montanus *Tab. hist. pag.* 1198. wilde Corallen-Mooß, auf dem St. Ottilen Berg an denen Felsen.

Coralloides apicibus coccineis Mapp. hist. all. 81. Corallen-Mooß, mit hochrothen Gipfeln, hin und wieder in Wälderen, auf faulen Bäumen, so zu Boden liegen.

Fungus muscas interficiens T. *pileolo verrucoso rotundo lato, lamellis albis pediculo bulboso*, Mucken-Schwämme, sive Fungus XII. genus Clus hist. CCLXXIX. in dem Ruprechtsauer Wald, in dem XV. Wört.

Fungus corylæus orbicularis T. sive Fungi sub corylis orbiculatæ figuræ *IB.* 3. 842. est VI. genus Fung. noxior. *Clus. hist. CCLXXVIII.* runder Haselstaude-Schwamm, in dem Ostwinckel, in dem Ganßauer Wald.

Fungus Erynus Bot. Monsp. Manns-Treu-Schwam, auf der Heyde, gegen dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, auf Wiesen, bey der hohen Wart.

Fungus latus orbicularis candidus CBp. sive Fungus ranarum albi pernicioſi *IB.* 3. 846. *XIII.* Genus pernicioſor. Fung. Clus. hist. CCLXXX. auf denen Aeckern bey Matzenheim.

Fungus orbicularis in palustribus CBp. sive Fungi rubri perelegantis coloris & rufi *IB.* 3. 846, est Fungor. nox. gen. XXIII. Clus. hist. CCLXXVI.

CCLXXVI. auf feuchten Wiesen bey Ehrstein.

Fungus orbicularis secundum vias & in Quercetis autumno nascens CBp. est XIX. gen. Fungor. pernicioſor. CCLXXXIII. in schattichten hohen Gebürgen.

Lichen pyxidatus major T. sive Muscus pyxidatus *IB.* 3. 767. grose Kelch-Schwäncke auf dem Ottilien Berg, auf abgefaulten in schattichten und feuchten Orten liegenden Bäumen.

Lichen pyxidatus minor T. sive Muscus pyxoides saxatilis *IB.* 3. 767. kleiner Kelch-Mooß, auf den Felsen St. Ottilien Gebürgs.

Orchis spiralis alba odorata T. sive Orchis spiralis minor *Lob. Ic.* 186. klein gewunden wohlriechend Stendel-Wurtzel, auf der Schlut, beym Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. häufig.

MENSIS OCTOBER ET NOVEMBER.

Agaricus digitatus niger T. sive Fungus digitatus nigricans ligno ad nascens, Michel. nov plant. gen. pag. 103. ubi Icon. an alten Eichenen Pfählen und Dielen, der Wände.

Agaricus esculentus T. sive Fungus maximus laciniatus quod XXI. gen. Fung. ascul. Clus. hist. CCLXXV. Eich-Schwamm, Eich-Henne, in allen Waldung unten an alten Eichbäumen.

Agari-

Agaricus Tuba Fallopianæ instar laciniatus T, an denen alten nnd faulen Tannen und Foren Bäumen, die zu Boden liegen, in dem Brumber Wald.

Coralloides Cornucervi referens, corniculis revioribus T. gehörntes Corallen-Mooß, in den feuchten Waldungen, an faulen Bäumen.

Coralloides abietina nivea procerior T. seu fungus ramosus argenteus ramosus *IB.* 838.

Coralloides corniculis rufescentibus T. sive Muscus terrastris coralloides erectus corniculis rufescentibus CBp. röthlichtes Corallen-Mooß, in denen Ritzen und Spaltungen, der Steinen, in dem Barrer Wald, an den Weg, nach dem Hochfeld, ingleichen hinter Ottrott, bey der Segmühl, an steinichten Orten.

MENSIS NOVEMBER ET DECEMBER.

In his Mensibus, ob acerbum ut plurimum frigoris accessum, Telluris spiracula occludentem, nulla in Alsatia amplius fit plantarum productio, sed quietè omnes sub terra usque ad futurum & novum progerminationis tempus delitescunt, exceptis aliquibus Fungis atque Muscis, quos vero omnes exactissime descripserunt & ad vivum orbi literato, satis superque Iconibus elegantissimis, delineaverunt Viri in re botanica perquam Celeberrimi, Clusius, Dillenius, Vaillantius, & pro tempore in-

ingenioſiſſimus atque Studioſiſſimus Dn. Dr. & Profeſſ. Hallerus, Patronus & Amicus meus omni honoris cultu proſequendus. Et ſic Horti Alſatici Ianua claudatur, his igitur acquieſce candide ac benevole Lector, atque ſerena fronte, hunc meum in poſteritatis commodum unice inclinantem Laborem aſpice. Deo interim Ter Maximo ſummo Botanicæ & Soli omnium rerum Creatori, cui omnia debemus, pro viribus conceſſis, humillima mente ſit Laus Honor & Gloria in ſeculorum Secula.

APPEN-

APPENDIX.

Plerorumque Vocabulorum botanicorum, in hoc opuſculo contentorum Derivationes illuſtrans.

I.

ABies, hujus vocabuli derivatio, Europæis ignota.

Abrotanum, dictum ab ἄβρὸς mollis & τείνω tendo, quia folia ejus mollia & extenſa ſunt.

Absinthium, nuncupatur, à vocabulo græco ψίνθος delectatio & particula privativa ἀ, ac ſi diceres, planta, quæ nullum præbet delectamentum, ſeu quæ minime grata eſt.

Acacia, appellationem habet, ab ἀκάζω acuo, quia tota planta ſpinoſa eſt.

Acanthus, vocis hujus origo, á græco vocabulo ἄκανθος, quod ſpinam ſignificat, quaſi mollis ſpina.

Aceris denominatio, obſcura eſt, putant quidem nomen ſuum accepiſſe ab ejus duritie, quia ad multa opera percommodum, ejus lignum, quæ torno fiunt.

Acetoſa, ejus nomen fluxit, ab Aceto, ſapore enim gaudet acido.

Aconitum, dictum ab ἀκονὴς Vertice montium quod in nudis cautibus, quas aconas vocant naſcatur.

Acorus, nomen ſuum accepit, a Vocabulo Acor, addita terminatione us, unde Acorus ab ejus acri ſapore.

Agrimonia dicta ab Argemone.

Alcea, apellatur ab ἀλκὴ auxilio vel remedio, dum Radices dyſentericis & ruptis, glutinando auxiliantur.

Alchimilla, nomen ſumpſiſſe putatur ab Alchimiſtis, cum ad Alchimiam quam maxime utilis eſt, & ab illis laudatur.

Allium, denominationem hanc quidam ab alendo, alii ab halando factam fuiſſe exiſtimant, graveolentem enim de ſe ſpirat odorem.

Alkekengi, ab arabico vocabulo prodire ſolet,

Alchechengi, alii putant ab ἅλς Mare & κάναβος vas, quia putamen hujus fructus vas maris refert.

Alnus dicitur mente quorundam, ab Amne, quia in flumine alatur.

Alſine vocatur, ab ἄλσος Nemus, quia in nemoribus & locis umbroſis creſcere ſolet.

Althæa, hoc nomine inſignitur ab ἀλθέω vel ἀλθαίνειν mederi, præſtat enim in medendo excellentem virtutem.

Alyſſum, vocari exiſtimant ex ἀ privativa & λύσσα Rabies, quia Rabiem ſeu Furorem caninum tollere putatur.

Am-

Ammi, hoc vocabulum dependet ab ἄμμος.
Arena, quia ſemen ejus per ſimilis eſt Arenæ.
Amygdalus à græcis ἀμυγδαλὴ, ubi á latinis y. mutatur in us, unde Amygdalus.
Anacampſeros, nomen traxit ſuum, ab ἀνακάμπτω excito & ἐρὸς amor, ob virtutem amorem excitandi.
Anagallis, vocis origo necdum nota, forſan á græca denominatione ἀναγαλλὶς.
Anemone, derivatur, ab ἀνέμω Vento dum flante vento, flos ejus explicatur.
Anethum dicitur ab ἄνηθος, genus herbæ boni odoris, aut ut alii volunt παρὰ τὸ ἄνωθέειν currere, quia hæc planta citiſſime creſcat.
Angelica refertur, nomen ſuum acquiſiviſſe, ab angelicas ſuas quas præſtat virtutes.
Aniſum ab ἄνισον vel ἄνησον.
Anonis, á græco vocabulo ἀνωνὶς deducitur, á non juvando, quod inutilis ſit Aratoribus.
Antirrhinum, nomine inſignitur ex ἄντι & ῥὶς, ῥινὸς quod vituli nares aſſimilet.
Aparine, â vocabulo ἁπαρίνη, quod ſemine orbata videatur aut quod aſpera ſit.
Aphaca, refertur á φάκη Lente, quia pertinet ad genus leguminis.
Apium, dictum ab Apibus, quæ floribus ejus delectari ſolent.
Aquilëgia, nomen duxit, ab Aquila, á florum nempe mucronibus aduncis, inſtar aquilarum unguium.
Aquifolium, ab ἀκὶς Acies & folium ob folia acuminata.

Ariſtolochia nuncupatur, ab ἄριστος optimus & λοχεῖα Lochia, planta nempe Mulierum lochia promovens.

Artemiſia, dicta ab Artemide ſeu Diana, quia ad Vitia fœminarum utilis.

Arum, nomen ſuum, â græcis retinet ἄρον.

Arundo, putatur derivari ab Undis, quia lubentiſſime in aquis fluctuantibus creſcit.

Aſarum, Vocem hanc agnoſcit ex ἀ particula privativa & σαίρω orno, quoniam in coronis non addatur.

Aſclepias, herba ab Inventore denominata, Asclepio medico.

Aſparagus á græco vocabulo ἀσπαραγὸς herbam ſignificans ſurculoſam.

Aſplenium, ab Aſplenon Herba Lieni conducibilis.

Aſter ab ἀστὴρ ſtella, quia flores ejus ſtellæ in modum explicantur.

Aſtragalus, titulum ſuum habet, á ſeminis forma, Talum ſeu Aſtragalum referente.

Aſtrantia, nuncupatur ab ἀστὴρ ſtella quia plantæ hujus ſummitas Aſterem refert.

Atriplex, unde nomen, hodie ad huc ignotum.

B.

Balſamina, vocis origo dependet á Balſamo, quia ad balſama conficienda adhibetur.

Barba capræ, vocatur â florum congerie ſeu ſimilitudine, quæ caprinam barbam referre videtur.

Belladona, eſt vox arabica, â formæ elegantia, pul-

pulchram domicellam significat. & â Veneno sic dicitur tota enim venenosa est.

Berberis, nominatur á Vocabulo Arabico sic dicto.

Betonica, á Vetonica vocabulo romano.

Betula á Betulla, eo quod Bitumine, seu bituminosa pinguedine abundet.

Bidens, á bis & dente, quia semen ejus bidentatum est.

Bistorta, nuncupatur á radice, quæ bis contorta est.

Blattaria, Blatta, quia hæc planta animalia seu Vermiculos, qui libros corrodunt, necat.

Blitum, audit á βλίτη. quod vile est & nullius pretii.

Boletus, â græco vocabulo βολίτης, quod Fungi genus denotat.

Borrago, â voce corrupta Corago, quod Cor, Mentemque exhilaret.

Brunella videtur dici, â vocabulo germanico, die Bräune, quod conveniat in febre ardente, quando Lingua & Fauces prunæ instar ardent.

Brassica, contendunt quidam nomen accepisse, à præsecando, quia ejus scapo minutatim præsecatur, alii vero autumant derivationem habere ἀπὸ τῦ πρώσσειν â vorando.

Bryonia, â verbo βρύω germino, quod abunde germinare seu pullulare solet.

Buglossum, á græcis vocabulis βῦς Bos & γλῶσσα Lingua, quia folia linguam bovis repræsentant.

Bugula, derivant quidam hanc vocem, á gallico nomine Bugle.

Buphthalmum, nomen accepit, á βοῦς Bos & ὀφθαλμὸς Oculus, quasi Bovis oculus.

Bupleurum, vocabulum hoc compositum est, ex βοῦς Bos & πλευρὸν costa, ac si dicas Bovis costa, Boves enim ea planta comesta rumpi Veteres existimarunt.

Bursa pastoris, sic dicitur, quia capsulæ seminales, Bursam pastoris exacte repræsentant.

Butomus, vocis origo desumpta est, â βοῦς â particula augente, & τέμνω seco, quia valide á Bobus expetitur vel quod folia ejus valde scindant.

C.

Cacalia, hujus plantæ Etymon nobis ignotum.

Calamintha, á καλὸς pulcher, & μίνθη Mentha dicta, quasi pulchra Mentha.

Caltha, á græco vocabulo, κάλθη Herba nascens in segetibus seu mente Bœrhav. quod Caltha diminutivum sit â Calendula, quia primo Mensis die, qui dicebantur Calendæ florescebat.

Campanula, á Campana, quia flores ejus campaniformes sunt.

Cannabis, á κάννα Fistula, quia caulis intus fistulosus est.

Caprifolium, â Capra & Folio, quia capri foliis delectentur.

Cardaminde, nominatur â κὰρ cor & δομὰω domo,

mo, quasi planta cordis vires restaurans.
Carduus ab ave carduelis dictus, dum semina ab ipsis lubentissime vescuntur.
Cassida, á militaris galeæ iconem exprimente, quam latini Cassidam appellitavere.
Castanea, vocatur á Castaneo Magnesiæ urbe, ubi olim magna in copia crescebat.
Caucalis, vox antiqua, hactenus obscura.
Centaurium, á græco vocabulo κενταύριον a Chirone Centauro Medico Thessaliæ sic dicto.
Cerasus, á Cerasunte, Ponti civitate.
Chamæcerasus, â vocibus χαμαὶ brevis & κέρασος Cerasus, humilis Cerasus.
Chamæmelum, á χαμαὶ humi & μῆλον, pomum humile vinosum odorem de se spirans.
Chamæpithys á χαμαὶ humilis & πίτυς Pinus, quasi humilis pinus.
Chærophyllum á verbo χαίρω gaudeo & φύλλον folium, quasi planta foliis gaudens.
Chelidonium, nuncupatur, â græco vocabulo χελιδὼν Hirundo, quia ab hirundine monstratum fuit, ut herba visui saluberrima.
Chenopodium á χὴν Anser & πῦς Pes, quod folia effigiem habent pedem anserini.
Christophoriana, á Sanct. Christophoro, quasi planta Christophoriani.
Chrysanthemum, á χρύσος Aurum, & ἄνθεμον, flos quasi aureus.
Cichoreum, á κιχείω, invenio, quia undique provenit.

Cicuta dicitur, quod internodia habet cava & fiſtuloſa.

Cicutaria, quaſi planta, Cicutæ affinis.

Cirſium apellatur á κίρσος Varix, quia ad Varices tollendas uſurpatur.

Ciſtus, á græca voce κίστος Hedera vel á Ciſta, quia vaſculum ſeminale in ciſta quaſi hæret.

Clinopodium, exiſtimamus nomen ſumpſiſſe à κλίνη Lectus & πῦς pes.

Cnicus, á κνίζω hinc κνίκος, planta pungens, quia ſpinulis gaudet acutis.

Cochlearia ita dicta, quod folia ejus cochlearis inſtar ſint excavata.

Colutea à græco vocabul κολυτέα.

Convolvulus, á convolvendo, quia plantas vicinas lubenter amplectit.

Coralloides planta referens corallia.

Cotyledon nominatur á κοτύλη cavitate, quia folia ejus excavata ſunt.

Cornus, dicitur ob corneam duritiem.

Coronilla vocabulum hiſpanicum, Coronam minorem denotans.

Cratægus, forte á græca voce. κραταιὸς fortis ſeu robuſtus derivatur, nam κράτος Robur audit.

Cruciata, quia flores & folia in formam crucis ſunt diſpoſita.

Cucubalus â κῦ ubique & βάλλω imitto, quia ubique radices immittit ſuas repentes.

Cucumis nomen eſt á Curvore unde Cucumeres quaſi Curvimeres.

Cu-

Cucurbita, dicta ab incurvatu, quia planta, nisi sustinetur, semper incurvetur.

Cuscuta, Vocabulum est syriacum, Herbam absque radice significans.

Cyanus, nomen suum traxit, á floris cyaneo colore.

Cydonia, á Cydone Cretæ oppido.

Cynoglossum, á vocibus græcis, κυνὸς & γλῶσσα canis & Lingua, folia enim canis linguæ similia sunt.

Cyperoides vocatur, quasi planta ad cyperum accedens.

Cyperus, titulum suum habet, á græca voce, κύπαρος, Vasculum ob radicis effigiem.

Cytisus, ab Insula Cytiso, ubi hæc planta uberrime crescit, vel à græco vocabulo κύτισον, Fruticis genus, quod ovium pabulum est, ut in iis lac augeatur.

D.

Daucus, suam denominationem agnoscit á græco vocabulo δαῦκη quod pastinacam significat, vel â δαίω uro, & δαῦκος quia calidæ est naturæ.

Delphinium, â Delphino dictum, quia flos ejus nondum apertus, Delphinum repræsentat.

Dens Leonis, ob foliorum figuram, maxillam dentibus leonis instructam referentem sic appellatus.

Dentaria, á radicum forma dentibus quasi repletam.

Digitalis á flóris ſimilitudine cum Digitali, quo mulieres inter ſuendum digitos munire ſolent.

Dipſacus á græcis vocabulis δίψα ſitis & ἀκδς, medela ut remedium contra ſitim.

E.

Echium fundit ſuam nomenclaturam, à voce græco ἔχις Vipera, propter ſeminis formam.

Elatine καὶ ἀνλίφρασιν dicta videtur quod minime procera ſit.

Emerus, nomen fictum eſt, á Theophraſto.

Elychryſum currit ἀπὸ τῦ χρυσῦ ab auro & τῦ ἥλίκ Sole, quia aureum ſolis inſtar habet florem.

Equiſetum progreditur ab equo & ſeta, quia folia & rami Equiſetum referunt.

Erica, nomen deductum á verbo ἐρέικω frango quia ad calculum frangendum ſæpiſſime adhibetur.

Erucago ab Eruca, quaſi herba ad Erucam accedens.

Ervum, vocatur ab, ἐρέπτω edo, quia ab hominibus & brutis veſci ſolet.

Eryngium, á græca voce Ἐρύγιον, id eſt Barbæ capra, quia hujus plantæ ſummitates, antequam caulis & folia prorumpunt barbam capræ referunt, alii vero putant, nomen ſuum ſumpſiſſe ob ἐρύγην, eructatum quod capræ, ob hujus plantæ eſum, ingeſta vomitu exſerere ſolent.

Eryſimum dictum, ab ἐρύω, ſalvum conſervo, ob eximiam in medendo facultatem.

Euo-

Euonymus, nominatur, ab ἐυ bonum & ὄνομα nomen, quasi planta boni nominis.
Euphrasia, ab Euphragia vel á græco verbo ἐυφροσύνη quod animi lætitiam adfert & oculorum caliginem tollit.

F.

Fagopyrum, nomen habet á φάγω edo, & πυρὸς frumentum, ac si diceres Frumentum edule.
Fagus, ἀπὸ τ῀ φάγειν, á comedere, antiquis enim ejus fructus erat nutrimentum.
Filago dicitur á Filo, quia filis abundat.
Filicula, á Filice, parvam filicem denotans.
Filipendula, á pendeo & filo, quod radices ejus, quasi ex filo pendere videntur.
Filix, vocabuli hujus derivatio adhuc ignota.
Fœnum græcum, á Fœno & adjectivo græcus, quia in Græcia pecora eo saginantur.
Fragaria, á fragrantia odoris quem spirat. fructus.
Frangula, á frangendo, quod facile frangatur.
Fraxinella, á Fraxino quasi parvus fraxinus.
Fraxinus quod magis in asperis locis, montanisque fragis nascatur, hinc per derivationem Fraxinus.
Fucus, á græca denominatione φῦκος Fumaria, quia lubentissime in agris fimo pinguibus crescat.
Fungus, á Funere, quod vescentibus periculosissima sit esca.

G.

G.

Galeopsis, hoc nomen plantæ impositum est, á γαλῆ Felis, quod ejus flores faciem felis repræsentant.

Gallium á γάλα Lac, quia vim possidet Lac coagulandi.

Genista ita dicta, á Genu, quod valde flexilis sit.

Genistella, á Genista, ac si dicas parva Genista.

Gentiana, á Gentio, Illyricorum Rege, primo Virtutum inventore.

Geranium, ἀπὸ τῆς γεράνε á Ciconia, quia capsulæ seminales, rostro ciconiæ conferunt.

Gladiolus, nomen habet á Gladio, quia folia ejus gladii figuram habent.

Glaux, á glauco colore.

Globularia á vocabulo latino, Globus, dum flos globosus est.

Gramen nuncupatur á gradiendo seu progrediendo, quod geniculatis internodiis mirifice serpit novasque spargit radices.

Grossularia, dicitur á cute fructus grossa vel densa.

H.

Hedera, dici putatur, quod arboribus reptando ad hæreat.

Helleborus, παρὰ τὸ ἕλειν τῇ βορᾷ, quod esu perimat.

Helleborine, nomen accepit, ab Helleboro, á foliis nempe Helleboro similibus.

Heli-

Helianthemum, nuncupatur quasi ἄνθος, τῦ ἡλίυ, Flos solis, quia semper versus solem se flectere solet.

Heliotropium, dictum ab ἥλιος sol, & τρέπω verto, quia hujus plantæ summitas, soli obvertit.

Herba Paris, Vocis hujus derivatio nobis non constat,

Herniaria vocatur, ob Facultatem hernias curandi.

Hesperis vocem suam habet, ab Hesperide noctu olente.

Hieracium, ἀπὸ τῦ ἱέρακος, Accipiter, quia ab eo, ad acuendum visum devoratur.

Horminum, ejus nomenclatura ab ὁρμαίνω, impetu ferox, quod venerem stimulet.

Hyoscyamus, a græcis vocibus, ὗς sus, & κύαμος faba.

Hydrocotyle, ab ὕδωρ Aqua, & κοτύλη Cavitas, folia enim hujus planta intus sunt excavata.

Hypericum appellatur, ab ὑπερ super & ὀινόνας spectra, seu imagines, quia super has dominium habet.

I.

Iacea ortum suum habet, á jacere, quia humi sæpe jacet.

Iacobæa, quia circa diem St. Iacobi in optimo vigeat vigore.

Ilex, dicitur á verbo illicio, idem quod Illicium,

Im-

Imperatoria, nomen accepit ab effectu, ob raras nempe insignes virtutes, quibus præ multis aliis simplicibus pollet.

Iris, á cœlestis arcus similitudine, puta colorum diversitate.

Isatis græcam originem agnoscit ἰσάλης quod Glastum significat.

Iuncago, quasi planta ad juncum accedens.

Iuncus, á jungere, quia hac planta herbæ inter se fasciculatim junguntur.

Iuniperus nomen habet suum, quod juniores & novellos fructus pariat, antiquis maturescentibus.

L.

Lactuca, vox hæc, derivatur á Lacte, quia tota planta lacte turget.

Lamium, hoc nomen desumptum est, à pisce Lamia dicto, qui si iratus horrendum vultum refert.

Laserpitium, nominatum à Lasere.

Lathyrus, à græco vocabulo λάθυρον Cicercula, vel à λαθεῖν latere, forte quia fructus, siliqua inclusa latet.

Lens, à vocabulo lenis deductum, quod qui eo vescuntur, lenes ac moderati fiunt.

Lentibularia, quia ad lenticulam accedit.

Lenticula, dicitur à lente, quia folia ejus lenti assimilantur.

Lenticularia, à foliorum forma appellatur.

Leucanthemum, à λεύκος albus & ἄνθεμος Flos, quia florem habet candidum. quia

Leucojum, à λευκὸν album, & ἴον Viola proprie Viola alba.

Lichen, nomen hoc deduxit à Lichene morbo cutaneo, quia ad Lichenes ſanandos confert.

Liguſticum, Dioſcoridis mente, quod plurimum in Liguria naſcatur.

Liguſtrum, à lego quaſi leguſtrum.

Lilac vocabulum eſt Arabicum.

Lilium, à λεῖος lævis, quia folia ejus ſunt polita.

Lilium convallium, à λεῖος lævis & Valle, quia lævia habet folia & in convallibus frequenter creſcat.

Linaria, à lino, quia ſemen ejus molle eſt & valde leniens.

Lingua Cervina, à figura plantæ, cum lingua animalis.

Lithoſpermum, à λίθος Lapis & Sperma ſemen, ac ſi diceres ſemen lapideum.

Lonchitis, dicta à λόγχη Lanceæ, quia folia ejus acuta ſunt.

Lotus, à græco vocabulo λωτὸς dulcis.

Lunaria, à Luna, ob formam ſiliquarum ita nominata lunatam.

Lupulus, à Lupo, hominis ac pecoris infenſiſſimo hoſte, qui ſubter hunc frequentiſſime ſeſe abdere ſolet, ut eo melius rapto vivere poſſit.

Luteola, à luteo colore, pannos tingens.

Lychnis à græco vocabulo λύχνος Lumen quia flores ejus, radios luminis faciant.

Lyco-

Lycoperdon, à λύκος Lupus & πέρδω pedo, quasi crepitus Lupi.

Lycopus, nominatur à λύκος Lupus & πῦς pes, planta ad Lupi pedem accedens.

Lysimachia, nomen accepit, à Lysimacho Regis Siciliæ filio, qui hanc plantam primus inveniſſe fertur.

M.

Majorana, à μαραίνω, marceſco, vel quasi major ad vitam, quia vitam prolongari cenſetur.

Malus, à græco vocabulo, μῆλον aut ut alii volunt à μέλω ſano,

Malva, à μαλάζω emollio, quod tota planta vim habet emollendi.

Marrubium, ab hebraico vocabulo Marrob ſucco nempe amaro ſic dicto.

Matricaria nomen accepit à Matrice, quia hyſtericis utilis eſt.

Medica à græco vocabulo nomen nactum μηδικὸν vel à Media ut ait Plinius.

Melampyrum huic plantæ impoſitum eſt à μέλας niger & πυρὸς Triticum, propter ſeminis formam & colorem.

Melilotus nomen habet à μέλι Mel, & Lotus, quaſi Lotus mellitus.

Meliſſa, hoc nomine dicitur à μέλι Mel quod apes ex ea Mel exugere ſolent.

Melo creditur nomen traxiſſe à græca voce μῆλον quod pomum ſignificat.

Melo pepo, à græcis vocabulis μῆλον malum & πέπον genus cucumeris,

Men-

Mentha, videtur nomen ejus concinnatum esse inde, quod mentem percellat, alii vero putant derivationem suam habere à vocabulo græco μίνθος, quod ejus folia lanuginem habent gryseum.

Menyanthes vocis hujus origo debetur, græcis, μηνίανθος enim plantam significat paludosam.

Mercurialis, à Mercurio primo Inventore ita dicitur.

Mespilus, ab ἔπιμηλὶς, quia folia ejus, ubi sponte nascatur malo similia sunt.

Meum, à μύον, herba caule & foliis aniso non absimilis.

Millefolium salutatur, à multitudine foliorum

Morsus ranæ, quod Ranæ ejus morsu gaudeant.

Morus, à græco vocabulo, μαυρὸς niger, quoniam ipsius fructus, nigricantis sunt coloris, vel ut alii putant à Mora, sive tarditate florendi.

Moschatellina, à Moscho, quasi parva planta moschum olente.

Muscus, â μόσχος subtilis.

Myagrum, nomen ejus dependet à μυῖα Musca & ἀγρεύω capto, quasi planta Muscas capiens.

Myosotis, ex μὺος Mus, & ὠῖλας auricula, ob foliorum analogiam.

Myosuros, à μὺος Mus & οὐρὰ, cauda.

Myrrhis à Myrrha, quia Myrrhæ odorem de se spirat.

N.

Napus vocatur, à græco vocabulo νάπυ vel à νᾶπο.

Naſturtium, nomen tribuitur, à narium formento, quia ſternutare facit vel ut Varroni placet à torquendis naribus.

Nidus avis, à forma radicum inter ſeſe implicatarum, nidum avis repræſentante.

Nicotiana, à Iohanne Nicotio Regis Galliæ Conſiliario qui primus ex Lufitania in Galliam miſit.

Nigella potius Nigrella, ob feminis Nigredinem.

Niſſolia ab autore Niſſole Medico Monſpelienſi ita dicta.

Nymphæa à νύμφη Sponſa, quod aquoſa amet vel quod hæc planta aquæ ſit ſponſa.

O.

Ocimum, nomen eſt, ab ὠκέως cito, quod ſemen ejus cito è terra erumpit.

Oenanthe derivationem agnoſcit, ab οἶνη vitis & ἄνθος flos, quaſi flos vitis, potius quod cum Vite floreat.

Onagra ab οἶνος Vinum & ἀγρὸς ager, quia radix odorem habet vinoſum, alii ab ὄνος aſinus & ἀγρὸς ager, ob folia forſan ita dicta, cum auriculis aſini quoad longitudinem comparata.

Onobrychis ab ὄνος aſinus & βρύχω frondeo, quia hujus plantæ odor, aſinos rudere facit.

Ophio-

Ophiogloſſum, ab ὄφις ſerpens & γλῶσσα lingua, quia ſerpentis linguam refert.

Ophris ſupercilium ſignificat, quo nomine dicta eſt, dum capillis nigredinem inducit.

Opulus, quod Viti fiat opem.

Orchis ab ἐράω appeto, quia radix ejus deglutita, Venerem ſtimulat. potius à græca denominatione ὄρχη, Teſticulus, hinc planta à radicum forma, ſic dicitur.

Oreoſelinum, ὄρος Mons & σέλινον apium, id eſt Apium montanum.

Origanum, ab ὄρος Mons & γάνος Lætitia ſeu planta quæ montes amat.

Ornithogalum ab ὄρνις avis & γάλα Lac, quia florés ejus, tam albi ſunt inſtar animalium plumiferarum.

Ornithopodium à vocibus græcis ὄρνις avis & πούς pes.

Orobanche ab Ervi ſtrangulatu nomen adepta eſt, nempe quod ὄροβον ἄγχει orobum aliaque legumina ſtrangulat.

Orobus, appellatur à græcis ἕρεπτω edo & βοῦς bos, antiqui enim Orobis, boves ſaginare ſolebant.

Osmunda, quid ſibi nomen velit, me neſcire profiteor.

Oxycoccus à fructus colore & ſapore ita dicitur.

Oxys à græco vocabulo ὀξὺς acidus, quia ſaporem habet acidum.

P.

Panicum nominatur à Pane, quia olim ab illo Panis confectus fuit, alii putant nomen accepisse à paniculis suis.

Parietaria, ob locum quem amat, sic dicta, lubentissime enim circa parietes provenit.

Parnassia à monte Parnasso, in quo abunde crescit solet.

Pastinaca, à pascendo, vel à pastu, quia radix ejus comeditur.

Papaver, à Pappa, pultis specie, cui semen papaveris olim immiscebatur vocatur.

Pedicularis, dicitur à sua facultate quam possidet, pediculos enecandi, Dodonæus autem existimat sic denominari, quod pecori ac jumentis, quæ ea pascuntur pediculorum copiam gignat.

Pentaphylloides, agnoscit suam derivationem à πέντε quinque & φύλλον folium, unde pentaphylloides, quasi planta Quinquefolio similis.

Persica, nomen habet à Perside orientis regione, unde hoc arboris genus, in nostrum orbem est advectum.

Persicaria, à Persica, quia ejus folia Persicæ assimilantur.

Pervinca, à vincendo, quod vinceret pervinceretque injuriam temporis, ac semper vireat.

Petasites, nomen à πετάω, quia ejus folia valde sunt extensa, sive à Petaso, ob foliorum formam & amplitudinem.

Pepo,

Pepo, à græca voce πέπων, quod genus cucumeris significat.

Peucedanum, à græco vocabulo πεύκη Pinus quia ejus folia cum pinifoliis similitudinem quandam habent.

Phalangium, dictum à virtute phalanges digitorum curandi male affectos.

Phellandrium nuncupatur, à φελλεύω fluctuo sub mari & ἀναδρεύομαι virile robur assumo, quia in aquis crescendo viriliter se erigit.

Pimpinella quasi Bipinella, à foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim congestis.

Pinguicula, à foliorum crassite atque pinguedinosa quasi substantia.

Pisum, à Pisa urbe Italiæ, in quo loco olim copiosissime nascebatur.

Plantago, vocatur à planta, quia plantis pedum juxta vias conculcatur.

Plantaginella, quasi Plantago minima seu herba ad plantaginem accedens.

Polium à voce græca πολιὸς incanus quasi herba incana.

Polygala, à πολὺ multum & γάλα lac, quasi herba lac augens.

Polygonatum à πολὺ multum & γόνυ genu, quia gaudet pluribus geniculis, seu quod radices & caules habeat geniculatos.

Polygonifolia vocatur à foliis cum poligonifoliis similitudinem quandam habentibus.

Populago, quia juxta ripas & fossas sub populo erescit,

Populus à populo quod ex ejus calce multi naſcantur.
Porrum, dictum quod porro eat & longe lateque graſſetur.
Portulaca, quaſi porcellorum λάχανον, olus.
Potamogeton à ποταμὸς fluvius & γείτων vicinus, quia fontibus & præſertim fluminibus vicina eſt.
Primula veris, à primo vere, quia ineunte vero & ante illud tempus floret.
Prunella, dicta ab effectu, quia in angina die Bräune, præſtat magnam opem.
Prunus, à græco vocabula πρύνη.

Q.

Quercus, quæ ſit nominis ratio obſcura eſt putant quidam à κέρχω exaſpero quia cortex ejus aſper eſt.
Quinquefolium à quinto foliorum numero quia quinque folia habet πέντε enim quinque & φύλλον folium ſignificat.

R.

Ranunculus à ranis nomen accepit, quia eorum ſtabulum eſt.
Rapa, à rapere, quia à prætereuntibus ex agro ſæpiſſime rapiuntur.
Raphaniſtrum, dicitur à Raphano, quia radix ejus minorem raphanum refert.
Raphanus dicitur, à ῥάδιος facilis & φαίνω appareo, quaſi planta facile apparens.

Rapiſtrum, à foliorum ſimilitudine cum Rapo.
Rapunculus dictus, quaſi Rapum parvum, dum Radix ejus minor eſt Rapo.
Rhamnus à ῥάμνος ſpina, quia frutex eſt ſpinoſus, ſpinis enim non ſecus ac gladius pungit.
Ribes vox eſt Mauritanica.
Roſa, à græco vocabulo ῥόδον, quod largum odoris effluvium emittat.
Ros ſolis, à guttis roris, quia folia ejus ſub maximo ſolis ardore madent.
Rubeola quaſi exigua Rubia.
Rubia, à rubro colore nuncupatur, quod radix ejus inficiat rubro colore, ſeu quod cum radice lanæ tingantnr.
Rubus, à rubro colore, quia fructus rubeſcit.
Rubus Idæus, à monte Idæo ſic dictus.
Ruſcus, hujus fruticis nomen, unde derivatur Autores inter ſe non conveniunt, plerique exiſtimant. à vocabulo ruſticus.
Ruta à ῥύω ſervo quia ſanitati conducibilis eſt.

S.

Sabina à belgica voce Sabin. quod ſeptem ſignificat.
Salicaria, dicitur à Salice, quia ſub ſalice lubenter creſcit.
Salix à Saliendo nominata, quod celeriter creſcat ut ſalire videatur.
Salvia nominatur à ſalvando, quod plurimis morbis opitulatur.

Sambucus, ab inſtrumento muſico Sambuce dicto.
Samolus, derivatio ignota.
Saxifraga quaſi ſaxifrangus, quod è fiſſuris rupium erumpat.
Scandix à græco vocabulo σκάνδιξ acus paſtoris, à ſemine acum referente.
Scirpus, veteribus audit luncus enodis, unde proverbium Nodum in ſcirpo quærere.
Sclarea, à σκλήρος durus vel ſiccus, quia hæc planta caulem habet durum ac ſiccum.
Scrophularia, ab effectu ita dicta, ſcrophulis enim medetur.
Secale dictum à ſecando.
Sedum, à ſedendo, quia in muris ſedit.
Serpillum ab ἕρπω ſerpo, quia planta repens eſt
Sideritis à σίδηρος ferro, quod ad vulnera ferruminanda utilis, ſeu quod vulnera ferro inflicta couglutinat.
Sinapi originem ſuam habet à vocabulo σίνηπι, quod herbam valde acrem ſignificat, cum ejus ſemen comedenti lachrymas cieat.
Siſymbrium, à σίον & ὄβρος quia hæc planta in locis aquoſis provenit, alii putant nomen ſumpſiſſe à verbo σείω moveo, quia aquis innatans fluctuat & à vento facile movetur.
Smilax, à σμάω rado, quia planta eſt aſpera.
Solanum, dictum ab effectu, ſomniferum lethale vel à ſolare, quia dolores intenſos ſiſtat.

Sol-

Soldanella, unde ejus nomen, hodie ignotum.

Sonchus, à græco vocabulo σόγχος παρὰ τὸ σῶον χέειν, quia hæc planta ſabubrem ſuccum fundit.

Sorbus, nominatur, à Sorbere, quia fructus ſi maturus, mollis ſit, ut ſorbere poſſit.

Sparganium, à græca voce σπάργανον faſciola, quia ejus folia, faſciolum referunt.

Spinachia, arabicam originem agnoſcit Hiſpanach, alii vero derivant à ſemine ſpinoſo.

Spondylium, ab inſecto, quod ſpondylis nomen habet, quodque amabilem rubrum colorem tingere facit.

Stachys, à græco vocabulo στάχυς ſpica, quia ejus flores in ſpicam ſunt congeſti.

Staphylodendron, à σταφυλὴ uva & δένδρος arbor uvæ, quia ejus folia & fructus in racemos ſunt diſpoſiti.

Stellaria quia ſummitates foliorum, ſtellam repræſentant.

Stramonium, nominis hujus derivatio ad huc non conſtat.

Symphytum à σὺν cum & φύω adnaſcor, quia hæc planta vim habet conſolidandi.

Stœchas, ab Inſulis maris mediterranei, Stœchades dictæ ita nominatur.

T.

Tamariſcus à Tamarice per appoſitionem ſcus vocabulum natum eſſe videtur.

Tanacetum, à vocabulo Athanaſia, quod Herbam ſignificat immortalem, ortum ſuum duxiſſe æſtimatur.

Taxus à τόξα Venena, quia hæc arbor venenoſa eſt.

Teucrium, à Teucro, Ajacis fratre inventore.

Thalictrum, à vocabulo græco θάλλω vireo quaſi planta vireſcens.

Thlaſpi, à θλάω premo, quod fructus ejus planus & compreſſus ſit.

Thymelæa, à θύμη ἐλαία Thymi olea, quia folia ejus Thymo ſimllia.

Thyſſelinum, à θύω ſuffio & σίλινον apium, ac ſi diceres, apium ſuaveolens.

Tilia à τῖλον pluma mente Bœrhav.

Tithymalus, à τιθὴ Mamma & μαλακὸς tener, quaſi tenera mamma, quia lac fundit.

Tormentilla ab effectu, quæ tormina ventris ſedat.

Tragopogon, à τράγος Hircus & πώγον barba nomen ſibi adſcivit, quia ſemen ejus adhuc incluſum barbam hirci refert.

Tragoſelinum, τράγος Hircus & σέλινον petroſelinum, quia folia petroſelino ſimilia ſunt & ab hircis devorantur.

Trifolium, à foliorum terno numero.

Turritis, à forma Turris, quia in faſtigium inſtar turris, cacumen ejus tranſit.

Tuſſilago à virtute ejus, ad tuſſim ſedandam

Typha à græca denominatione τύφη à ſceptro, regum

regum aureo, quod ante primos Magiſtratus geſtatur vel à λύφος quod locum paluſtrem denotat.

V.

Valeriana, nomen hoc deducitur à Verbo latino Valeo, quod viribus eximiis valere æſtimatur, alii putant à Valerio autore ita dici.

Valerianella, nuncupatur, quaſi exigua valerina.

Veratrum, ab avertere, quod mentem avertat.

Veronica, quaſi Vere unica inter plantas, ob virium robur ſic dicta.

Verbaſcum, quaſi Barbaſcum.

Viburnum, à Viurno ſeu viere.

Vicia, à vincendo quod item ut Vitis capreolos habeat, quibus ſurſum verſus ſerpitret vel à vocabulo Vitium quod inter frumenta ſit vitium.

Viola, nomen accepit, à violando, quod manibus dum decerpitur violetur.

Virga aurea, quia caulis virgæ in modum, ramosque & flos ejus aureum habeant colorem.

Viſcum, dicitur, à viſcoſitate quia fructum fert glutinoſum & viſcoſum.

Vitis, à Vieo flecto, quia Vitis capreoli apprehendunt plantas vicinas.

Vitis Jdæa, à Vite & Ida, quia inſtar Vitis

tis ſcandit & in monte Ida creſcendo invenitur.

Ulmaria, ab Ulmo, à foliorum ſimilitudine.

Urtica, ab urendo, quia ſi tangatur valde urit.

Ulmus apellatur, ab uliginoſis locis, in quibus lubenter provenit.

Uva urſi, quia ejus fructus uvæ ſimilis, & ab Urſis veſci ſolet.

Vulneraria, à vulnere, quia ad vulnera adhibetur.

X.

Xanthium à græco vocabulo ξάνθος flavus, quia capillos flavo colore obducat vel tingat.

S. D. G.

IN-

INDEX.

A.

Abies Taxi folio. 38
— tenuiore folio. 39
Abrotan. caulicul. albic. 269
— — rubent. 259
— Linifolio. 202
— Mas, 260
Abſinthium montan. 203
— vulgare. 202
— pontic. tenuifol. incanum. 260
Acacia germanic. 28
Acanthium vulgare. 215
Acer major. 39
— minus campeſtre. 15
— montan. candid. 4
— platanoides. 39
Acetoſa alpina. 108
— arvenſis lanceol. 39
— — — anguſtifolia. 39
— — non lanceolata. 203
minima. 39
hortenſis rotundifol. 108

Acero-

Acetosa lanceolata elatior. 108
— pratensis fol. crisp. 40
— — vulgar. 40
Acetosella. 27
Aconitum cœrul. 260
— lycocton. lut. 108. 260
Acorus adulterin. 65
— verus. 40
Adjantum alb. 139
— aureum. 173
— nigrum. 138
Adonis flos, citrin. flore. 30
— — phœnic flore. 30
Agaricus auriculæ forma. 203
— betulinus. 203
— esculentus. 272
— digitatus niger apicib. albidis. 260
— digitatus niger. 261
— fraxineus niger. 109
— intybaceus. 108
— lamellatus. 203
— lichenis facie variegat. 203
— officinali similis. 203
— pedis equini facie. 203
— porosus rubens. 203
— spuamosus. 109
— tubæ Fallopianæ instar. 273
Agrimonia officinar. 109
Alcea foliis rotundis. 109
— hirsuta. 204
— major. 109

Alcea vulgaris. 109
Alchimilla erecta gramineo fol. 40
— linariæ fol. 40
— montana minim. 40
— ſupina gramin. fol. 110
— vulgaris. 110
Alga bombycina. 111
— fontalis trichodes. 110
— tenuiorib. filament. 110
— virid. capillac. fol. 110
— vulgatiſſim. & longiſſ. 110
Alkekengi. 111
Alliaria. 22
Allium montan anguſtifol. 111
— — bicorne. 204
— — capite rotund. 111
— Sativum. 41
— ſativ. alterum. 41
— ſylveſtre latifol. 41
— urſinum. 41
Alnus alpina minor. 5
— nigra baccifera. 59
— rotundifol. glutinoſ. 4
— — fol. incano. 5
Alſinaſtrum ſerpillifol. 41
Alſine altiſſima nemor. 111
— aquatica media. 112
— arenaria. 113
— baccifera. 224
— fluviatilis. 99
— geniculata. 204

Alſine hyperic. fol. 112
— maxima ſolanifol. 113
— media vulgaris. 15
— minor multicaulis. 112
— — capitul. lini. 112
— muſcoſa. 113
— paluſtr. fol. gramin. 113
— — minor. 205
— — repens. 268
— — rotundifol. 204
— — tenuifolia. 205
— plantagin. fol. 111
— pratenſ. graminifol. ampliore. 16
— — — anguſtiore. 16
— puſilla graminea. 204
— — flore tenuiſſ. 16
— ſaxatilis fol. longiſſ. 41
— — multiflor. 113
— tenuifol. 41
— ſpergulæ facie. 13
— ſpergula major. 204
— — minor. 112
— — minima. 41
Alſinoides paludoſa. 270
Althæa dioſcorid. 205
Alyſſum flore purpur. 231
— fœtid. 113
— incan. fruticoſ. 16
— — lut. ſerpillifol. 16
— montan, incan. pereunc. 205.

Alyſ-

Alyſſum ſegetum fruticoſ. 16
—— —— foliis acut. 114
—— ſerpillifol. 114
—— veronic. fol. 16
—— vulgare polygonifol. 1
Amara dulc. 98
Amaranthus luteus. 227
Amygdalus amara. 17
—— dulcis. 17
—— nana. 17
Ammi majus. 206
—— perenne. 206
Anacampſeros flore alb. 206
—— —— purpur. 206
Anagallis aquatica major. 199
—— —— minor. 200
—— cœrulea. 43
—— lutea nemorum. 69
—— paludoſa. 43
—— phœnicea. 43
Anblatum. 114
Anemone ſylveſtris. 43
Anethum hortenſe. 43
Angelica pratenſis altera. 114
—— —— apii fol. 206
—— ſylveſtris. 114
Aniſum. 206
Anonis ſpinoſa alb. flore. 115
—— —— purpur. 114
—— —— erecta. 115
—— ſpinis carens. 115

Anonymos Clus. 28
Anſerina. 83
Anthyllis leguminos. 202
Antirrhin arvenſe majus. 43
—— —— minus. 164
Aparine latifol. montan. 43
—— ſemine lævi. 43
—— —— minore. 215
—— ſupina pumila. 44
—— vulgaris. 115
—— ſemine minori. 43
Aphaca. 207
Apium anif. dict. 206
—— criſpum. 207
—— hortenſe. 207
—— montan. 247
—— paluſtre. 207
—— petroſelin. 207
Aquifolium ſpinoſ. 44
—— non ſpinoſ. 44
Aquilegia hortenſ. 45
—— ſylveſtris. 44
Arenaria. 113
Ariſarum. 45
Ariſtolochia clematit. recta. 207
—— vulgaris purpur. 8
Arnica. 134
Artemiſia tenuifol. 70
—— vulgar. caule purpuraſcente. 260
—— —— viridi albicante. 261
Arum paluſtre. 45

Arum vulgare macul. 45
— — non macul. 45
— — macul. nigr. 45
Arundo vulgaris. 261
Aſarum american. 17
— vulgare. 17
Aſclepias albo flore. 45
Aſparagus ſativus. 115
— vulgaris. 116
Aſplenium. 116
Aſter arvenſ. cœrul. 116
— atticus vulgare. 207
— canadenſis annuus 259
— montanus luteus ſalicis fol. 116
— omnium maximus. 116
— paluſtris luteus laciniatus. 116
— — lanuginoſus. 208
— — parvo flore. 261
— pratenſ. autumnal. 261
Atriplex anguſto oblongo fol. 208
— anguſtiſſ. fol. 208
— folio haſtato. 208
— hortenſ. alb. 208
— rubra. 208
— fœtida. 219
Aſtragaloides. 219
Aſtragalus luteus. 117
— florib. viciæ. 117
Aſtrantia. 147
Avena alba. 118
— fatua. 147

Avena nigra. 118
— pilosa. 147
Auricula muris pulchro flore. 113

B.

Ballote. 185
Balsamina lutea. 118
Barba capræ. 118
— florib. compact. 202
Barbarea. 97
Barbarea mural. 104
Bardana. 240
Beccabunga. 200
Belladona. 118
Bellis cœrulea. 61
— major. 161
— sylvestris media. 45
— — minor flore albo. 5
— — — mixto. 5
— — caule fol. hirsut. 66
Berberis dumetor. 46
Beta alba. 119
— rubra. 119
Betonica alb. 119
— aquatica. 188
— arvens. annua. 209
— coronaria. 124
— purpurea. 119
— minus ramosa. 125
Betula. 46
Bidens fol. non dissect. 209
— tripartit. divis. 209

Bidens fol. non diſſect. tripartit. diviſ. caule purpuraſc. 209
Bifolium. 73
Biſtorta radic. maj. intort. 209
——— minus intorta. 209
Biſtorta alpina maxima. 210
——— minor. 210
Blattaria. 210
Blitum alb. majus. 210
——— minus. 211
— ſylveſtre. 210
Boletus eſcul rugos. albicans. 46
——— ——— fulvus. 46
— in metam faſtigiatus. 17
— phalloides. 18
Bonus Henricus. 51
Borrago minima. 26
Botrys verticillata. 217
Branca urſina. 193
Braſſica alb. criſpa. 46
— alpin. perenn. 47
— arvenſis. 46
— campeſtris perfol. 5, 119
— cauliflora. 47
— fimbriata. 47
— gongylodes rapo longiore. 47
——— ——— rotundo. 47
— rubra. 46
——— — criſpa. 47
— viridis. 47
Brunella cœrul. flore magn. 120

Brunella cœrul. flore folio laciniat. 119
——— major fol. non diſſecto. 119
——— flore porpuraſc. 119
Bryonia aſpera. 47
— nigra. 100
Bubonium lut. 116
Bugloſſoides Echiifol. 120
Bugloſſum anguſtifol. maj. 120
——— arvenſe annuum. 121
Bunias ſylveſtr. 26
Buphthalm. tanacet. min. fol. 211
Bupleurum fol. ſubrot. 211
——— montan. latifol. 121
——— perfoliat. 211
Burſa paſtoris major. fol. ſinuat. 6
——— ——— non ſinuat. 6
——— media 6
——— major loculo oblongo 1
——— minim. 26
Butomus 121
Buxus arboreſc. fol oblong. 6
— — pictis. 6
— — rotund. 6

C.

Cacalia. 121
tomentoſa. 122
Cacubalus. 224
Calamintha humilior folio rotundiore. 18
— pulegii, odore. 212
— vulgaris. 212

Calamus aromatic. 40
Calceolus Mariæ. 122
Campanula alpin. latifol. 213
— — linifol. 213
— — rotundifol. 213
— arvenſis erecta alba. 122
— — cœrul. 122
— — procumbens. 48
— — ſingularib. florib. 213
— hortenſis. 123
— nemoroſa magno flore. 122
— — parvo flore. 123
— perſicæ fol. 123
— pratens. flore conglomerat. 212
— pyramid. altiſſim. 213
— radice eſculent. 48
— urticæ fol. 212
— — flor. alb. 212
Cannabina aquatica. 209
Cannabis erratica. 214
Cannabis ſativa. 213
— ſylveſtris. 230
Caprifolium german. 48
— perfoliat. 48
— non perfol. Bœrhav. 49
— non perfol. foliis ſinuoſis. 49
— — — variega-
— tis. 48
Cardamine annua exiguo flore. 50
— flore majore elatior. 49
— pratenſis magno flore albo. 49

Cardamine pleno. 49
— purpurascente flore. 49
— quarta Dalechamp. 18
Cardiaca. 244
Carduus Acanthoid. 214
— benedictus. 224
— capite rotund. 215
— caule crispo. 214
— fullon. 226
— hæmorrhoidal. 222
— lanceolat. 214
— Mariæ. 214
— nutans. 214
— palustr. 222
— pratensis. 224
— stellatus. 215
— tomentos. 215
Carlina acaulos magno flore. 215
— caulescens. 215
— sylvestr. 215
Carpinus vide omissa.
Carthamus offic. 216
Carvi. 216
Carvifolia. 216
Caryophyllat. alpin. 123
— aquatica. 18
— vulgaris. 18
— — flore majore. 18
Caryophyllus arvens. umbellif. 15
— flore tenuissime dissect. 124

Caryophyllus montan. 124
— sylveſtr. barbat. 125
— — humilis. 124
— — lanuginos. 125
— — latifol. 125
— — prolifer. 124
— — plumarius. 261
— vulgar. latifol. 124
— — anguſtifol. 124
Caſſida paluſtr, cœrul. 216
— minim. 216
Caſtanea equina. 65
— ſativ. 50
Cataputia. 101
Cataria major vulgar. 125
Caucalis anglica ſab. 229
— arvenſ. ehinata magn. flore. 216
— — parvo flore. 217
— foliis chærefol. 128
Centinodia. 250
Centaurium minus alb. 217
— — purpur. 217
— — ramoſiſſimum. 217
— luteum. 125
Cepa aſcalonica. 126
— fiſſilis. 125
— juncifol. 125
— minor. 126
— ſectilis. 125
— vulgaris oblonga. 126

Cepa vulgaris tunica purpuraſc. 126
—— —— candid. 126
—— tenuifol. ſphærocephalos. 126
Ceraſus fructu albo dulc. 19
—— magn. cordat. 20
—— parvo amaricante. 19
—— major ſylveſtris. 19
—— pumila. 19
—— racemoſa fructu non eduli. 19
—— ſerotina fructu acido. 19
—— ſylveſtr. amara. 19
Cervaria nigra. 247
Ceterach. 116
Chærophyllon ſativ. 51
—— ſylveſtre. 51
—— —— ſemine brevi. 128
—— —— geniculat. 128
Chamæbalanus. 66
Chamæbuxus. 25
Chamæceraſus alpin. 50
—— fructu rubro. 19
—— dumetor. 50
Chamædrys fruticos. 217
—— laciniat. fol. 217
—— major alpin. 127
—— minor. 127
—— paluſtris. 126
—— ſpuria anguſtifol. 105
—— minor. 105
Chamægeniſta. 128
Chamelinum. 42

Cha-

Chamæmel. fœtid. 127
— inodorum. 127
— vulgare. 50
Chamæmeſpilus. 71
Chamænerion glabrum maj. 218
— — minus. 218
— villoſum magno flore. 218
— — parvo flore. 218
— vulgare latifol. 218
Chamæpythis lutea. 127
Chamæſpartium. 128
Chelidonium majus. 51
— — laciniat. flore. 51
— minus. 57
Chenopodium. 219
— anguſtifol. 219
— betæ fol. 220
— coma purpuraſcente. 219
— — vireſcent. 219
— fœtidum. 219
— folio laciniat. 219
— — coma purpuraſc. 219
— — — 219
— — oblongo. 220
— — ſinuato. 220
— — triangul. 51
— latifol. 51
— pes anſerin. 1. Tab. 219
— — 2. Tab. 220
— opuli fol. 220

Cheno-

Chenopodium ſtramon. fol. 220
Chondrilla cœrulea. 239
— Sonchifol. flore luteo. 220
— — purpuraſcente. 221
— juncea. 128
Chriſtophoriana. 52
Chryſanthem. fol. minus ſecto glauco. 221
Chryſoſplenium fol. ampl. 6
— pedicul longis inſident. 7
— — — rib. ſubrotund. 7
Cicer ſylveſtre. 117
Cichorium anguſtifol. 129
— latifol. 129
— criſpum pratenſe lut. 128
— ſativum flor. alb. 129
— — cœrul. 129
— ſylveſtr. cœrul. 128
— — alb. flore. 129
Cicuta aquat. Wepf. 254
— fœtid. 129
— major. 129
— minor. 130
Cicutaria alba. 72
— aquatica. 178
— rubr. 72
— latifol. hirſut. 72
Circæa lutetiana. 221
— minima. 221
Cirſium acaulos. 222

Cir-

Cirsium arvense sonchifol. flore purpuras. 221
— — albo. 222
— — radice re-
— pente. 222
— pratense asphodel. radic. 222
— singularib. capitul, 52
Clematis Daphnoid. 27
Clematitis sylvestr. latifol. dentata. 223
— foliis non incisis. 223
Clinopodium arvens. ocymi facie. 223
— — origano simile. 223
Clymenum Parisiens. 223
Cnicus pratens. acanthi fol. flore flavesc. 223
— purpur. 224
— sativus. 216
— sylvestr. hirsut. 224
— vulgaris. 216
Cochlearia fol. cubitat. 52
Colchicum commune. 270
— — flore albo. 270
— montan. angustifol. 270
Conferva Plin. reticulata Dillen. 111
Colutea siliquos. 135
Consolida Genevens. 48
— major alb. flore. 99
— — purpur. flore. 90
— palustris. 238
— pratens. media. 48
— regalis. 134
Convolvulus major alb. 130
— minor arvensis. 139

Convolvulus anguſtifol. 130
— fiore arbo. — 130
— — cum umbilic. purpur. 130
— — — 130
— — candido 130
Conyophyllon. 72
Conyza cœrulea. 116
— linariæ fol. 131
— major vulgar. 224
— media. 261
Coralloides abietina. 273
— albida. 262
— altera. 57
— cornicul. candid. ſim. 271
— — coccineis. 271
— cornu cervin. 273
— flava. 224
Corallina fœnic. fol. 131
Coriandrum majus. 131
Cornus hortenſ. mas. 3
— ceræ colore. 3
— fructu albo. 3
Coronilla herbacea. 132
— major. 135
Coronopus hortenſ. 131
Corylus ſativa fructu minore. 2
— — oblongo albicante. 2
— rubente. 2
— — rotundo maximo. 3
— ſylveſtris. 2

Cory-

Corylus latiore folio. 2
Cotoneaſter. 71
Cotula fœtida. 127
Cotyledon aquat. 206
Cracca major. 106
— minor. 106
— Rivini. 106
Cratægus fol. laciniat. 52
— ſubrotundo. 53
Crepitus Lupi. 268
Criſta galli fæmia. 82
— flore rubro. 82
— Mas. 82
Cruciata hirſuta. 53
— minima. 132
— paluſtr. 131
Cuculi flos. 68
Cucumis flexuoſus. 53
Cucurbita major. 177
Cucurbita vulgaris. 177
Cucumis vulgaris. 53
— fructu alb. 53
Cuminum pratenſe. 216
Cupreſſus Mas. 7
— Fœmina. 7
Cuſcuta major. 224
— minor. 225
Cyanus ſeget. flore albo. 53
— albo. 53
— diſco cœrul. 53

Cydonia fructu brevi. 54
— oblongo. 54
Cymbalaria. 24
Cynogloſſum majus. 54
Cynoſorchis delphin. 74
— fœmina. 74
— latifol. 78
— — altera. 79
— — major quarta Tab. 75
— — maculat. 78
— — trifolia. 79
Cyperinum paluſtre minus. 55
Cyperoides latifol. ſpica rufa. 55
— — ſpadicea viridi. 55
— foliis caryophyll. ſpica oblonga. 54
— rariorib. veſicis. 20
— minus ſpica denſiore. 56
— ſpica pendula. 132
— breviore. 55
— longiore. 55
— paluſtre maj. 55
— aculeat. 56
Cyperus gramineus. 133
Cyperoides polyſtachion. 54
— lanuginoſum. 55
— flavicans. 56
— ſylvarum tenuius ſpicat. 54
— ſpica parva. 54
— ſpica varia. 20
Cyperoides humile. 132

Cyperoides nemorense spicis variis. 20
— nigro luteum vernum majus. 20
— — minus. 20
Cyperus maritimus. 133
— minim. panicul sparsa nigricante. 133
— — subflavescente. 133
— rotundus. 132
— vulgatior. 132

D.

Daucus annuus minor. 225
— officinar. 133
— sativus. 134
Delphinium seget. 134
Dens leonis ampliff. fol. 21
fol. anguftiore. 56
— — canescentib. 225
— — hirsuto. 225
— — latiore. 20
— — minimis foliis. 56
— — minor fol. radiat. 56
— — minus villoso. 57
— — qui Pilosella officinar. 56
Dentaria heptaphyll. 57
— pentaphyll. 57
Digitalis flore candid. 57
— luteo magno. 57
— purpur. 57
— minima. 134
Dipsacus fol. laciniat. 226
— sativus. 226

Dipſacus ſylveſtris. 227
Dipſacus fol. lacin. capitulo minore. 227
Doronic. plantagin. fol. 134
—— radice ſcorpii brachiata officinar. 58
Dracunculus aquatic. 45
Dulcamara. 98

E.

Ebulus. 94
Echinophora flore magn. 216
—— parvo. 217
Echium majus. 135
—— ſcorpioides. 166
—— vulgare. 166
Elæagnus. 33
Elatine Mas. 165
— fœmina. 165
— fol. ſubrotund. 165
Elichryſum montan. anguſtifol. 227
—— citrin. latifol. 227
—— purpur. 58
—— longo fol. & flore. 58
—— flore rotundiore candid.
—— 58
—— ſub purpureo. 58
—— germanic. 227
—— ſpiçatum. 227
Emerus major. 135
— minor. 135
Endivia ſativa. 129

Endi-

Endivia ſativa fol. criſpis. 129
— vulgaris. 129
Enula. 116
Epilobium. 135
Epimedium. 136
Epithymum. 225
Equiſetum aquat. maj. 136
— fœtid. majus. 227
— tenuior. ramulis. 228
— foliis nudum ramoſum. 136
— non ramoſ. 136
— minus variegatum. 136
— paluſtre brevior. ſetis. 136
— longior. ſetis. 136
— longiſſ. ſetis. 7
— ſylvatic. tenuiſſ. ſetis. 58
Erica vulgar. 137
— glabr. flore albo. 137
Eruca paluſtris minor. 98
— ſylveſtris major. 137
— tenuifolia. 137
Eryngium arvenſe. 206
— vulgare. 139
Eryſimum alterum ſiliq. Erucæ. 137
— vulgare. 228
Eſula exigua. 257
— major. 196
— minor. 196
— officinar. 35
— rotunda. 196
— ſoliſequa. 196

Eupatorium cannabin. 138
Euphrasia officin. 228
— parva purpur. 176
— minus ramosa. 228
— ramosa patens. 228
Euonymus vulgaris. 59

F.

Faba major. 228
Fabaria officinar. 206
Fagopyrum scandens altiss. 229
— vulgare. 229
— erectum. 229
Fagus. 21
Farfara. 13
Ferrum equin. 59
Filago altera. 138
— incana. 138
— minor. 262
— vulgar. 138
Filicula quæ Adiantum. 138
— fontana major. 139
— minor. 139
— lutea. 140
— petræa. 140
— saxatilis. 139
Filipendula aquatic. 174
— vulgaris. 139
Filix Mas ramosa major. 139
— minor. 141
— non ramosa. 139

Filix minor non ramosa. 140
— mollis. 140
— querna. 140
— ramosa dentata. 140
— non dentata. 140
— rhætica dentata. 140
— tenuissime secta. 141
Flos Adonis. 30
— Cuculi. 68
Fœniculum aquatic. 246
— sylvestre. 229
— peucedani fol. 229
— stellatum. 99
Fœnum græcum. 141
— sylvestre. 117
Fragaria fol. hispid. 59
— sterilis. 21
— vulgaris. 59
Frangula. 59
— montana pumila. 59
— saxatilis. 59
Fraxinus excelsior. 21
— humilis. 21
Fucus ferulaceus. 131
— fluviatilis. 230
— tubulosus. 230
Fumaria bulbosa cava, flore rubescente. 8
— niveo. 8
— non cava major. 8
— minor. 9
— minima. 9

Fumaria purpur. flore. 8
Fungioides. 141
Fungus albus acris. 230
—— angulosus. 230
—— auricularis. 263
—— betulaceus. 141
—— campestr. albus. 263
—— corylæus. 271
—— crassus. 230
—— erynus. 272
—— esculentus. 21
—— fimbriatus. 21
—— fluviatilis. 230
—— igniarius. 223
—— in metam fastigiatus. 263
—— juniperinus. 264
—— latus orbicular. candid. 273
—— luteus magnus. 263
—— pallidus. 230
—— maximus. 274
—— muscas interficiens. 271
—— orbicularis exalbidus. 21
—— paluſtris. 273
—— pallidus. 141
—— pernicioſus. 263
—— pileolo lato. 141
—— rotundo. 262
—— rotundiore. 141
—— pediculo longiſſimo insidente. 262
—— puniceo. 262

Fungus planus orbicular. 263
—— plurib. ex pedicul. naſcentibus. 230
—— quercetis innaſcens. 273
—— ſambucinus. 203
—— umbilic. referens. 263

G.

Galeopſis flore luteo. 60
—— fol. caulem ambiente major. 22
—— —— minor. 23
—— iners flore albo. 23
—— purpur. 23
—— minor. 23
—— paluſtris beton. fol. 232
—— patula ſeget. alb. 231
—— purpur. 231
—— procerior flore candido. 231
—— — flaveſcente. 231
—— — purpureo. 231
—— purpurea fœtid. 23
Gallium album. 131
—— album ſupin. 141
—— vulgare. 131
—— arvenſe. 242
—— flore flaveſcent. 142
—— luteum. 142
—— montan. 142
Geniſta humilis. 128
—— ramoſa fol. hyperic. 143
—— ſpartium majus. 142
—— minus. 143

Geniſta tinctor. 142
—— anguſtifol. 142
Geniſtella herbacea. 128
—— piloſa. 143
—— ſagittata. 143
Gentiana alpina verna major. 143
—— autumnalis. 232
—— ramoſa. 233
—— cœrulea oris piloſis. 263
—— cruciata. 232
—— lutea 232
—— pratenſis lanuginoſ. 263
—— purpurea major. 232
Gentianella minor verna. 143
Geranium batrachioid. flore cœruleo. 144
—— cicutæ fol. flore alb. 60
—— —— rubr. 60
—— inodor. 22
—— moſchat. 61
—— columbin. fol. diſſectis fœtens. 143
—— ſuſcum petalis planis. 144
—— reflexis. 144
—— pimpinellæ fol. 60
—— robertian. 90
—— flore alb. 60
—— viride. 60
—— ſanguineum. 144
Gladiolus minor. 61
Glaſtum ſativum. 65
—— ſpontan. 66
Glaux paluſtris. 264

Globu-

Globularia cœrulea. 61
Glycyrrhiza ſylveſtr. 117
Gnaphalium majus vulgare. 138
—— minimum. 263
—— montan. alb. 58
—— — ſuave rubens. 58
—— rectum. 227
—— tenuifol. 138
Gramen Alopecuroides. 233
—— — minus. 265
—— Antoxanthum ſpicat. 148
—— aquaticum. 239
—— — auctuans. 145
—— — majus. 145
—— — miliaceum. 145
—— — paniculat. latifol. 144
—— — ſpicat. ſpica cylindra-
—— — dracea brevi. 145
—— Arundinaceum paniculat. 144
—— Aſperum. 145
—— Avenaceum locuſtis candicant. 146
—— — glabris. 146
—— — villoſis candi-
—— cant. 146
—— ſpica ſimplici. 146
—— utriculis lanuginoſis. 147
—— montan. lanuginoſ. 147
—— — locuſtis minorib. 147
—— — rubris. 147
—— — villoſis. 147
—— nodoſum. 150

Gramen panicula ſparſa locuſtis major. 147
—— paniculat. panicul. purpur. 146
—— bufonin. 266
—— canarin. longius radicat. 145
—— capillat. panicul. rubent. 148
—— viridantib. 148
—— Caryophyllæum. 56
—— cyperin. paluſtre minus. 55
—— piloſum. 22
—— cyperoides paluſtre majus ſpica
—— compacta. 61
—— divulſa. 61
—— ſpicatum minus. 62
—— triquetrum. 61
—— dactylon. 62
—— anguſtifol. 264
—— folio latiore. 264
—— tenuiore. 265
—— radice repente. 264
—— fluviatile. 145
—— geniculatum. 269
—— harundinaceum montanum. 233
—— Iſchæmum. 264
—— junceum ſylvatic. 158
—— leucanthemum. 16
—— loliaceum altiſſim. 149
—— anguſtiore folio. 149
—— corniculat. ſpicis glabris.
—— 149
—— ſpicis villoſis. 149
—— majus. 148

Gra-

Gramen loliac. majus ſpicis longius diſtan-
—— tib. 148
—— minimum. 149
—— minus capillaceo folio. 150
—— panicula multiplici ſpicata. 148
—— radice repente. 148
—— ſine ariſtis, ſpica longiore
—— ariſtata. 149
—— ſine ariſtis. 149
—— —— multipli-
—— ci ſpicata.
—— —— ſimplici denſa.
—— —— 148
—— ſpicis breviorib, & latio-
—— rib. 148
—— Miliaceum.
—— minus vulgare. 151
—— montan panicula miliacea. 224
—— ſpadicea. 224
—— nemoroſum panicula rufeſcente. 151
—— nodoſum. 150
—— paluſtre echinatum. 151
—— majus. 55
—— ſpica diviſa. 61
—— triquetrum. 61
—— panicula fere arundinacea. 146
—— paniculatum aquatic. 151
—— arundinaceum. 146
—— autumnale. 265
—— latifol. 145

Gra-

Gramen paniculatum majus, locuſtis magnis
—— candicant tremulis. 150
—— paniculis elegantiſſ. 145
—— —— minus radice re-
—— pente. 151
—— pratenſe panicula duriore. 151
—— paniculatum altiſſ. 152
—— majus. 150
—— medium. 150
—— minus alb. 150
—— — rubrum
—— —— 150
—— molle. 151
—— — pulchrum
—— vernum ſecalinum ſpicatum al-
—— tiſſim. 135
—— minus.
—— ſegetum. 152
—— ſpicatum ſecalin. minus. 152
—— ſpicatum, ſpica glumis criſtatis.
—— —— 62
—— ſpicat. vulgare. 152
—— ſpica cylindracea molli. 62.
—— brevi. 152
—— nodoſa. 265
—— glabra. 265
—— longiſſ. 152
—— tenuiſſim, 265
—— ſylvatic. panicula rufeſcente. 152

Gra-

Gramen ſylvatic. ſpica divulſa. 61
—— tomentar. 67
—— tremul. majus. 151
—— minus. 151
—— triglochin. 157
—— typhinum. 264
—— vulgare minus. 265
Gratiola. 134
Groſſularia hortenſ. major, fructu albo. 63
—— rubeſcente. 36
—— rubra non ſpinoſa. 64
—— non ſpinoſa fructu nigro majore. 36
—— minore. 63
—— ſylveſtris. 63

H.

Hedera arborea. 63
—— communis. 64
—— terreſtris. 18
Hederula aquatica. 161
Hedypnois. 20
Helenium. 116
Helianthemum vulgare. 64
Heliotropium majus. 154
Helleboraſter. 3
Helleborine altera flore albo. 153
—— rubente. 153
—— anguſtifol. paluſtr. 153
—— montana latifol. 153
—— anguſtifol. 152

Hell-

Hellebor. albus. 199
—— fœtidus. 3
—— niger amplior. fol. 1
—— anguſtior. fol. 1
Helxine ſemine triangul.
Hepatica fontana. 162
—— nobil. flore alb. ſimpl. 13
—— cœrul. 13
—— purpur. 13
—— ſtellata. 44
Heracantha. 215
Heragroſtis. 146
Herba paris. 8
Herniaria glabra. 64
Heſperis alpina. 24
—— ſaxatilis. 24
—— ſepiaria. 22
Hieracium alpin. latifol. 154
—— aſperum majore flore. 154
—— caule aphyllo hirſut. 225
—— chondrill. fol. glabrum. 234
—— coronopi fol. 234
—— dentis leon. fol. 154
—— fruticoſum latifol. 231
—— anguſtifol. 234. & 265
—— minus. 266
—— intybaceum. 154
—— longius radicat. 235. 155
—— luteum glabrum. 64
—— hirſut. 236
—— majus Dioſc. 64

Hieracium majus erect. 64
—— minus dent. leon. fol. oblongo. 235
—— obtuſo. 236
—— ſub aſpero. 235
—— glabrum. 64
montan. anguſtifol. 64
glabrum latifol. 266
minus. 65
murorum fol. piloſiſſimo. 155
minus piloſo. 236
laciniato. 236
piloſell. fol. majus. 235
—— minus. 235
—— pratenſe latifol. 154
Hippocaſtanum. 65
Hippomarathrum. 177
Hippuris tenuis ſim. ſetis. 58
Hirundinaria. 45
Holoſteum caryophyllæum. 25
—— petræum. 139
Hordeum diſtichum æſtiv. 236
—— ſpica nitid. 236
—— zea dict. 236
—— polyſtichum hybern. 236
—— vernum. 236
Horminum ſylveſtr. latifol. 155
Hottonia. 236
Hydroceratophyllum. 155
Hydrocotyle. 266
Hyoſcyamus vulgaris. 155
Hyoſeris anguſtifol. 235

Hypocheris porcellia. 235
Hypericum Androſæmum. 156
—— Aſcyrum. 156
—— minus erect. 156
—— non ramos. 156
—— ſupinum. 156
—— villoſum erect. 156
—— vulgare. 156
Hyſſopifolia. aquatic. 254
Hyſſopus officin. 156

I.

Iacea aculeata. 222
— humilis fol. integro. 238
— nemorenſ. 237
— nigra anguſtifol. 231
— pratenſ. nigra anguſtifol. 238
—— latifol. 237
—— laciniat. 237
— pumila ſupina. 157
— cum ſquamis cilii inſtar piloſis. 237
— vulgaris laciniat. 238
Iacobæa fol. erucæ inſtar laciniatis. 157
—— latifolia. 238
—— montana lanuginoſa. 157
—— paluſtris altiſſ. 238
—— vulgaris lacin. 157
Ilex aculeata. 44
Imperatoria major. 157
Iris paluſtris lutea. 65
-- pratens. anguſtifol. humilior. 65

Iris pratens. anguſtifol. non fœtida. 65
-- tenuifolia major. 64
Iſatis ſativa. 65
— ſylveſtr. latifol. 66
Iva moſchata. 217
Iuncago paluſtris. 157
Iuncus acumine reflexo. 239
— acutus. 239
— altiſſimus. 96
— anguſtifol. villoſus. 66
— articulatus. 239
— bombycinus. 67
— foliaceus. 238
— foliatus minim. 158
— floridus major. 121
— lævis panicula ſparſa. 158
non ſparſa. 158
— nemoroſus. 158
latifolius. 8
— paluſtris humilior. 266
repens erectus. 158
— parvus. 239
— trifidus. 238
— villoſus capitulis pſyllii. 22
Iuniperus arboreſcens. 158
— vulgaris. 158

K.

Keiri officinar. 23

L.

Labrum veneris. 226

Lactuca agnina. 37
—— crispa. 159
—— foliis Endiv. 159
—— fol oblongo. 159
—— Italica laciniat. 159
—— montan. latifol. 249
—— perennis humilis. 240
—— ranarum. 179
—— romana. 159
—— sylvestris. 240
—— costa spinosa. 240
Ladanum segetum. 231
Lagopus major. 198
—— maximus. 103
Lamium alb. linea notatum flore albo. 22
—— purpureum. 22
—— fol. caul. ambient. majus. 22
—— minus. 23
—— luteum vulgare. 23
—— maximum sylvat. 231
—— montan. meliff. fol. 70
—— oblongo fol. flore rubro. 23
—— Plinii. 23
—— purpureum fœtid. folio majore subrotundo. 23
—— — minore subrotundo. 23
—— vulgare album. 23
Lampsana Dodon. 159
Lapathum aquat. maximum. 240
—— minus. 240

Lapa-

Lapathum fluitans. 179
— fol. acut. crispo. 159
— minus acut. 60
— plano. 159
— rubente. 160
— minimum. 241
— pulchrum Bonon. 160
— vulgare fol. obtuso. 160
Lappa major. 241
— capitulis glabris. 242
— montana major. 241
— minor. 259
Laserpitium. 242
Lathyrus angustifol. rectus. 73
— siliqua hirsuta. 160
— arvensis repens. 66
— latifol. luteus. 66
— sylvaticus. 160
— sylvestris. 160
Lavendula angustifol. 241
— latifolia. 241
Laureola fol. deciduo. 35
— semper virens. 34
Lens major. 241
— repens. 170
— paluſtris. 161
— vulgaris semine ex luteo pallido. 242
— subrufo. 241
Lenticula aquatica trisulca. 161
— paluſtris fol. major. 161
— quadrifolia. 160

Lenticula paluſtris vulgaris. 161
Lentibularia. 242
Lepidium latifolium. 241
Leucanthemum villoſum. 66
—— vulgare. 161
Leucojum bulboſ. hexaphyll. 4
—— triphyll. 4
—— heſperid. fol. 24
—— luteum vulgare. 23
—— vernum perenne album. 24
Lichen arboreus. 161
— capillaceus longiſſ. 162
— cinereus arboreus. 162
—— latifol. ramoſus. 162
—— vulgaris. 162
— cruſtæ modo arboribus. adnaſc.
—— flavus. 9
—— pullus. 9
—— verrucoſus cinereus. 9
— fruticoſus pendulus. 162
— minimus. 163
— pētræus latifol. 162
— pulmonarius ſaxatil. 161
— pyxidatus oris coccineis. 162
—— major. 272
—— minor. 272
Liguſtrum. 242
—— variegat. 242
Lilac. 67
Lilium convall. alb. 67
—— florib. è follicul prodeunt. 67

Lilium

Lilium convall. latifol. 67
— montan. flor. reflex. alb. 163
——— alterum lanugi-
——— nosum 163
——— purpurascente.
——— — 163
——— vulgare. 163
— purpuro croceum majus. 164
Limosella. 266
Linagrostis panicul. ampliore. 67
——— tenuiore. 67
Linaria aurea major. 131
— flore pallido. 164
— hederac. fol. 24
— pumila arvensis. 164
— segetum nummulariæ. fol. villoso su-
——— rotundo. 165
— — auriculato. 156
— vulgaris alba. 164
— flore lutero majore. 164
— — minore. 164
Lingua cervina. 242
Linosyris Rivin. 40
Linum arvense. 165
— catharctic. 166
— pratense seu minimum. 166
— sativum. 165
— sylvestre floribus purpurascent. 165
— angustis foliis, flore minore.
— — 165
Lithospermum majus erectum. 166

Lithoſpermum arvenſe minus. 166
— — flore luteo. 166
— medium. 166
— — flore albo. 167
— nigrum. 121
— repens minus. 67
Locuſta. 37
Lonchitis. 251
Lotus corniculat. glaber. 167
— hirſutus. 167
— pentaphyll. 67
— pratenſis ſiliquoſus. 68
— tetragonolobus. 68
Lunaria major ſiliqua longiore. 68
——— rotundiore. 68
— botrytis. 176
Lupinus ſylveſtris. 167
Lupulus fœmina. 267
— Mas. 267
Luteola ſalic. fol. 167
Lychnis annua minima. 243
— aquatic. purpur. 69
— quæ Behen. alb. 243
— montana viſcoſa. 68
— papav. ſpumeum. 168
— pratenſ. flore admodum laciniat. albo. 68
— — — purpureo. 68
— ſaponaria. 168
— ſegetum major. 167

Lychnis ſegetum rubra. 167
— ſylveſtr. alba ſimplex. 68
— — anguſtifol. 68
— — latifol. 68
— vaccaria. 167
— viſcoſa rubra. 69
Lycoperdon minus. 269
— veſicar. 267
— vulgare. 267
Lycopodium. 172
Lycopus paluſtris fol. incis. 243
— villoſis. 243
— glaber. 243
Lyſimachia cœrul. 216
— humifuſa. 169
— folio ſubrotund. 69
— lutea cornicul. 246
— major. 243
— purpur. ſpicata. 253
— ſiliquoſa anguſtifol. 135
— hirſuta major. 218
— — minor. 218

M.

Majorana tenuifol. 268
— vulgaris. 267
Malus acido fructu. 70
— ſylveſtris. 69
Malva vulgar. flore majore. 169
— minore. 169
Martagon. vulgar. 163

Marrubiaſtrum. 244
Marrubium alb. 244
— aquatic. 243
— cardiaca dict. 244
— nigrum. 118
— paluſtre hirſut. 243
Matricaria tanacet. fol. flore majore. 169
— — minore. 169
— vulgaris. 70
Matrifylva offic. 43
Mays. 244
Medica echinata minima. 70
— ſylveſtris. 169
Medicago. 170
Melampyrum album. 170
— coma criſtata. 170
— cœrulea. 170
— luteum. 170
Melilotus altiſſ. flore alb. 171
— luteo. 171
— capſul. reni ſimilib. 214
— flore albo. 171
— luteo. 171
— major odorata. 171
Meliſſa hortenſis. 70
— humilis latifol. 70
Melo reticulatus. 171
— rotundus. 171
— vulgaris. 172
Mentha aquatica. 243

Mentha aquatica repens. 245
— arvenſis verticillat. 245
— paluſtris rotundifol. rubra. 245
— ſylveſtr. longiore fol. 172
— longiorib. & nigriorib. fol.
— — 244
— rotundiore folio. 172
Menthaſtrum fol. rotundo. 172
— longiore. 172
Menyanthes. 70
Meſpilus apii fol. 71
— fol. rotundiore. 71
— ſubrotundo. 71
— ſylveſtris non ſpinoſa. 52
— fol. trifido. 71
— vulgaris. 71
Mercurialis montana teſticulat. 24
— ſpicata. 24
— fœmina. 71
— Mas. 71
Meum. 172
Mezereum germanic. 35
Millefolium aquatic. 236
— umbellatum. 246
— nobile. 172
— vulgare alb. 72
— purpur. 72
Milium ſemine alb. 268
— luteo. 268
— nigro. 268
— ſolis. 166

Milium ſylvaticum. 170
Montia. 269
Morus fructu alb. 25
—— nigro. 25
Moſchatellina. 9
Muſcus arboreus. 162
—— barbatus. 162
—— capillac. fol. 173
—— coralloides. 162
—— corallin. montan. 271
—— longiſſ. aquatic. 110
—— pyxidatus. 273
—— ſquamoſus. 172
Myagrum fœtid. 113
—— monoſpermum. 72
—— ſativum. 41
—— filiquoſum. 199
Myoſotis arvenſis ſubhirſuta flore majore. 25
—— —— minore. 25
—— hirſuta. 25
—— altera viſcoſa. 25
—— minor. 26
Myuſuros. 13
Myriophyll. aquatic. 180
Myrrhis annua nodoſa. 128
—— fœtens. 73
—— paluſtris latifolia alba. 72
—— rubra. 72
—— feminib. lævibus. 51
—— tuberoſa. 72
Myrtillus. 107

N.

Napellus flore cœrul. 260
— luteo. 108
Napus ſativa. 26
— ſylveſtris. 26
Narciſſo leucojum minus. 4
— vulgare. 4
Naſturtium aquatic. majus & amarum. 49
— hortenſe criſpum. 173
— petræum. 26
— ſylveſtre. 73
— tenuiter inciſum. 173
Nepeta officin. 125
Nicotiana. 246
Nidus avis. 73
Nigella arvenſis. 246
Niſſolia. 73
Noli me tangere. 118
Nummularia. 69. 169
Nux juglans. 73
Nymphæa alb. major. 173
— minor. 174
— minima. 174
— lutea major. 174

O.

Ocimoides album. 68
Ocymaſtrum alb. 68
— rubr. 69
Odontites flore lut. 248. 176

Ompha-

Omphalodes pumila. 26
Ocnanthe aquatica. 174
— altera. 174
Olsnitium. 257
Onagra latifol. — 246
Onobrychis. 246
Ophiogloſſum. 174
Ophris. 73
— unifolia. 98
Opulus. 73
Orchis abortiva fuſca. 73
— araneam referens. 78
— autumnal. lut. 76
— barbata odore hirci. 78
——— minor. 78
— bifolia altera. 74
— latiſſima. 73
— minor. 74
— cimicum redolens. 78
— purpurea. 74
— flore nudi hominis effigiem repræſent
——— — 77
— foliis ſeſſilib. maculat. 78
— non maculat. 78
— fucum referens. 78
— major. 78
— ſub virente flore. 78
— variegat. 78
— foliis candidis & purpur.
— 78

Orchis fucum referens colore rubiginos. 78
— latifolia hiante cucullo. 79
— altera. 79
— ſpica. compacta. 79
— militar. major, 79
— minor. 79
— montan. 80
— maculata. 80
— pratenſis humilior. 80
— morio foliis ſeſſilib. maculat. 78
— non maculat. 78
— muſcam referens lut. 176
— major. 175
— minor. 175
— myodes. 176
— palmata anguſtifol. 268
— batrachit. 76
— minor. 76
— montan. 80
— pratenſis anguſtifolia. 76
— latifol. major. 76
— minor. 76
— maculata. 80
— montan. variegat. 175
— paluſtris altera. 77
— latifol. 77
— maculat. 77
— tota rubr. 77
— papilion. referens. 78
— parva lutea. 176

Orchis

Orchis ſimiam referens. 74
— ſpiralis. 272
— ſtrateumatica. 75
— trifolia major. 26
Oreoſelin. apii fol. maj. 246
—— minus. 247
— pratenſe. 247
Origan. ſylveſtr. alb. 247
— purpur. 247
Ornithogal. bifol. german. 9
—— flore carneo. 9
—— — exalbido. 9
— bulbifer. anguſtifol. 10
— luteum majus. 9
— — minus. 9
Ornithopodium majus. 175
— minus. 175
Orobanche hypopit. 176
— ramoſa cœrul. 248
— purpur. 248
— ſubalbild. 248
Orobus ſylvatic. 26
Oſmunda. 176
Oxalis minima. 203
— ovina. 39
— vulgaris. 40
Oxyacantha. 71
Oxycoccus. 176
Oxys flore albo. 27
— purpuraſc. 27

P.

Padus. 19
Palma Chriſt. 77
Paludapium. 207
Panicum vulgare ſpica aſpera. 268
—— molli. 268
—— multipl. 268
Papaver erratic. maj. 81
—— minus. 81
Parietar. vulgar. 81
Paris Herba. 8
Parnaſſia. 248
Paſſerina. 256
Paſtoria burſa minim. 26
Paſtinaca latifol. ſativ. 82
—— paluſtris. 254
—— ſylveſtr. 82
Pecten veneris. 96
Pedicular. mont. anguſtif. 82
—— paluſtr. rubra. 82
—— pratens. lut. 82
—— erectior. 82
—— purpur. 82
—— ſerotina lut. 248
Pentaphylloides argent. alatum. 83
—— erectum. 181
—— paluſtre. 177
Pentaphyllum flore alb. 29
—— minus. 29
—— parvum hirſut. 29
Pepo oblongus. 177

Pepo vulgar. 177
Peplus. 196
Perfoliata. 121
— arvenſis ann. 211
Periclymen. germ. non perfoliat. 48
— rectum. 50
Perſica buxea. 27
— rubr. 27
— vulgar. ſeu virid. 27
Perſicaria anguſtifol. 249
— ferrum equin. referens. 249
— minor. 249
— mitis maculos. 248
— non maculos. 249
— paluſtris fluitans. 250
— pumila. 249
— ſalic. fol. 249
— urens. 250
Pervinca flore alb. 28
— cœrul. 27
Petaſites. 10
Petroſelin. criſpum. 207
— vulgare. 207
Peucedan. aquatic. 131. 252
— germanic. 177
Phalangium ramos. 83
— non ramos. 83
Phaſeolus major flore alb. 178
— coccin. 178
— vulgar. 177
Phellandrium. 178

Picea major rubra. 39
Pilosella major. 235
— fol. angustiore. 57
— repens hirsut. 56
— siliquosa. 46
Pimpinella sanguisorba major. 269
— — minor lævis. 269
— — hirsuta. 269
— saxifraga major. 102
— — minor. 102
Pinus montan. altera. 83
— sylvestris vulgar. 83
Pistacia sylvestris. 98
Pisum arvense. 84
— hortense majus. 84
— minus. 84
— humile. 84
— majus quadrat. 84
— umbellat. proliferum. 84
Plantago aquatica. 253
— humilis. — 253
— minor. 252
— angustifol. major. 84
— — minor. 85
— latifol. glabra minor. 84
— — hirsut. 85
— incana. 85
— sinuata. 85
— trinervia. 85
Pneumonanthe. 32
Pœonia commun. 86

Pœonia flore pleno. 85
— fol. nigricant. 85
Polium campestre. 250
— lavendul. fol. 250
— angustiore. 250
— montan. 269
Polyacantha. 214
Polygala major alba. 178
— cœrulea. 178
— purpur. 178
— vulgar. 179
Polygaloides Haller. 28
Polygonifolia. 250
Polygonatum latifol. 86
— — maximum. 86
— — minus. 86
Polygonum Tabern. 251
— angustifol. 251
— latifol. 250
— minus alterum. 41
— — polycarp. 110
— minimum. 118
Polypodium angustifol. 251
— minus. 251
— vulgare. 251
Polytrichum officin. 197
Populago major. 86
— minor. 87
Populus alba. 10
— nigra. 10
— tremula. 11

Portulaca anguſtifol. 252
Portulaca latifol. 252
Portum ſativ. 252
— ſectile. 256
— ſylveſtre. 252
— — latifol. 126
Potamogeton alpin. 180
— — anguſtifol. 249
— — — foliis undulat. 179
— — caule compreſſo. 181
— — criſpum. 179
— — floſcul. ad fol. nodos. 180
— — fol. lato ſplendente. 179
— — graminifol. 180
— — ingens graminifol. 253
— — longo ſerrat. fol. 181
— — minus non ſerrat. 180
— — puſillum, 252
— — ramoſum anguſtifol. 180
— — rotundifol. 179
Primula veris flore odor. 11
— — pallido. 11
Pruna avenaria. 28
Prunus ſylveſtris. 28
Pſeudo melanthium. 167
Pulſatilla flore purpur. 28
— — rubr. 29
Pulegium vulgare. 245
— — repens. 245
Pulmonaria anguſtifol. maculat. 11
— arborea. 161

Pulmonaria fol. echii. 11
—— gallica fæmina. 236
—— gallica fœmina tenuifol. 236
—— maculat. 11
—— non maculat. 12
Pulſatilla flore purpur. 28
—— rubr. 29
Pyrola fol. mucron. 181
—— rotundifol. 181
Pyrus ſativa. 87
— ſylveſtris. 87
Pyxidaria. 269

Q.

Quercus latifolia. 87
—— vulgaris. 88
Quinquefol. majus alb. 29
—— repens. 29
—— minus repens. 29
—— lanuginos. lut. 29
—— fol. argent. 181
—— paluſtre. 177
—— petræum maj. 181

R.

Ranæ morſus. 174
Ranunculoides fol. circin. 182
Ranunculus aquatic. alb. fol. circinat. 88
—— — fluitans peucedan. fol. 88
—— — aquatic. capillac. 88

Ranun-

Ranunculus arvenſis echinat cum globul. 88
—— hederac,. fol. 89
—— aquatic. rotundifol. 88
—— arvenſis echinat. 90
—— flore citrino. 30
—— — phœniceo. 30
—— gramini fol. flore caudat. 13
—— lanceat. major. 182
—— montanus aconit fol. 89
—— magno flore. 89
Ranunculus nemoroſus. 30
—— paluſtris longifol. major. 182
—— — minor. 182
—— fol. ſagittato anguſtiore. 183
—— maximo. 182
—— minore. 183
—— plantagin. fol. ampliore. 253
—— — humilis. 253
—— — ſerratus.
Ranuncul. phragmit. alb. 30
—— luteus. 30
—— purpur. 30
—— pratens erect. acris. 31
—— — maculatus. 31
—— dulc. 89
—— repens hirſut. 90
—— verticilli modo rotunda major. 89

Ranuncul. rotundifol. minor. 90
—— tridentat. vernus flore alb. 12
—— —— magno. 13
—— cœrul. 12
—— rubro. 12
—— fub purp. 12
—— violaceo. 12
—— apicib. alb. 13
—— nibr. 13
Rapa fativa oblonga. 183
—— orbiculat. 183
— rotunda candid. 183
—— flavefcens. 184
—— minor. 183
—— punicea. 184
—— vulgaris. 183
Raphaniftr. flor. alb. ftriat. 90
—— filiqua arriculat. minore. 91
—— fegetum flore lut. 91
—— filiqua articulata glabra. 91
Raphanus aquaticus. 98
—— major oblongus. 90
—— minor oblong. 90
—— niger. 90
—— orbicular. 90
— — rufticanus. 52
Rapiftrum aquatic. 97
—— arvenfe fol. auriculato. 91
—— flore albo ftriato. 90
—— luteo. 191

Rapunculus alopecuroid. 91
Rapunculus fol. oblongo ſpica orbiculari. 91
—— nemoroſus. 122
—— ſcabioſæ capitulo. 184
—— ſpicatus. 91
—— fol. maculato. 91
—— vulgaris campanulat. 48
—— non macul. 92
Reſeda vulgaris. 84
Ribes officinar. 63
— nigr. 63
Rhamnus catharct. 92
Rorella. 253
Roſa alba vulgar. 93
—— flore pleno. 93
— campeſtr. ſpinoſiſſima. 92
— lutea multiplex. 93
— maxima multipl. 93
— purpurea. 93
— rubra multipl. 93
— ſimpl. 93
— ſylveſtris pomifera. 93
—— repens alba. 92
—— rubente flore majore. 92
—— vulgaris flore albo. 92
— incarnato. 92
Roſmarinus hortenſ. anguſtifol. 184
—— argenteus. 184
—— latifolius. 184
—— ſpontan. latiore fol. 184
—— variegat. folio. 184

Ros ſolis fol. oblongo. 253
— ſolis fol. ſubrotund. 253
Rubeola lævis. 185
—— vulgar. quadrifol. 184
Rubia cœrul. elatior. 142
—— parva. 44
— ſylvatica lævis. 142
— ſylveſtris Monſpeſſulana. 185
— tinctorum. 185
Rubus Idæus ſpinoſus. 93
—— fructu albo. 94
— repens. 94
— vulgaris. 94
Ruta hortenſis. 94
— lunaria. 176
— muraria. 185
— paluſtris. 147
— pratenſis major. 195

S.

Salvia baccifera. 155
— ſterilis. 155
Salicaria hyſſopifol. anguſtifol. 254
—— latifol. 254
— vulgaris. 254
Salix aquatica. 33
— aurita & non aurit. 32
— caprea latifol. 31
— folio longo utrinque albido. 33
— ex rotunditat. acuminat. 33
— fragilis ſpontan. 32

Salix humilis anguſtifol. 94
— humilis capitul. ſquamos. 32
— latifol. repens. 32
—— rotund. 31
— lutea ſativ. 33
— maxima hirſuta. 33
— minima fragil. hirſut. 31
— oblongo incano fol. 31
— pumila. 32
— rubra. 31
— ſylveſtris latifol. 32
— vulgar. alb. arboreſc. 31
—— nigricans. 31
—— rubens. 31
— vulgatiſſim. 33
Salvia baccifera. 186
— fol tenuiore. 186
— latifol. 185
—— ſerrata. 186
— major. 185
—— fol. ex lut. & virid. 185
— minor aurita. 186
—— non aurita. 186
— ſylveſtris. 217
— tricolor. 186
Sambucus aquatica. 73
—— fructu nigro. 95
—— viridi. 95
—— humilis. 94
—— montana racemos. rubr. 33
Samolus Valerandi. 186

Sanguis Dracon. herba. 160
Sanguiſorba major. 269
—— minor hirſut. 83. 270
—— lævis. 83. 270
Sanicula. 95
Saponaria. 168
Satureja ſativa. 95
Saxifraga alba. 33
—— aurea. 7
—— graminea puſilla. 205
—— verna. 33
Scabioſa anguſtifol. 227
—— capitata ſquamat. 238
—— capitulo globoſo major. 186
—— minor. 187
—— fol. integro flore albo. 187
—— majore hirſuto. 187
—— hirſuta flore alb. 187
—— cœrul. 95
—— montana. 95. 96
—— ovina. 184
—— pratens hirſut. 95
—— major. 95
Scandix minor. 96. 40
—— vulgaris. 96
Scirpus paluſtr. altiſſ. 96
Sclarea major. 96
—— pratens. flore alb. 96
—— cœrul. 96
—— rubent. 96
Scordium. 126

Scorzonerafol. ſalv. 217
—— anguſtifol. 187
—— humil. anguſtifol. 187
—— latifol. 187
—— laciniat. 188
—— latifolia ſinuat. 188
Scrophularia aquat. major. 188
—— nodoſa fœtid. 188
—— paluſtr non fœtida. 188
Secale hybern. 188
— vernum. 188
Sedum maj. vulgare. 254
— minim. luteum. 189
— minus luteum. 189
—— ramulis reflexis. 189
—— teretifolium alb. 189
— majus. 189
— paluſtre ſubhirſut. 189
— parvum acre. 189
Sempervivum minus vermiculat. 189
Senecio minor vulgar. 97
Serratula. 237
Serpillum vulgare citr. odor. 190
—— majus flore albo. 190
—— —— purpureo. 190
—— minus fol. acutiore. 190
—— flore alb. 190
—— —— purpur. 190
—— capitulo lanuginoſo. 190
Seſeli pratenſe. 206
Sicla officin. 119

Side-

Sideritis. 97
Sideritis glabra. 97
Sigillum Salomon. 86
Sinapi alb. 34. 97
— arvens. præcox. 191
— erucæ fol. 191
— rapi fol. ſativ. 34
Siſymbrium annuum. 255
—— aquatic. 97
—— fol. in profund lacin. 98
—— raphani fol. 97
—— cardamine hirſutum. 18
—— erucæ fol. glabr. 97
—— paluſtre repens. 98
Sium aquatic. maj. anguſtifol. 254
— aquatic. virulent. 254
— latifol. 254
— paluſtre. 191
— umbellat. repens. 255
Smilax hortenſis. 178
Solidago ſaracenic. 201
Solanum maniacum. 118
—— officinar. acin. lut. 256
—— nigr. 255
—— quadrifol. 8
—— ſcandens. 98
—— tuberos, 255
Sonchus altiſſimus. 192
—— arboreſc. 192
—— aſper laciniat. 191
—— aſper non laciniat. 191

Sonchus cœruleus. 239
—— lævis anguſtifol. 256
—— laciniat. latifol. 255
—— minor. 256
—— purpureus. 239
—— repens. 192
—— ſylvatic. 220
Sophia Chirurgor. 255
Sorbus alpina. 53
—— ſativa. 34
—— torminal. 52
Sparganium non ramoſ. 192
—— ramoſum. 192
—— minimum. 192
Speculum vener. 122
Spergula. 112
—— minima. 16
—— minor. 112
Sphondylium vulg. alb. 195
—— purpur. 195
Spina Cervina. 92
Spinacia vulgar. 192
—— capſul. ſemin. aculeat. 195
Squamaria Riv. 114
Stachys major germanic. 256
—— ſylvatica. 231
Staphylodendron. 98
Stellaria aquatica. 99
—— minor. 99
Stœchas arvens. minim. 244
—— citrina anguſtifol. 227

Stœchas citrina latifol. 227
Stramonium, 99
Succiſa hirſuta. 187
Symphytum majus flore alb. 100
——— cœrul. 99
——— purpur. 99
——— pumil. repens. 26
Syringa alba. 100

T.

Tamariſcus germanic. 195
Tamnus racemoſa. 100
Tanacetum inodorum. 169
——— vulgare. 270
Taraxacum officinar. 21
Taxus. 34
Telephium. 206
Tertianaria. 216
Teſticulus vulpinus. 74
Teucrium pratenſe. 105
Thalictrum fol. anguſtiſſ. 256
——— majus ſtriat. 195
——— non ſtriat. 270
——— minus. 256
——— pratenſe anguſtifol. 270
——— anguſtiſſimofol. 256
——— minus. 195
Thlaſpi arvenſe perfol. majus. 34
——— minus. 34
——— ſiliquis latis. 100
——— clypeat. minus. 42
——— iberidis fol. 42

Thla-

Thlaſpi incanum campeſtre majus. 42
—— montan. lut. 205
—— oleraceum. 34
—— ſupinum lut. 42
—— umbellatum amar. 100
—— vulgatius. 100
Thymelæa lauri fol. decid. 35
—— ſemper virens. 35
—— linar. fol. 257
—— alpina linifol. 35
Thymus vulgaris. 101
—— fol. tenuiore. 195
Thyſſelin. paluſtre. 257
—— Plin. 256
Tilia fœmina. 101
— fol. majore. 101
Tithymalus amygdaloid. 257
—— anguſtifol. 197. 257
—— arvenſis latifolius. 257
—— characias. 101
—— cypariſſias. 35
—— capitul. rub. 36
—— punctat. 36
—— foliis pin. 195
—— fœtidus. 196
—— helioſcopius. 196
—— latifol. cataput. dictus. 101
—— montan. non acris. 196
—— myrſinites angſtifol. 196
—— paluſtris fruticos. 196
—— rotundifol. 196

Tithymalus ſylvatic. lunato flore. 101
—— verrucoſus. 196
Tormentilla alpin. 197
—— ſylveſtr. 197
Tragopogon majus. 101
—— minus. 102
Tragoſelinum majus. 102
—— minus. 102
Tribuloides. 197
Tribulus aquatic. 197
Tridactilitis tector. 34
Trichomanes. 197
—— minus. 198
Trifolium acid. flore alb. 27
—— purpur. 27
—— arvenſe humile ſpicat. 198. 244
—— capitul. ſpumos. 199
—— echinat. 70
—— fibrinum. 70
—— hepaticum. 12
—— Lupulin. 102
—— montan alb. 103
—— lupulin. 198
—— purpur. 102
—— ſpica longiſſ. 198
—— pratenſe album. 103
—— minus. 103
—— non maculat. 103
—— luteum capitulo breviore.
—— 102
—— purpur. 103

Trifolium pratenſe purpur. majus. 198
—— ſiliquoſum. 167
—— ſpica oblonga rubr. 198
—— montan. longiſſim. 198
—— ſubrotund. rubr. 103
Triglochin. 157
Triorchis trifol. 26
Triticum æſtivum. 199
—— hybernum. 199
—— indic. 244
—— typhin. 199
Turritis. 104
—— alpina. 199
—— foliis infer. cichor. 36
—— hirſut. mont. 36
—— leucoj. fol. 193
—— minor. 104
—— petræa. 104
—— vulgar. ramoſa. 36
Tuſſilago. 13
Typha paluſtr. clava gracil. 104
—— major. 104
—— minor. 104

V.

Vaccaria. 167
Vaccinia paluſtr. 176
Valeriana aquatica minor. 36
—— hortenſis. 37
—— major odorata. 37

Valeriana paluſtr. maj. 36
—— minor. 36
—— ſylveſtr. maj. 36
—— alter. 37
—— minor. 37
Valerianella arvenſ. præcox. 37
—— ſemine umbilic. 38
—— ſerotina. 38
Veratrum flore atro rubent. 199
Verbaſcum fæmin. 258
—— latifol. ſeu Mas. 258
—— lychnit. flore. 258
—— nigrum. 258
—— flore ex lut. purpuraſc. 258
—— pulverulent. 258
Verbena cœrul. 258
Veronica aquat. maj. 199
—— minor. 200
—— major. 200
—— fruteſc. 106
—— minor. 405
—— montan. 106
—— pratens. ſerpill. fol. 105
—— ſpicata anguſtifol. 258
—— longifol. 259
—— minor. 105
—— ſupina teucrii facie. 105
Viburnum. 106
Vicia dumetor. maxima. 106
— minima cum filiq. glabris. 106
— multiflora. 106

Vicia ſativa alba. 106
— vulgar. ſemine nigr. 106
— ſegetum ſiliquis ſingularib. 106
— hirſut. 107
— ſepium. 200
Victorialis longa. 111
Vinca pervinca. 28
Vincetoxicum. 45
Viola aquatica. 236
— arvenſis bicolor. 38
— flore cœruleo & candid. 38
— luteo. 38
— hortenſis tricolor. 201
— lunaris. 68
— Martia alb. 14
— arboreſe. 107
— purpur. 13
— montan. alb. 201
— cœrul. 200
— lutea. 201
— tricolor. 205
— pentagonia. 122
— ſylveſtr. major. 14
Virga aurea auguſtifol. 238
— latifol. 201
— paſtoris. 227
— ſerrata. 201
— virginian. 259
Viſcaria Rivin. 69
Viſcum. 14
Vitis Idæa fruct. alb. 107

Vitis Idæa fruct. nigric. 107
—— rubr. 107
— ſylveſtris. 107
Ulmaria offic. 202
Ulmus campeſtr. 14
— fol. glabr. 15
—— latiſſim. ſcabro. 14
— minor. 15
Urtica urens maxim. 259
—— minor. 259
Volubilis nigra. 229
Vulneraria ruſtica. 202
Vulvaria. 219

X.

Xanthium. 253
Xyloſteum. 50

Addenda.

ad pag. 111:

Alkekengi officinar. T. ſive Solanum halicacabum vulgare IB. 609. eſt Halicacabum repens flore monopetalo diviſo candido, baca rubra Ic. vid. Garidell. in Hiſt. plant. Tab. V. & iu Rivin. Coqueret. Juden Kirſchen noſtrat. Schlutten, Puppen-Kirſchen, in denen Weinbergen und in der Ruprechtsau, zwiſchen denen Hecken häufig. *perenn.*

ad pag. 16.

Alſine verna glabra T. floſculis albis roſaceis umbellatis ſive Caryophyllus arvenſis umbelliferus IB. 3. 361. eſt Holoſteum cariophyllæum arvenſe Tabern. hiſt. Ic. 2. pag. 543. Acker-Nägelein Graß, aller Orten, in denen Frucht-Aeckern. *ann.*

ad p. 50.

Carpinus Dodon. T. & Matthiol. Epit. pag. 71. ſive Fagus ſepium vulgo Oſtrys Theophraſti IB. 1. 146. flore amentaceo oſſeo in umbilicis foliaceis. Charme Hagen oder Weiß-Buchen, aller Orten in denen Waldungen. *perenn.*

ad p. 98.

Sorbus aucuparia IB. 1. 62. ſive Sorbus ſylveſtris alpina Lobel. icon. 107. eſt Aucuparia Rivin. Vogelbeer-Baum, ſorbier ſauvage auf dem Gebürg Hochfelden, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Corrigenda.

In Fundament. botanolog. nro 11. lin. 2. lege pro terra, terræ. In horto alſatic. Pag. 4. lin. 5. poſt & add. J. p 8. lege nemoroſus p 11. l. 6. deleatur ſive p. 12. poſt translata adde planta p. 19. l. 1. dele ſtriato p. 29. leg. repens p. 31. l. 13. leg. ſuaveolent. p. 32. l. 28. leg. candicantibus. pag. 34. l. 10. add. und braunrothen p. 37. l. 5 conjunge Oluſatri pag. 41. l. 9. leg. rocambole p. 42. l. 13. leg. ſiliculis pag. 42. l. ultim. lege animalium p. 45. l. 2. poſt color. add. Agley p. 45. l. 10. add. perenn. pag. 54. l. 6. leg. læviore p. 81. l. 4. leg. calcarib. p. 84. l. 2. leg. Kienbaum p. 100. l. 11. leg. caret. p. 102. l. 1. lege tragopogon. p. 109. l. 17. leg. major p. 116. l. 24. leg. ſuaveol. p. 134. l. 12. leg. angulato p. 136. l. 20. leg. Queue p. 152. l. 27. leg. prodr. p. 157. l. 7. l. radice p. 177. lin. ultim. leg. ſmilax 187. l. 8. leg. ſcabios. p. 188. l. 5. lege Bouc p. 204. l. 26. leg. tenuibus p. 210. l. penult. leg. lentiformi p. 215. l. 22. leg. chamæleon p. 229. l. 1. leg. Sau pag. 235. l. 22. leg. de porc pag. 240. l. 24. leg. major pag. 242. l. 24. leg. cerf. p. 246. l. 24. leg. Eſparvette.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Lindern, Franz Balthasar <<von>>,

Hortus Alsaticus Plantas In Alsatia Nobili, Inprimis Circa Argentinam Sponte Provenientes, Menstruo, Quo Singulae Florent, Ordine Designans, Annexo Charactere, Loco Natali, Ac Florum Colore, Additis Aliquibus Iconibus, Aeri Ad Vivum Incisis, Ut Et Aliis Ad Botanices Doctrinam Rite Addiscendam Pertinentibus, In Usum Botanophilorum Excursiones Facientium

Argentorati 1747

Phyt. 348
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10302237-7
VD18 10740171